


581.9494  
H15n

P  
OCT 13 1959



LIBRARY  
OF THE  
UNIVERSITY  
OF ILLINOIS


581.9494  
H15n

BIOLOGY

Double

g-1

35



# NOMENCLATOR

EX

## HISTORIA


PLANTARUM INDIGENARUM

HELVETIAE

EXCERPTUS

AUCTORE

ALBERTO v. HALLER.



BERNÆ.

Sumptibus SOCIETATIS TYPOGRAPHICÆ.

1769.



Я О Т А Й С К И  
А Д А М О В С К И  
И У Г А Й С К И И П А Т А Й  
З А Т В О Р Е Н

С Т А В К И  
А Д А М О В С К И  
И У Г А Й С К И И П А Т А Й

С Т А В К И  
А Д А М О В С К И  
И У Г А Й С К И И П А Т А Й

С Т А В К И  
А Д А М О В С К И  
И У Г А Й С К И И П А Т А Й

С Т А В К И  
А Д А М О В С К И  
И У Г А Й С К И И П А Т А Й

С Т А В К И  
А Д А М О В С К И  
И У Г А Й С К И И П А Т А Й

С Т А В К И  
А Д А М О В С К И  
И У Г А Й С К И И П А Т А Й

581.9494 Biology  
H 15 n *for Naturalist*

## AUCTORIS

### PRAEFATIO.



CUM nuper majorem Stirpium  
Helveticarum Historiam ederem, fa-  
cile vidi, plurimos rei herbariae Cul-  
tores ejus Operis, ut amplioris & pre-  
tio suo incommodi, usu carituros, ti-  
rones etiam potissimum. Quare, ut  
etiam qui bibliothecam botanicam no-  
lunt colligere, stirpes beatae Patriae

meae in suis per agros , sylvas & Alpes excursionibus in numerato habeant, decerpsi de tribus illis voluminibus sola nomina mea , eorumque cuique nomen boni Auctoris addidi , in quo tiro iconem , aut certe descriptionem inventiat , quae ad cognoscendam plantam sufficiat. Signum + indicat plantam , cui praefigitur , in LINNÆI libris , hactenus editis , non reperiri. Nomina pa- sim leviter emendavi , numeri tamen iidem sunt , qui in majori opere. Iterum vale L E C T O R B E N E V O L E , & decedenti de theatro actori fave.

BERNÆ 8. Jun. 1768.



## I. PLANTÆ STAMINIBUS PRÆDITÆ.

### I. ET PETALIS.

#### I. FLORE COMPOSITO.

##### I. PLANIPETALÆ.

###### I. PLACENTA SQUAMOSA.

1. CICHOREUM foliis pinnatis, pinnis triangularibus dentatis, floribus sessilibus. *Cichoreum sylvestre*  
BLAKWELL. t. 183. Ad vias.

*C. intibus*

2. HYPOCHOERIS caule unifloro, foliis dentatis hirsutis Hist. t. 1. *Hieracium I. latifolium hirsutum incanum*, flore magno I. R. H. In pratis alpinis.

*H. maculata*

3. HYPOCHOERIS foliis semipinnatis hirsutis, caule nudo, brachiato. *Hieracium tertium* DODON.  
p. 639. In herbosis sylvarum.

*H. radicata*

3\*. HYPOCHOERIS foliis glabris semipinnatis. *Hypochoeris porcellia* TABERN. p. 179. In agris rario.

*H. glabra*

###### I.I.I.I. PLACENTA NUDA.

4. LAPSANA foliis ovatis, dentatis, caulibus nudis, sub flore tumentibus. *Hyoseris angustifolia* TACERN.  
p. 180. In agris submontanis, rario.

*Hyoseris minima*

5. LAPSANA caule nudo indiviso, foliis semipinnatis, pinnis retroversis, dentatis. *Leontodoides alpinus glaber*, *Erysimi folio, radice crassa, fætida*  
MICHEL. nov. gen. p. 31. t. 28. In umbrosis sylvarum alpinarum.

*H. fætida*

6. LAPSANA caule brachiato, foliis ovatis, longe petiolatis, petiolis pinnatis. *Lampsana* DODON. p. 675.  
In sylvis cæduis & ruderosis.

*L. communis*

A.

7. RHA-

- Lavatodes hirtum* 7. RHAGADIOLUS foliis semipinnatis asperrimis. *Hieracium parvum*, *hirtum*, *caule aphylo*, *crispum* quando siccatum I. B. II. p. 1038. Ad pedem M. Saleva.
- T. pratense*. 8. TRAGOPOGON foliis gramineis, carinatis, amplexicaulibus, caudatis, subcrispis, calyce flori æquali. *Tragopogon s. barbula hirci*, CAMERAR. Epit. p. 313. In pratis.
- T. porrifolium* 9. TRAGOPOGON foliis gramineis amplexicaulibus, calyce florem superante. *Barba hirci altera*, CAMERAR. Epit. p. 313. Ad pedem alpium occidentalium, austrum spectante: in pratis.
- T. humilis* 10. SCORZONERA caule nudo unifloro, foliis lanceolatis +. In rupibus occidentalibus.
- S. angustifolia* 11. SCORZONERA caule nudo unifloro, foliis linearibus. *Scorzonera humilis angustifolia* CLUS. PANNON. p. 656. 657. Similibus locis, rario.
- T. laciniata* 12. SCORZONERA caule folioso, ramoso, foliis angustissimis, imis rariter semipinnatis, superioribus linearibus, lanceolatis. *Tragopogon laciniatus foliosus* COLUMN. phytobas. P. II. p. 21. Ad vias Valesia.
- T. Saligna* 13. LACTUCA foliis imis semipinnatis, superioribus amplexicaulibus, hamatis, nervo spinoso. *Lactuca sylvestris angusto saligno folio*, &c. RUPP. edit. nostr. p. 207. t. 4. In agris circa pontem Birsæ, Basileæ.
- L. Scariola* 14. LACTUCA foliis semipinnatis, nervo spinoso. *Lactuca sylvestris costa spinosa* C. B. In calidioribus ad vias.
- L. virosa* 15. LACTUCA foliis ovatis, patulis, nervo spinoso. *Lactuca sylvestris latifolia*, odore viroso I. B. II. p. 1002. Genevæ.
- L. perennis* 16. LACTUCA foliis glabris, pinnatis, caule brachiat. *Chondrilla cerulea* TABERNÆM. p. 176. In rupibus calidioribus.
- C. juncea* 17. CHONDRILLA. *Juncea viminea arvensis* TABERNÆM. p. 178. In agris calidis.
- S. muralis* 18. PRENANTHES foliis ferratis, pinnatis, pinna suprema triangulari, trilobata. *Sonchus levior vulgaris* II. CLUS. hist. L. XVI. In muris.
- S. purpurea* 19. PRENANTHES foliis amplexicaulibus, petiolatis, lanceolatis, ferratis. *Sonchus levius purpureus tetrapetalos* COLUMN. p. 244. 246. Sylvæ montanae.
20. SON-

S E M I N E C O R O N A T O . 3

20. SONCHUS foliis amplexicaulibus, petiolatis, triangularibus, petiolo pinnato, floribus spicatis. *Sonchus levis ceruleo flore* CLUS. Pannon. p. 650. 651. *s. Alpinus*  
alpinus, etiam montanus.
21. SONCHUS foliis amplexicaulibus, dentatis, integris & semipinnatis, calycibus levibus. *Sonchus levis latifolius* TABERNAMONT. p. 190. & *angustifolius* p. 189. In runerosis. *s. Gloriosus laciniatus*
22. SONCHUS foliis amplexicaulibus, rigidis, integris & semipinnatis, dentatis, calycibus levibus. *Sonchus asper* DODON. p. 693. *Sonchus asper, laciniatus, latifolius* LOESSEL. ic. 77. In ruderosis. *s. Oleraceus apur*
23. SONCHUS foliis amplexicaulibus, semipinnatis, serratis, calycibus hispidis. *Hieracium majus* FUCHS. p. 319. In agris. *s. Arvense*
24. PICRIS aspera, foliis oblongis, dentatis, superioribus amplexicaulibus. *Cichoreum luteum* TABRENN. p. 172. & *Hieracium intybaceum asperum* EJ. p. 184. Ad agrorum limites. *P. hieracioides*
25. PICRIS caule nudo, unifloro, foliis asperis, dentatis. *Hieracium dentis leonis folio, caulibus aphyllis glabris* DILLEN. E. N. C. Cent. VI. append. p. 62. *L. hirsutissima*  
t. 9. In pratis & sylvis.
26. PICRIS caule unifloro, foliis glabris, semipinnatis, calyce levi †. *Leontodon Danubiale* JACQUIN. Vindob. n. 69. In pratis humidis.
27. PICRIS caule hirsuto, unifloro, foliis glabris, semipinnatis, calycibus hirsutissimis. *Dens leonis alp. foliis oblongis, raro dentatis, calyce hispido* migrescente SEGUIER. Suppl. p. 266. Alpium editiorum. *H. Taraxaci*
28. PICRIS caule nudo, brachiatu, foliis glabris semipinnatis. *Hieracium minus* FUCHS. p. 320. In gramineis & sylvis. *L. autem*
29. CREPIS foliis scabris pinnatis, pinnis angulosis, dentatis, retroversis, extrema triangulari maxima. *Hieracium foliis Cichorei sylvestris, odore castorei* MAGNOL. Bot. Monsp. p. 129. In agris calidis & ad vias. *C. fastigiata*
30. CREPIS foliis subscabris, semipinnatis, pinna extrema maxima. *Hieracium Erucæ folio subhirsutum* I. B. II. p. 1025. In pratis & agris. *C. biennia*

PLA NIPET ALÆ.

*C. factorium*

31. CREPIS foliis radicalibus pinnatis, supernis amplexicaulibus, pinatis, hastatis. *Hieracium aliis Cichorium luteum hirsutum* I.B. II p. 1024. In agris & pratis.

β. CREPIS foliis linearibus integerrimis. Alpina.

32. CREPIS calycibus muricatis Cl. LA CHENAL †. Basileæ ad sepes.

33. CREPIS caule ramosissimo, foliis glaberrimis, integris & dentatis. *Hieracioides Endivia folio, flore minimo, folio inciso* VAILLANT. Locis aridis, & ad rudera.

34. HIERACIUM foliis linearibus, subdentatis, sparsis, floribus umbellatis LINN. *Hieracium fruticosum angustifolium majus* I. R. H.

β. & minus DILL. E. N. C. Cent. app. t. 13. &

γ. angustissimo folio PETIVER. t. 13. Ad oras sylvorum; & y. Genevæ.

35. HIERACIUM foliis hirsutis, dentatis, inferioribus ellipticis, superioribus lanceolatis. *Hieracium caule ramoso, continuo folioso, foliis ex cordato lanceolatis, denticulatis, amplexicaulibus* GMBLIN. Flor. T. II. t. 14. n. 30. Passim ad vias adclives inque pratis.

β. *Hieracii sabaudii varietas* I. I. B. II. p. 103.

36. HIERACIUM foliis ovato lanceolatis, rarer dentatis, amplexicaulibus †. *Hieracium pumilum saxatile, asperum, radice præmorsa* C. B. Ad rupe calidas.

37. HIERACIUM foliis ovatis, crassis, lanatis. *Hieracium montanum tomentosum* DILLEN. hort. Eltham. t. 150. f. 180. In calidis vallibus Valesiæ.

38. HIERACIUM caule unifloro, foliis caulinis ovato lanceolatis, dentatis, amplexicaulibus. *Hieracium latifolium montanum, præaltum, glabrum* Endivia folio BOCCONE Mus. di plant. t. 1F3. In subalpinis Aquilejensibus.

39. HIERACIUM foliis amplexicaulibus ferratis, glabris, hamis aristatis, calycibus villosis †. *Hieracium montanum majus, latifolium, Genevense* I.B.II. P. 1036. Adclivia subalpina & montana.

40. HIERACIUM foliis lanceolatis, ferratis, hirsutis, calycibus villosis. *Hieracium montanum asperum Conyzæ folio* C. B. In alpinis & subalpinis pratis.

41. HIE.

*C. vicinus*

*H. umbellatum*

*H. sabaudum*

*H. amplexicaule*

*Audryala lauata*

*Hypothecaria pustulata*

*Crepis libinæ*

*H. pyrenaicum*

SEMIN E C O R O N A T O .

41. HIERACIUM foliis asperis , oblongis , lanceolatis , dentatis , calyce hirsutissimo †. *Hieracium intybaceum* , flore magno , albido C. B. SCHEUCHZER. It. IV. p. 336.
42. HIERACIUM foliis ovato lanceolatis , dentatis , petiolatis , petiolis dentatis †. Alpium editiorum & asperitiarum. *H. puerilium*
44. HIERACIUM foliis villosis integerrimis , radicalibus ligulatis , caulinis ovatis , amplexicaulibus. *Hieracium alpinum hirsuto folio* CLUS. Pann. p. 647. *H. villarum*  
Alpina.
5. Varietas major & levior.
45. HIERACIUM foliis glabris , dentatis , imis petiolatis , superioribus amplexicaulibus , calycibus hirsutis. *Hieracium latifolium glabrum* , ex valle Griesbachiana I. B. II. p. 123. In pratis sylvisque humidis. *H. paludosum*
46. HIERACIUM caule subnudo , paucifloro , foliis ovato lanceolatis , circa petiolum dentatis. *Auricula muris major* TRAG. p. 276. *H. murorum*
5. Ejusd. species in sylvis Brocomagi EJ. p. 277.
5. *Pulmonaria gallica femina* TABERNÆM. p. 195.
5. *Pulmonaria gallica tenuifolia* EJ. ib.
5. *Pulmonaria gallica rotundifolia* BARRELLER. n.
- 342.
47. HIERACIUM foliis levibus integerrimis , radicalibus longe petiolatis , ellipticis , caulinis amplexicaulibus , hamis obtusis. *Hieracium glabrum* , succisa folio integro VAILLANT. Montana.
48. HIERACIUM caule nudo brachiato paucifloro , foliis linearibus , rariter dentatis. *Hieracium folio statice* , *caule nudo* VAILLANT. Alpina , & glarearum ad torrentes alpinos.
5. *Hieracium montanum Asphodeli foliis acuminatis* BOCcone Mus. di piant. t. 106. Ad rupes calidas occidentales. *H. porrifolium*
49. HIERACIUM caule unifloro , foliis lingulatis , dentatis , hirsutis , calyce hirsuto. *Hieracium pulmum* II. Fr. Gregorii COLUMN. Ecphras. II. p. 129. 130. Alpina. *H. Alpinum*

6 PLANIPETALÆ.

- H. aurantiacum*
50. HIERACIUM caule subnudo, foliis ovatis, integris, floribus umbellatis aurantiis. *Hieracium Germanicum* I. Fr. Gregorii COLUMN. ib. p. 28. Alpina, etiam montana, pratensis.
- H. pratense*
51. HIERACIUM caule nudo, foliis petiolatis, ovatis, integerrimis, hirsutis, floribus spicatis. *Hieracium pratense latifolium non sinuatum, majus*, In sylvis Basileæ, Neocomii.
- H. cynosuroides*
- 51\*. HIERACIUM caule subnudo, foliis hirsutis, lanceolatis, floribus umbellatis, petiolis ramosis. *Pilosella minori flore, hirsutior & altior non repens* I. B. II. p. 1040. In sylvis borealibus.
- H. Ovatum*
52. HIERACIUM caule nudo, stolonibus reptantibus, foliis longe pilosis, lanceolatis, floribus umbellatis. *Pilosella minor, folio angustiori non repens* I. B. II. p. 1040. Ad vias & in glareosis Aquilejæ.
- H. dubium*
53. HIERACIUM caule nudo, paucifloro, stolonibus reptantibus, foliis longe pilosis, lanceolatis. *Pilosella major prima* TABERNÆMONT. p. 196. In pratis, torfaceis &c.
- H. pilosella*
54. HIERACIUM caule brachiatum, paucifloro, foliis lanceolatis, longe pilosis, calycibus glabris t. In Valesia. Basileæ.
- Taraxacum*
55. HIERACIUM caule unifloro, stolonibus reptantibus, foliis petiolatis, ovatis, longe pilosis, subtus tomentosis. *Pilosella CAMERAR. Epit.* p. 708. Ad vias.
- Auratum*
- B. Varietas tota tomentosa. Alpes.
56. TARAXACUM calycibus glabris, squamis imis reflexis. *Dens Leonis* CAMER. Epit. p. 286. In pratis, ad vias
- Auratum*
57. TARAXACUM calycibus hirsutis, squamis rectis. Hist. T. I. *Hieracium alterum minus IV. COLUMN. Ecphr.* II. p. 29. 31. Prata alpina, etiam montana.

I. I. I. II. RADIATÆ.

I. SEMINIBUS PAPPO CORONATIS.

- S. vulgaris*
58. SENEPIO corollis nudis, foliis pinnato sinuatis, amplexicaulibus, floribus sparsis LINN. spec. p. 1216. *Senecio Erigeron* TABERN. p. 168. Horti, rudera.
59. SENE-

RADIATÆ. SEM. CORON. 7

59. SENEPIO foliis pinnatis, pinnis alterne majoribus, semipinnatis, angulosis, calycibus levibus, radiis brevissimis revolutis ad RUPP. T. III. *Senecium montanum* TABERNÆM. p. 169. In sylvis cæduis rarissime. *S. Silvaticus*
60. SENEPIO foliis viscidis, pinnatis, pinnis semipinnatis, angulosis, calycibus hirsutis. *Jacobeæ Pannonica mollior* CLUS. *Pann.* p. 372. In sylvis cæduis vulgo. *S. viscosus*
61. SENEPIO tomentosus, foliis pinnatis, pinnis subrotundis, umbella globosa. *Chrysanthemum alpinum* I. CLUS. *Pann.* p. 566. Alpes occidentales. *S. innotans*
62. SENEPIO foliis lineatis, pinnis dentatis, extrema maxima. *S. Jacobi herba* FUCHS p. 341. 342. *S. jacobea*  
 g. foliis viridibus rigidis & laciniatis GERBER.  
 d. *Groundsell ragwort* PETIVER t. 17.  
 e. latifolia I. B. II. p. 1057.  
 Prima vulgo ad vias. Altera Rupe. Quarta in sylvis.  
 Quinta in aquosis & fossis.
- 62\*. SENEPIO foliis pinnatis, acutis, floribus umbellatis, calycibus pelviformibus †. *Jacobeæ alpina*, *laciniata*, *flore buphtalmi* SCHÉUCHZER. posth. In M. *Fraczø*.
63. SENEPIO foliis cordato lanceolatis, serratis †. *Jacobeæ latifolia altera* C. B. Prodr. p. 69. Circa casas pastoriæ alpium.
64. SENEPIO foliis ovato lanceolatis, serratis, subtus hirsutis, floribus umbellatis. *Jacobeæ nemorensis*, *latiore*, *rigidiore*, & *hirsuto folio* RUPP. p. 142. *S. nemorensis*  
 Hercynica, non certa civis.
65. SENEPIO foliis lanceolatis, serratis, glabris, floribus umbellatis. *Solidago Saracenica* I. B. II. p. 1062  
*Montana*, etiam ad vias subalpinas. *S. farinaceus*
66. SENEPIO foliis linearibus serratis, floribus umbellatis. *Conyza aquatica maxima*, *serrato folio* THAL. p. 11. n. 111. Prata aquosa. *S. paludosus*
67. SENEPIO foliis crassis, serratis, imis petiolatis subrotundis, caulinis lanceolatis. *Doronicum Helveticum incanum* C. B. Prodr. p. 97. &c. *Alpina*, etiam montana. *S. Doronicum*

68. SENEPIO foliis imis petiolatis, cordatis, obiter dentatis, caulinis lingulatis sessilibus. *Jacobaea Pannonica* folio non laciniato, CLUS. Pann. p. 574. 575.
69. SOLIDAGO caule anguloso, hirsuto, foliis ovato lanceolatis. dentatis, racemis multifloris spicatis. *Virga aurea vulgaris latifolia* I. B. II. p. 1062. Montana.
70. SOLIDAGO foliis tomentosis, ovatis & semipinnatis †. Alpium occidentalium.
71. SOLIDAGO foliis vaginosis, pinnatis, pinnis perangustis, acutis, simplicibus & bifidis. *Chrysanthemum alpinum* II. CLUS. bist. I. p. 333. Alpes ad Italiam vergentes.
72. ASTER foliis ovato lanceolatis, serratis, subtus tomentosis, calycinis ovato lanceola is maximis. *Helenium CAMBR. Epit.* p. 35. In Rhætia transalpina, prope Neocomum, rarus, locis uidis.
73. ASTER caule ramosissimo, foliis ovato lanceolatis, subtus incanis, floribus umbellatis † t. 2. Bernæ in arundinetis.
74. Nullus est.
75. ASTER foliis ovatis, venosis, scabris, hirsutis. *Aster luteus*, hirsuto salicis folio ad RUPP. p. 180. In M. Generoso: in comitatu Neocomensi.
76. ASTER foliis glabris, ciliatis, venosis. *Aster montanus*, *luteus*, *salicis* folio glabro C. B. In pratis occidentalibus, & ad vias.
77. Non vera civis.
78. ASTER foliis subhirsutis, radicalibus petiolatis, ellipticis, caulinis sessilibus, lanceolatis, calycinis perangustis. *Conyza aquatica Asteris flore aureo* C. B. Aquosa lacus Lemani.
79. ASTER foliis amplexicaulibus, undulatis, subtus tomentosis. *Conyza tertia vulgaris* CLUS. Pann. p. 326. Ubique in subhumidis.
80. ASTER foliis amplexicaulibus, undulatis, hirsutis, radiis brevissimis. *Conyza* & *Pulicaria* BLAKWELL. t. 103.

81. ASTER

SEMIN E C O R O N A T O . 9

81. ASTER foliis ellipticis, integerimis, tomentosis, *J. montana*. caule unifloro. *Aster montanus hirsutus* LOBEL. p. 350. Razus, montanus, ad pedes alpium Vallesiacarum in valle Praetoria frequens.
82. ASTER foliis radicalibus petiolatis, ovatis, scabris, *Q. Alpinus*. caule unifloro. *Aster atticus* V. CLUS. Pann. p. 533. Alpinus & montanus.
83. ASTER caule folioso, foliis scabris, ciliatis, lanceolatis, obtusis, calycinis squamis ovatis, ciliatis. *Aster atticus* DODON. p. 266. Colles submontani calidi.
84. ERIGERON floribus paniculatis spicatis. *Virga annua* *L. Canadensis*. *virginiana hirsuta annua diffusa pallido ZANONI* ad MONT. ic. 78. In ruderosis sylvisque cætisis.
85. ERIGERON caule alterne ramoso, petiolis unifloris, semiflosculis pappum æquantibus. *Amelanchier montanus equicolorum* COLUMN. Ecphras. II. p. 26. In arvis, ad vias.
86. ERIGERON caule alterne ramoso, petiolis unifloris, semiflosculis pappum superantibus. *Asteri montano purpureo similis aut Globularia* I.B.II. p. 107. *Alpina*, etiam montana.
87. ERIGERON caule unifloro, calyce tomentoso, radiis semiflosculosis. *Aster caule unifloro*, foliis integerimis, calyce villoso, subrotundo LINN. *Flor. Lapon.* n. 307. t. 9. f. 3.
88. DORONICUM foliis cordatis, obtusis, imis longe petiolatis, superioribus amplexicaulibus. *Aconitum pardalianches* DODON. purg. p. 305. In M. Thuiry, neque alibi.
89. ARNICA foliis alternis, argute ferratis, radicalibus petiolatis. *Doronicum austriacum* III. CLUS. Pann. p. 520. 521. In alpinis lapidosis.
90. ARNICA foliis conjugatis, ovatis, integerimis. *Caltha alpina* DODON. purg. p. 62. Prata subalpina.
91. ARNICA uniflora, foliis alternis ovato lanceolatis, hirsutis, integerimis, calyce hirto. *Doronicum primum, vel minus* CLUS. Pann. p. 517. 518. In Rhætorum alpibus, rara.
92. ARNICA caule nudo, unifloro, foliis ovato lanceolatis, ferratis. *Bellis media* CAMER. Epit. p. 324. *Doronicum bellidiastrium*. In pratis montanis & subalpinis.

I. I. I. II. II. SEMINIBUS PAPPO NON  
CORONATIS.

- 1. perennio* 93. **BELLIS** scapo nudo LINN. p. 1248. *Bellis minor sylvestris* C. B. Ubique ad vias.
- C. arvensis* 94. **CALENDULA** foliis lanceolatis, amplexicaulibus, dentatis, floribus concoloribus. *Calendula arvensis* TABERNÆM. p. 335. In agris.
- Chrysanthemum* 95. **PYRETHRUM** foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, acute dentatis, floribus umbellatis. *Tanacetum inodorum* I. CLUS. *Pann.* p. 550. & II. EJ. p. 551. In sylvis calidioris Helvetiæ.
- Chrysanthemum* 96. **PYRETHRUM** caule unifloro, foliis petiolatis, palmatis. *Leucanthemum alpinum* I. CLUS. *Pann.* p. 564. Alpina.
97. **PYRETHRUM** caule unifloro, foliis radicalibus petiolatis, semipinnatis, caulinis sessilibus, acute dentatis †. *Leucanthemum alpinum angustifolium* BARRELIER. ic. 498. Alpina.
- Chrysanthemum* 98. **MATRICARIA** foliis radicalibus petiolatis, ovatis, crenatis, caulinis amplexicaulibus dentatis. *Bellis major* C. B. BLAKWELL. t. 42.
- B. Bellis alpina major*, folio rigido C. B. Prodř. p. 121.
99. *Bellis montana major* folio acuto EJ. ib. Illa prætensis & arvensis, hæc & y. alpinæ & montanæ.
- Chrysanthemum* 99. **MATRICARIA** foliis amplexicaulibus, pinnatis, pinnis semipinnatis, acute dentatis, radiis brevissimis. *Chrysanthemum Creticum* I. CLUS. *Pannon.* p. 334. 335. Alpes meridionales, rarius.
- M. arvense* 100. **MATRICARIA** foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, laciniis obtusis, floribus umbellatis *Matricaria coron.* p. 236.
- M. Chamomilla* 101. **MATRICARIA** foliis capillaribus, duplicato pinnatis, pinnis lanceolatis, bifidis trifidisque. *Anthemis Chamomilla* MATTHIOL. p. 905. Ad vias, in agris.
- Ruthensia nobilis* 102. **CHAMÆVELUM** foliis subhirsutis, nervo duro, pinnis pinnatis, pinnulis lanceolatis incisis. *Chamæmelum odoratum* DODON. *coron.* p. 243. Incerta civis, in agris calidioribus.

RADIATE SEM. NUDO. II

103. CHAMÆMELUM foliis glabris, duplicato pinnatis, nervo foliaceo, pinnulis lanceolatis, semine levi. *Chamæmelum inodorum* f. *cotula non fastida* I. B. III. p. 120. In arvis, in primis fabulosis. *Orth. Arvensis*
104. CHAMÆMELUM foliis glabris, duplicato pinnatis, nervo foliaceo, pinnulis lanceolatis, semine exasperato. *Chamæmelum fastidum* C.B. In agris, ad vias. *Orth. Cotula*
105. CHAMÆMELUM foliis hirsutis, pinnatis, pinnulis simplicibus lanceolatis. *Bupthalmum Mat-thiol.* p. 909. Passim circa Basileam. *Q. biuncoria*
106. ACHILLEA foliis hirsutis, pinnatis, pinnis æquilibus, pinnatis, pinnulis integris & trifidis, floribus luteis umbellatis. *Stratiotes lutea* Clus. *bifl.* p. 371. In Valesia inferiori ad vias. *Q. Tomentosa*
107. ACHILLEA foliis pinnatis, punctatis, pinnis æqualibus, pinnulis trifidis & quinquefidis. *Millefolium terrestre minus* *Dioscoridis Tabernæm.* p. 130. Ad vias.
108. ACHILLEA foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, incisis & integris. *Stratiotes, Millefolium Mat-thiol.* p. 1007. In Rhætia, & Helvetia transalpina. *Q. Millefolium*
109. ACHILLEA foliis tomentosis, duplicato pinnatis, pinnis crenatis, pinnulis semipinnatis *Nobile Millefolium* TRAG. p: 476. In calidis sub Jura & in Valesia. *Q. Nobilitis.*
110. ACHILLEA foliis hirsutis, pinnatis, pinnis acute dentatis, latescentibus †. In *Gom-senibus*.
111. ACHILLEA foliis glabris, pinnatis, pinnis simplicibus & multifidis. *Parthenium alpinum* Clus. *Pann.* p. 242. *Saxosa alpium.* *Q. Attracta*
112. ACHILLEA foliis glabris, punctatis, pinnatis, pinnis simplicibus †. *Affenso III. alpino umbellifero Pon a bald.* p. 120. Alpes Rhæticæ & Valesiacæ.
113. ACHILLEA foliis tomentosis, pinnatis, pinnis simplicibus & incisis. *Millefolium alpinum in-canum*, *flore specioso* I. B. III. p. 138. In alpibus Rhæticis & Valesiacis. *Q. Itala*

114. ACHIL-

- G. clavatum* 114. ACHILLEA foliis tomentosis, longe petiolatis; palmatis. *Absinthium montanum umbelliferum* CLUS. Pann. p. 553. 555. In M. Generoso.
- G. Macrophyllum* - 115. ACHILLEA foliis pinnatis, pinnis acute serratis, extremis confluentibus. *Ptarmica alpina Matri-earia foliis TRIUMPHETTI obss.* p. 83. Alpina.
- G. alpina* - 116. ACHILLEA foliis semi-pinnatis, pinnis minutissime serratis. *Ptarmica alpina Millefolii folio* BOCCONE t. 120. Inter alpinas SCHEUCHZERUS.
- G. Varia* - 117. ACHILLEA foliis linearibus, lanceolatis, acutissime serratis. *Ptarmica CAMER. Epit.* p. 354.
- D. Salicifolia* - 118. BUPHTHALMUM foliis hirsutis, imis petiolatis, ovatis, superioribus amplexicaulibus, lanceolatis, rarer dentatis. *Conyza major altera THAL. ic. II.* p. 21. In montanis & subalpinis.
- D.* 119. BUPHTHALMUM foliis conjugatis, flore nudo, nutante †. *Conyza capite nutante I.B. II. p. 1055 Michelfeldæ olim repertum.*
- D. Ceruua* . 120. BIDENS foliis sessilibus serratis, floribus nutantibus, circumvallatis. *Eupatorium aquaticum fe-mina, septentrionalium stellato & odoro flore* LOBEL. ic. p. 429.  
β *Conyza palustris foliis serratis* LOESEL. p. 54 ic. 11.  
γ *Verb-sina minima* DILLEN. Syn. III. t. 7. f. 2. In foliis.
- D. bipartita* 121. BIDENS foliis petiolatis trilobatis, & quinque lobatis, serratis, floribus circumvallatis. *Cannabina aquatica, folio tripartito diviso* C. B. Similibus locis.  
β *Conyza palustris, foliis tripartito divisis* LOESEL. p. 53. ic. 10.

## I. I. I. III. FLOSCULOSÆ.

## I. SEMINE PAPPO NON CORONATO.

## I. DISCO SQUAMIS DISTINCTO.

- X. annuum* . 122. XERANTHEMUM herbaceum, foliis lanceolatis. *Ptarmica austriaca* CLUS. Pannon. p. 548. 549. Viæ arenosæ Valesiæ.

123. SAN-

# FLOSCULOSÆ. SEM. NUDO. 13

123. SANTOLINA pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis LINN. p. 1179. *Polium Theophrasti & Dioscoridis COLUMN. Ecphras. p. 54.* Circa Foully. *S. chamaecyparissia*

## II. DISCO PAPPOSO.

124. APSINTHIUM foliis incanis, pinnatis, pinnis primis bilobatis, pinnulis incisis, lanceolatis, spicis heteromallis, floribus pendulis. *Absinthium CAMERAR. Epit. p. 652.* Ad vias Aquilejæ, Valesiæ. *Artemisia absinthium*
125. APSINTHIUM foliis sericeis, petiolatis, pinnatis, pinnulis trifidis & quinquefidiis. *Absinthium alpinum, candidum, humile C. B. ALLIONE Spec. T. I f. 3.* Alpinum Valesiacarum summarum. *Art. glacialis*
126. APSINTHIUM ex alis floridum, foliis sericeis, pinnatis, pinnis trifidis & quinquefidiis. *Affenzo alpino IV. PONA bald. p. 21.* Alpina. *Art. rupestris*

## III. DISCO NUDO.

127. ARTEMISIA foliis sericeis, radicalibus petiolatis, pinnatis, incisis, caulinis semipinnatis. *Absinthium pumilum palmatumque minus, argenteo sericeoque folio BOCCONI t. 71.* Alpium Aquilejensium & Valesiacarum.
128. ARTEMISIA foliis tomentosis, multifidiis, floribus erectis, longe spicatis, subfessilibus †. *Herba alba GESNER. herb. p. 244. 289. b.* Ad vias Valesiæ mediæ.
129. ARTEMISIA foliis sericeis, duplicato pinnatis, pinnulis parallelis. *Absinthium ponticum CAMER. Epit. p. 454.* Alpium & montium rara civis. In M. Beverin, & supra Couvet. *A. Pontica*
130. ARTEMISIA foliis inferne tomentosis, pinnatis, pinnis acute dentatis, spica paniculata erecta. *Artemisia rubra TABERN. p. 7. & alba p. 8.* Ad rudera, sepes, ripas fluviorum. *A. Vulgaris*
131. ARTEMISIA caulinis declinatis, foliis sericeis, calvescitibus, pinnatis, pinnulis multifidiis acutis. *Abrotanum campestre TABERN. p. 16.* Ad vias planiores & calidiores, inque rupibus. *A. campestris*
132. TA.

- C. vulgare*. 132. TANACETUM foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, acute dentatis. *Tanacetum* TRAG. p. 158. In muris vetustis, & ad ripas.
- C. Balsamito*. 133. TANACETUM foliis ovatis, ferratis. *Balsamita major* DODON. *coron.* p. 299. In Helvetia transalpina, & circa *Moutrū* in muris.
- C. Cernuum*. 134. CARPESIUM floribus terminalibus LINN. p. 1029. *Aster cernuus* COLUMN. Ecphr. p. 251. 252. Cum *Menthis* in subudis calidis.

## II. SEMINIBUS PAPPO CORONATIS.

- C. Squarrosa*. 135. CONYZA foliis ovato lanceolatis, rariter ferratis, floribus umbellatis. *Conyza major* MATTHIOL. p. 870. In collibus & sylvis.
- C. laevigatum*. 136. EUPATORIUM foliis ovato lanceolatis, tripteris. *Eupatorium Avicenna* FUCHS p. 265.  
β. Foliis integris. In udis.
- C. Obovata*. 137. CACALIA foliis cordatis, ferratis, longissime petiolatis, floribus umbellatis. *Cacalia incano* folio CLUS. *Pann.* p. 500. 501.
- P. pectinatus*. 138. PETASITES floribus dense spicatis, flosculis androgynis. *Petasites* DODON. p. 997. In aquos, ad rivos.
- T. alba*. 139. PETASITES spicis laxis, umbellatis, flosculis pleurisque androgynis. *Petasites flore albo* CAMERAR. Epit. p. 593. Ad torrentes alpinos.
- T. librida*. 140. PETASITES floribus spicatis, pendulis, pétiolis multifloris, calycibus æqualibus, flosculis paucissimis androgynis. *Petasites major floribus longis, pediculis insidentibus*, DILLEN. *Hort. Elth.* p. 309. ic. 237. Ad montanos rivos Juræ.
- T. frigida*. 141. PETASITES floribus spicatis, erectis, foliis calycinis lanceolatis, flosculis paucissimis androgynis. *Petasites minor* SCHEUCHZER. *It. VI.* p. 425. Ad torrentes alpinos & montanos.
- T. alpina*. 142. PETASITES scapo unifloro, foliis reniformibus. *Tussilago alpina* I. CLUS. *Pann.* p. 296. 297. In tylvis alpinis & montanis.
- T. farfara*. 143. PETASITES scapo uniflоро, flore radiato. *Tussilago* CAMERAR. Epit. p. 490. 491. In aggeribus & agris humidis.

144. CHRYS.

144. CHRYSOCOMA. *Osyris austriaca* CLUS. Pann. *C. lusorius*.  
p. 310. 211. In rupibus calidis.
145. FILAGO foliis linearibus, oris contractis, ramis  
simplicissimis, umbella convexa terminatis. *Stoe-*  
*chas Citrina temulifolia* Narbonensis I. B III. p. 154.  
*Gnaphalium* *Stoechus*  
Supra Blonai, nuper non reperta.
146. FILAGO foliis lanceolatis, subtus tomentosis, flo-  
ribus umbellatis. *Gnaphalium Americanum* CLUS.  
*bifl.* p. 327. In colle ad Arolam, proxime Drakou.
147. FILAGO foliis mollissimis, tomentosis. obtusis,  
umbellis convexis, electrinis. *Chrysocoma altera* *Gu. luteo-album*  
CLUS. *bifl.* p. 327. In Valesia & Helvetia transal-  
pina ad vias.
148. FILAGO foliis linearibus, alis spiciferis. *Gna-*  
*phalium rectum* I. B. III. p. 160. In sylvis.
149. FILAGO caule simplicissimo, spica pauciflora.  
*Gnaphalium supinum*, *Lavendula folio Bocconia* *Gu. syriacum*  
t. 85. alpina.
150. FILAGO caule simplici, umbella pauciflora, calycis  
basi tomentosa †. *Filago alpina minor*, *erecta* *Gu. Alpinum*.  
SCHEUCHZER. It. II. p. 133. alpina.
151. FILAGO caule ramosissimo, diffuso, umbella ses-  
si i terminato. *Gnaphalium humile ramosum*, *Gu. uliginosum*  
*capitulis nigris* RAJ. p. 295. In fossis & hortis.
152. FILAGO floribus sessilibus, umbellatis, foliis um-  
bellam excedentibus, tomentosis. *Gnaphalium*  
*alpinum* CLUS. Pann. p. 495. Alpium, etiam sum-  
morum montium.
153. FILAGO caule dichotomo, corymbo sphærico, in  
angulo sessili. *Gnaphalium* FUCHS. p. 222. In arvis.
154. FILAGO caule erecto, ramosissimo, foliis mollissi-  
mis, tomentosis, florum acervis sessilibus, in spi-  
cas continuatis. *Filago incana*, *tomentosa*, *erecta*  
VAILLANT. ad vias, Basileæ, in Valesia.
155. FILAGO caule dichotomo, floribus glomeratis spi-  
catis. *Filago minor* I. R. H. Basileæ in agris.
156. FILAGO glomerulis foliis filiformibus insidentibus.  
*Gnaphalium vulgare tenuifolium* I. B. III. p. 159.  
In agris Basileæ.
157. FILAGO flagellis reptans, sexu distincta, flosculis  
omnibus androgynis. *Pilosella minor* DODON.  
p. 68. In collibus aridis.

## I. I. I. IV. CAPITATÆ.

## I. CALYCE PROPRIO.

158. ECHINOPS caule ramoso , foliis semipinnatis , pinnis dentatis , dentibus aristatis. *Echinopus minor* I. B. III. p. 69. ad vias Valesiae.

## II. CALYCE PROPRIO NULLO.

## I. FLOSCULIS OMNIBUS ANDROGYNIS.

- O. Acanthium* 159. ONOPORDUM caule alato , foliis ovatis, dentatis, dentibus angulosis , aristatis. *Spina alba* FUCHS. p. 57. ad vias agri Aventici.

- Centaurea rhapontica* 160. CENTAURIUM foliis petiolatis , lanceolatis , ad pediculum emarginatis. *Rhaponticum alterum, angustiori folio* LOBEL. ic. p. 285. In summis alpibus Rhæticis , Valesiacis.

- Artium lappa* 161. LAPPA. Personata s. *Lappa major altera* MATTHIOL. p. 1155. capitulis lanatis & glabris  
*Art. peruviana* 162. CARDUUS inermis , foliis imis pinnatis , superioribus ovato lanceolatis , ferratis , squamis calycinis reflexis t. 3. *Cirsium majus caule alato, polycephalon, capitulis majoribus personata emulis* , RAJ. Syll. exter. p. 399. ad sepes & in dumetis subalpinis.

- Serratula tinctoria* 163. CARDUUS inermis , foliis glabris , ferratis , imis ovatis , superioribus semi-pinnatis. *Serratula tinctoria* TABERNÆM. p. 256. & II. p. 157. & III. ib. In pratis paludosis & dumetis.

- C. defloratus* 164. CARDUUS inermis , scapo nudo paucifloro t. 4. *Carduus dictus Cirsium folio laciniato, nigritus* I. B. III. p. 43. In subalpinis.

165. CARDUUS foliis ovatis & semi-pinnatis , subtus tomentosis , spinosis , calycibus molliter spinosis. reflexis. *Carduus caule cristo* I. B. III. p. 59. ad vias.

166. CARDUUS alis caulinis latissimis , foliis semi-pinnatis , pinnis angulosis , spinosis , floribus fasciculatis oblongis. *Carduus acanthoides* I.B.III. p. 56. ad fluvios & saliceta, non satis certa civis.

167. CARDUUS

167. CIRSIUM foliis semipinnatis, pinnis angulosis, spinosis, floribus nutantibus, calycinis squamis pungentibus, patulis. *Carduus nutans* I. B. III. p. 51. Ad vias. *C. Nutans.*
168. CIRSIUM foliis pinnatis, pinnis bilobatis, lan. cœclatis, spinosis, calycibus sphæricis, spinosis, tomentosis. *Carduus eriocephalus* DODON. purg. p. 445. Ad vias subalpinas & montanas. *Carduus Eriophorus.*
169. CIRSIUM foliis semipinnatis, pinnis bilobatis, spinosis, capitulis congestis, tomentosis, conicis. *Carduus lanceatus* TABERNÆM. p. 699. Ad vias. *Card. lanceolatus.*
170. CIRSIUM caule recto, subnudo, alato, foliis semipinnatis, spinosis, calycibus aristatis. *Carduus spinosissimus*, *angustifolius*, *pratinus* LOESL. p. 35. cum ic. In pratis uidis. *Card. galactus.*
171. CIRSIUM caule anguloſo, ramoso, foliis semipinnatis, pinnis angulosis. spinosis, calycibus intermis, cylindricis. *Carduus arvensis* TABERN. p. 700. in agris & fossis. *Serratula Arvensis.*
172. CIRSIUM foliis caulinis semipinnatis, pinnis angulosis, spinosissimis, terminantibus mollibus, ciliatis, umbellam floralem comprehendentibus t.s. *Carlina polyccephala* SCHREUCHZER It. II. p. 131. Alpina. *Car. spinosissimum.*
173. CIRSIUM foliis ciliatis, amplexicaulibus, inermibus, flores comprehendentibus. *Carduus pratensis* TRAGI I. B. III. p. 42. In pratis, post fœniscium. *Luz. Oleraceo.*
174. CIRSIUM foliis pinnatis, pinnis ciliatis, squamis calycinis recurvis †. In monte Jura supra Genavam. *C. Genavense.*
175. CIRSIUM foliis ciliatis, imis ovatis, superioribus semipinnatis, floribus sessilibus, obtusis Comm. Gotting. T. I. t. 8. *Erysithales* LUGD. p. 1054. Subalpina & montana prata. *Luz. Erysithales.*
176. CIRSIUM foliis ciliatis, semipinnatis, pinnis angulosis, spinosis, superioribus amplexicaulibus, LA CHENAL Act. Helvet. T. IV. t. 16. In pratis humectis Ruge. Circa Basileam. *Carduus Tataricus.*
177. CIRSIUM radicibus bulbosis, foliis semipinnatis, pinnis angulosis, ciliatis, floribus nudis. *Carduus tuberosus.*

- Card. acaulis* 178. *CIRSIUM* floribus acaulis. *Chamaeleon exiguus*, TRAG. p. 852. In aridis.
- Serratula Olypina* 179. *CIRSIUM* foliis ovato lanceolatis, dentatis, suhtus tomentofis, calycibus villosis t. 6. *Carduus mollis lapathi folio* CLUS. p. 663. 664. Alpium editiorum.
- Carduus Helenioides* 180. *CIRSIUM* foliis ciliatis, subtus tomentosis, radicibus petiolatis, ovato lanceolatis, caulinis lanceolatis & semipinnatis t. 7. *Cirsium britannicum* CLUS. pann. p. 657. ad pedes alpium editiorum.
- Card. Marianus* 181. *SILYBUM* nervis foliorum albis. *Carduus Mariae* TRAG. p. 850. ad vias inque ruderosis.
- C. vulgaris* 182. *CARLINA* foliis radicalibus semipinnatis, pinnis angulosis, spinosis, caulinis ovato lanceolatis, amplexicaulibus. *Heracantha* TABERN. p. 697. In aridis.
- C. acaulis* 183. *CARLINA* caule unifloro. *Carlina altera* DODON. purg. p. 440. In sterilibus montofis.
- Centaurea nigra* 184. *JACEA* foliis radicalibus semipinnatis, caulinis ovato lanceolatis †. Inter *Basileam* & *Befort*.

### I. I. III. IV. II. FLOSCULIS RADIALIBUS STERILIBUS.

185. *CYANUS* foliis radicalibus semipinnatis, caulinis ovato lanceolatis, squamis calycinis oblongis obtusis. *Jacea montana humilis hirsuto capite* CLUS. pann. p. 543. 545. In Helvetia transalpina ad vias.
- Centaurea scabiosa* 186. *CYANUS* foliis pinnatis, pinnis dentatis, obtusis, squamis calycinis triangularibus. *Scabiosa major* MATTIOL. p. 969. vulgo in collibus pratisque.
- C. paniculata* 187. *CYANUS* pinnulis foliorum pinnatis, linearibus. *Stoebe gallica* CLUS. pann. p. 546. ad vias Basileæ & in Valefia.
- C. polystygia* 188. *CYANUS* foliis subhirsutis, ovato lanceolatis. amplexicaulibus, dentatis, plumulis calycinis reflexis. *Jacea*

R A D I I S S T E R I L I B U S . 19

*Jacea montana* villoso capite elatior CLUS. pann.  
p. 547. 594. alpina.

189. CYANUS foliis lanceolatis, tomentosis, calycinis plumulis reflexis †. *Cyanus montanus* LYCHNIDIS candidissimo folio, capite reticulato BOCCONE p. 20. t. 2. In Rhætia non certa civis. *C. uniflora*.
190. CYANUS caule unifloro, alato, foliis ellipticis lanceolatis. *Cyanus major* DODON. coron. p. 31. In montanis & subalpinis. *C. montana*.
191. CYANUS foliis imis ellipticis, dentatis, superioribus linearibus, semiflosculis latissimis. *Cyanus minor* CAMER. epit. p. 289. *C. nigra*.
192. ATRACTYLIS foliis cartilagineis, reticulatis, imis semipinnatis, superioribus lanceolatis, amplexicaulibus. *Atractylis* CAMER. epit. p. 561. ad viae calidas. *Actaea* *lutea* *luteola*
193. CALCITRAPA caule alato, foliis tomentosis, radicalibus semipinnatis, caulinis lanceolatis, dentatis. *Carduus stellatus* nitior *apulus* COLUMN. Ecbras. I. p. 30. 31. Basileæ & Genevæ ad vias. *C. calcitrapa*
194. CALCITRAPA foliis pinnatis, pinnis dentatis, fibris in aliis sessiliibus. *Carduus stellatus* DODON. purg. p. 448. ad vias planitiei. *C. calcitrapa*
195. RHAPONTICUM foliis tomentosis, radicalibus semipinnatis, caulinis lanceolatis. *Jacea nigra* TAB. I. p. 112. In pratis. *C. alba*.
196. RHAPONTICUM foliis radicalibus semipinnatis, caulinis lanceolato linearibus, nervosis, calycibus nitidis. *Jacea calyculis argenteis minor* I. R. H. In Helvetia transalpina & Valesia trans St. Pierre. *C. splendens* *alba*.
197. RHAPONTICUM foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, pinnulis lanceolatis, calycibus nitidis. Stoete *Salmatica rubra* CLUS. biss. p. 161. In Helvetia transalpina, Bellinzona, Lugani, &c. *C. splendens*
- 197\* SERRATULA foliis radicalibus petiolatis ovatis, caulinis pinnatis, linearibus, denticulatis, ciliatis. *Soncino carduus apulus* COLUMN. Ecbras. I. p. 32. 34. Prope Branson Valesia inf. *C. crupina*.

## I. I. I. II. STAMINIBUS LIBERIS.

## I. DISCO COMMUNI.

*D. fullonum.*

198. DIPSACUS capitulo ovato, foliis arcuatis circumvallato, glumis erectis. *Labrum Veneris alterum* CAMER. epit. p. 432. ad vias.

*D. pilosus.*

199. DIPSACUS foliis biauribus, cicutulis hemisphaericis. *Virga pastoris* CAMER. epit. p. 433. ad vias & in dumetis.

200. DIPSACUS foliis pinnatis, pinnis ferratis, capitulo globosis. *Scabiosa alpina* LOBEL. ic. p. 557. In subalpinis *Aquilejæ*, & montanis altioribus Thuiry.

201. SUCCISA caule trifloro, floribus convexis, foliis radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis. *Succisa f. Morsus Diaboli* MATTHIOL. p. 623. In herbosis subhumidis.

202. SUCCISA foliis imis ovatis, superioribus pinnatis, pinnis semipinnatis acutis, ciliis floscularum longitudine. *Scabiosa major* CAMER. epit. p. 711. ad vias.

- f. Scabiosa II. f. alpina* CLUS. pann. p. 575. In alpium faxosie.

203. SUCCISA foliis gramineis tomentosis. *Scabiosa argentea angustifolia* C. B. prodr. p. 127. ad lacum Locarnicum SCHEUCHZER. posth.

204. SCABIOSA caule hispido, foliis ovato lanceolatis subhirsutis, inferioribus dentatis. *Scabiosa latifolia rubro flore* CLUS. pann. p. 535. 536. In dumetis.

205. SCABIOSA foliis lanceolatis, serratis & integris. *Scabiosa annua integrifolia f. Bellidis* foliis MAGNOL. bot. p. 231. in montosis. Nostra non differt a 204. & debet deleri.

206. SCABIOSA foliis petiolatis, ovato lanceolatis, dentatis, superioribus semipinnatis. *Scabiosa flore ex cœruleo purpureo* TABERN. p. 158. ad vias inque pratis.

207. SCABIOSA caule unifloro, foliis tomentosis, imis pinnatis, pinnis dentatis & semipinnatis, caulinis pinnatis.

*Scabiosa Alpina**Sc. Sylvestris.**Sc. columbaria**Sc. granatifolia**Sc. Silvestris**Sc. integrifolia**Sc. Arvensis*

pinnatis. *Scabiosa multifida alpina repens* Boc.  
CONE Mus. di piant. p. 22. t. 6. CONSTANT circa Moutrou.

### I. II. I. GYMNOMONOSPERMAE.

#### II. STAMINIBUS LIBERIS.

#### II. NULLO DISCO COMMUNI.

208. VALERIANA fo'iiis radicalibus petiolatis, ovatis, *v. Dioica*  
caulinis pinnatis, sexubus distinctis.  
 a. Mas. *Valeriana minima* DODON. purg. p. 88.  
 β. Femina. *Valeriana palustris*, foliis subrotundis  
LOESEL. p. 279. ic. 84. In udis.
209. VALERIANA foliis integerrimis, radicalibus ova-  
tis, caulinis linearibus obtusis. *Nardus Celtica*  
*f. alpina* CLUS. pann. p. 514. 515. In summis al-  
pibus Valesiacis, ad vallem Augustam Prætoriam  
vergentibus. *v. Celtica*.
210. VALERIANA foliis pinnatia, pinnis dentatis. *Pbu*  
*minus* CAMBR. epit. p. 22. ad sepes subhumidas. *v. officinalis*
211. VALERIANA foliis radicalibus petiolatis, cordatis,  
ferratis, caulinis tripteris. *Valeriana alpina* I.B.III.  
p. 208. In montanis & subalpinis. *v. Triptera*
212. VALERIANA foliis ovato lanceolatis, obiter denta-  
tis. *Valeriana alpina scrobicularie* folio C.B.prodr.  
p. 87. In montanis & subalpinis. *v. Alcodana*
213. VALERIANA foliis glaberrimis, floribus calcaratis.  
 a. *Valeriana rubra* DODON. purg. p. 91.  
 β. *Angustifolia* I. B. III. p. 221. In rupestribus &  
castellis vetustis. *v. Rubra*
214. VALERIANELLA foliis oblongis, rariter incisis, se-  
minis mucrone simplici. *Lactuca agnina* TAN-  
BERNÆM. p. 167.
215. VALERIANELLA foliis oblongis ferratis, semine  
tridentato †. *Valeriana altera* nudo & umbili-  
cato semine COLUMN. ecphr. p. 206. In agris ver-  
gente æstate. *v. lourata*.

## I. L. I. GYMNONOMONOSPERMÆ.

## II. PERICARPIÆ.

*G. cordifolia*

216. GLOBULARIA caule unifolio, unifloro, foliis e-marginatis, nervo aristato. *Scabiosa X. Clus.*  
In montanis petrosis & subalpinis.

*G. undulantis*

217. GLOBULARIA foliis ovatis oblongis, integerrimis, caule nudo, unifloro. *Aphyllanthes III. LUGD.*  
p. 864. In alpinis.

*G. vulgaris*

218. GLOBULARIA foliis radicalibus emarginatis, nervo aristato, caulinis lanceolatis. *Bellis cærulea TABERNÆM.* p. 329. In aridis calidiorum.

## III. STAMINIBUS DUOBUS LONGIORIBUS.

## DUOBUS BREVIORIBUS.

## FLORE DIFFORMI.

## I. GYMNOTETRASPERMÆ.

## I. BILABIATÆ.

*V. officinalis*

219. VERBENA foliis rugosis, tripartitis, spicis nudis, strigosis. *Verbenaca MATTHIOL.* p. 1052. ad vias & fossas.

*L. europaeus*

220. LYCOPUS foliis acute serratis, appendiculatis. *Marrubium aquatile DODON.* p. 595. In aquosis.

*M. pulegium*

221. MENTHA caule prostrato, foliis subrotundis, obiter dentatis, staminibus exsertis. *Pulegium RIVIN.* t. 23. In aquosis inundatis *Morgia*, *Mulbusia*, *Michelfeldæ*.

*M. cretica*

222. MENTHA foliis lanceolatis, punctatis, sub verticillato palmatis. *Pulegium angustifolium RIVIN.* t. 23. Prope Lausannam **CONSTANT**, sed solus, ut planta non satis certa sit.

*M. aquatica*

223. MENTHA floribus verticillatis, foliis hirsutis, ovato lanceolatis, verticillis tomentosis. *Mentha verticillata RIVIN.* t. 48. In arvis.

*M. aquatica*

224. MENTHA floribus verticillatis, foliis glabris, ovato lanceolatis, verticillis subhirsutis. *Mentha aquatica RIVIN.* t. 38. In fossis aquosis.

225. MENTHA foliis ovato lanceolatis, ferratis, verticillis paucissimis, terminante maximo. *Mentha pulexris spicata* RIVIN. t. 49. In fossis & subudis. *M. aquatica*
226. MENTHA foliis ovatis, rugosis, spicis cylindricis. *Menthastrum folio rugoso rotundiore spontaneum*, flore spicato, odore gravi I. B. III. p. 219. ad vias calidiores. *M. rotundifolia*
227. MENTHA foliis elliptico lanceolatis, ferratis, subtus tomentosis, spicis cylindricis, staminibus flore duplo longioribus. *Menthastrum* RIVIN. t. 51a *M. silvestris*  
*vulgo* in udis.
228. MENTHA foliis elliptico lanceolatis, subtus tomentosis, spicis cylindricis, staminibus floris longitudine †. ad officinas lateritias *Grandisoni*. *M. virginea*
229. MENTHA foliis elliptico lanceolatis glabris, spicis cylindricis. *Mentha* CAMER. epit. p. 477. ad vias, raro. *M. Virginea*
230. MENTHA foliis rugosis, brevissime petiolatis, verticillis spicatis. *Mentha crispa* RIVIN. t. 50. subinde ad vias. *M. crispa*
231. TRIXAGO foliis hirsutis, ovato cordatis, rotunde dentatis. *Stachys arvensis minima* RIVIN. t. 27. In segetibus aut Bevieux. *S. arvensis*
232. LAVANDULA foliis linearibus, spicis nudis. *Lavandula altera* DODON. coron. In collibus arenosis supra Vuilly. *L. angustifolia*
233. ORIGANUM foliis ovatis, umbellis coloratis, staminibus exsertis. *Origanum* RIVIN. t. 60. ad vias & colles. *O. vulgare*
234. ORIGANUM spicis aggregatis, prismaticis, rectis, bracteis membranaceis calyce duplo longioribus LINN. p. 823. *Origanum Monspeliacum pulchrum* CAMER. epit. p. 768. Batileæ inter S. Jacob & patibulum. *O. cultum*
235. THYMIUS foliis ovatis, basi ciliatis. *Serpyllum vulgare* flore magno, parvo, hirsutum, cicutatum &c. ad vias inque sterilibus. *S. vulgare*
236. THYMIUS foliis ellipticis hispidae. *Serpyllum Pannonicum* CLUS. pann. p. 627. In Valesiae fabulosis. *S. pannonicum*

- Thymus Quino*, 237. CLINOPODIUM foliis ovatis dentatis, flore folio breviore. *Acinus RIVIN.* t. 43. In aridis & muris.
- Tb. Olympos* 238. CLINOPODIUM foliis ovatis, acutis, ferratis, flore folio majori. *Clinopodium austriacum RIVIN.* pann. p. 622. 623. Montosa & subalpina.
- C. vulgare*. 239. CLINOPODIUM foliis ovatis, lanceolatis, obiter dentatis, stipulis setaceis. *Clinopodium RIVIN.* t. 43. ad vias.
- M. Nepeta*
- M. calamintha* 240. MELISSA foliis hirsutis, ovato lanceolatis, ferratis, petiolis florigeris ramosis, folia superantibus. *Calamintha officinalis BLAKWELL.* t. 167. *Calamintha Sabaudica RIVIN.* t. 47. ad vias inque rupestribus.
- M. officinalis* 241. MELISSA foliis subhirsutis, ovato lanceolatis, acute ferratis, petiolis florigeris ramosis, folia superantibus. *Calamintha CAMER.* epit. p. 481. similibus locis.
- H. pyrenaicum* 242. MELISSA foliis cordatis, ferratis, petiolis folio brevioribus. *Melissa RIVIN.* t. 45. Circa Aquilejam, Martigny &c.
- Melito* 243. HORMINUM foliis (ovatis) obtusis, caule nudo LINN. II. p. 831. *Melissa Pyrenaica caule brevi Plantaginis folio MAGNOL.* hort. reg. p. 133. In M. Teuri & Alveney.
- Melitaea* 244. MELISSOPHYLLUM verum FUCHS. p. 498. In dumetis.
- Glechoma hederacea* 245. CHAMÆCLEMA caule procumbente, radicato, foliis reniformibus, rotunde crenatis. *Hedera terrestris RIVIN.* t. 67.  
B. Flore majore VAILLANT. p. 33. t. 6. f. 4. ad vias.
- Nepeta lateritia* 246. CATARIA foliis cordatis, verticillis spicatis. *Nepeta RIVIN.* t. 52. In ruderiosis.
- Nepeta Nuda* 247. CATARIA foliis tomentosis, ellipticis, acute serratis, verticillis spicatis. *Cataria tenuifolia CLUS.* pann. p. 588. In valle Ternanza, circa Wesen &c.
- H. officinalis* 248. CATARIA foliis imis cordatis obtusis, superioribus ovatis, verticillis sessilibus, densissimis, spicatis. *Cataria hispanica Betonicæ folio angustiori I.R.H.* In Aquilejensi ditione ad vias.
249. HYSSOPUS foliis linearibus punctatis, verticillis in spicam continuatis. *Hyssopus RIVIN.* t. 68. In Valgia passim ad vias.

250. ROSMARINUS RIVIN. t. 39. Passim in Aquilejen. *R. effluvialis*  
sibus.
251. SALVIA foliis cordatis serratis, verticillis densissi-  
mis, in spicam continuatis. *Horminum sylvestre*  
*latifolium alterum* CLUS. pann. p. 577. 578. In  
Aquilejensibus frequens.
252. SALVIA foliis cordatis, sagittatis, serratis, acutis, *S. glutinosa*  
LINN. p. 37. *Horminum flore luteo* RIVIN. t. 31. In  
subalpinis & montanis.
253. SALVIA foliis imis cordatis, superioribus longe  
lanceolatis, verticillis nudis, in spicam continuatis.  
*Horminum pratense* RIVIN. t. 36. ad vias inque  
pratis aridis. *S. pratensis*
254. DRACOCEPHALUS foliis ellipticis, fasciculatis,  
verticillis spicatis, bracteis ovato lanceolatis.  
*Pseudochamaepitys* RIVIN. t. 75. Alpes aquilejen-  
ses.
255. STACHYS tomentosa, foliis imis cordatis, supe-  
rioribus elliptico lanceolatis, verticillis densissimis.  
*Stachys montana* RIVIN. t. 27. Passim ad vias  
planitiei. *S. germania*
256. STACHYS foliis hirsutis, cordatis, verticillis sub-  
tomentosis. *Pseudostachys alpina* C. B. prodr. *St. Alpina*  
p. 113. Montana & iubalpina.
257. STACHYS foliis subhirsutis, elliptico lanceolatis,  
breviter petiolatis, verticillis spicatis. *Stachys* *St. palustris*  
*palustris* RIVIN. t. 26. In fossis & agris humidis.
258. MARRUBIUM dentibus calycinis denis, recurvis,  
LINN. *Marrubium album* RIVIN. t. 67. ad vias  
& in ruderosis calidis. *M. vulgare*
259. BALLOTE foliis cordatis, serratis, verticillis nu-  
dis. *Marrubiastrum* RIVIN. t. 66. ad vias. *B. nigra*
260. BETONICA foliis ellipticis, obiter crenatis, verti-  
cillis spicatis, bractearum dentibus aristatis. *Sideritis* *Hibisci*  
*Valerandi Douriez brevi spica* I.B.III.p.427. *f. folia*  
*Ericeta supra Tuiry*.
261. BETONICA foliis ellipticis, acute dentatis, bracteis  
serratis, aristatis, verticillis spicatis. *Sideritis* *Scordioides*  
*montana scordioidea tomentosa* BARRELIER. ic. 343.  
C. B. ad ripam Wiesæ versus klein Huningen.

- St. Amara*
262. BETONICA foliis hirsutis, ovatis, rotunde crenatis, bracteis ovato lanceolatis, aristatis, integerimis †. *Sideritis vulgaris hirsuta* I. B. III. p. 425. ad vias.
- D. officinalis*
263. BETONICA foliis ovatis, crenatis, bracteis ovato lanceolatis. *Sideritis flore albo barba luteola* RIVIN. t. 69. In arvis.
- D. hirsuta*
264. BETONICA foliis petiolatis, imis cordatis, superioribus crenatis, spica brevi, insidente foliis. *Betonica* RIVIN. t. 28. In pratis udis aut apri-  
cīs.
- G. Ladanum*
265. BETONICA foliis ovatis, rotunde crenatis, spica ovata, obesa †. *Betonica alpina, incana, purpurea* BARRELIER. ic. 340. Montes vallis Geffenai, Val de Lie.
- G. Zetralit et var.*
266. GALEOPSIS foliis linearibus ferratis, verticillis diffisis. *Ladanum segetum* RIVIN. t. 24. In ste-  
rilibus, arvis &c.
267. GALEOPSIS foliis rhomboideis, ferratis, sericeis, verticillis diffisis †. *Ladanum latifolium* RIVIN. t. 24. ad vias & in agris.
- L. levigatum*
268. GALEOPSIS caule hirto, foliis ovato lanceolatis, ferratis. *Cannabis spuria* RIVIN. t. 31. ad mace-  
ries & vias.
269. GALEOPSIS caule hirto, foliis ovato lanceolatis, ferratis, flore calycis quadruplo †. *Cannabis spuria flore majore* RIVIN. t. 32. similibus locis.
- L. album*
270. LAMIUM foliis cordato lanceolatis, sericeis, ver-  
ticillis paucifloris. *Galeopsis* RIVIN. t. 62. ad vias.
- L. purpureum*
271. LAMIUM foliis cordato lanceolatis, ferratis, ver-  
ticillis multifloris. *Urtica iners s. Lamium pri-  
mum flore albo* DODON. pempt. p. 353. ad vias.
- L. angustifolium*
272. LAMIUM foliis cordatis obtusis, in summo ramo  
congestis. *Galeopsis minor* RIVIN. t. 62. simili-  
bus locis.
- Galeopsis - galeobdolon*
273. LAMIUM foliis radicalibus petiolatis lobatis, su-  
perioribus rotundis, amplexicaulis, incisis. *Galeopsis folio caulem ambiente* RIVIN. t. 63. In agris.
274. CARDIACA foliis petiolatis, cordatis, verticillis foliisis. *Lamium flore luteo* RIVIN. t. 20.

## BILABIATAE. UNILABIATAE. 27

275. CARDIACA foliis cordatis, ferratis, verticillis nudis, spicatis. *Stachys sylvatica* RIVIN. t. 26. *Stachys sylvatica*  
In dumetis ad sepes.
276. CARDIACA foliis tripartitis lanceolatis. *Cardiacæ leonurus cardiaca* RIVIN. t. 20. ad macerias.
277. BRUNELLA foliis ovatis, oblongis, calycibus superne truncatis. *Brunella* RIVIN. t. 29. In pratis. *Arenaria vulgaris*.
278. BRUNELLA foliis ovatis oblongis, calycibus superne tridentatis. *Brunella flore majore* RIVIN. *Arenaria grandiflora*. t. 29. In pratis altioribus.
279. BRUNELLA foliis imis ovatis oblongis, caulinis dentatis & semipinnatis. *Brunella laciniata* folio *Arenaria laciniata* RIVIN. t. 30. In herbosis aridis Basileæ Rupe &c.  
β. Flore magno I. B. Genevæ &c.
280. CASSIDA foliis oblonge cordatis, crenatis, verticillis nudis, bifloris. *Scutellaria* RIVIN. t. 77. *Scutellaria*
281. CASSIDA procumbens, foliis ovatis crenatis, spicis raris, foliosis. *Teucrium alpinum inodorum*, *Teucrium galericulatum* *Teucrium galericulatum* *Teucrium alpinum* magno flore C. B. prodr. p. 116. Alpes Valesiae.

## II. FLORE UNILABIATO.

282. BUGULA flagellifera, foliis ovatis dentatis. *Bugula* RIVIN. t. 75. In pratis & ad vias. *Ajuga reptans*
283. BUGULA foliis angulosis hirsutis, calycibus villo- sis. *Bugula montana* RIVIN. t. 76. *Ajuga genevensis*  
β. Rubrifolia alpina, foliis minus angulosis.
284. BUGULA foliis imis linearibus, caulinis tripartitis. *Chamaepitys* RIVIN. t. 14. In agris & glareosis *Teucrium chamaepitys*  
Helvetiae calidioris.
285. CHAMÆDRYS foliis ellipticis integerrimis, contractis, subtus incanis, floribus capitatis. *Ajuga* *Ajuga montana* folio *integra* RIVIN. t. 15. In submontanis calidis.
286. CHAMÆDRYS foliis firmis, ovatis, crenatis, verticillis paucifloris. *Chamaedrys* RIVIN. t. 10. si. *Teucrium chamaedrys*.
287. CHAMÆDRYS foliis cordatis productis, spicis longissimis nudis, heteromallis. *Scorodonnia* RIVIN. t. 12. In dumetis. *Teucrium scorodonii*.
288. CHAMÆDRYS foliis mollibus, hirsutis, ellipticis, crenatis, verticillis paucifloris. *Scorodium* RIVIN. t. 11. In paludosis calidioribus. *Teucrium cordatum*.

28 DIFFORMES. MONANGIÆ.

- E. Odrys* 289. CHAMÆDRYS foliis pinnatis, pinnis dentatis, trilobatis, verticillis paucifloris. *Iva moschata* folio multifido RIVIN. t. 14. Inter stipulas.

I. I. II. DIFFORMES. DIDYNAMIÆ.

II. VASCULIFERÆ.

I. MONANGIÆ.

- U. vulgaris* 290. UTRICULARIA calcare conico, scapo paucifloro LINN. p. 26. *Lentibularia* RIVIN. t. 79. In fossis paludosis Bernæ, Paterniaci &c.
- U. minor* 291. UTRICULARIA calcare brevissimo. *Lentibularia minor* PETIVR. herb. brit. t. 26. Bernæ, circa la Chetelaz. In fossis paludosis.
- P. vulgaris* 292 PINGUICULA calcare floris longitudine, OEDER. flor. t. 93. In pratis udis frequens.
- P. alpina* 293. PINGUICULA calcare brevissimo. *Pinguicula nocturna* conico-petalo breviore LINN. flor. Lap. t. 12. In udis subalpinis.
- O. laevis* 294. OROBANCHE caule simplici, stipulis ternatis, calyce quinquefido. *Orobanche* IIII. LOBEL It. II. p. 269. *Basilea*, *Sissaci*, *Fouly*.
- O. major*. 295. OROBANCHE, caule simplici, stipula unica, calyce quadrifido. *Orobanche major* CLUS. *Pann.* p. 242. In pratis sterilioribus.
- O. ramosa*. 296. OROBANCHE caule ramoso, flore quinquepartito. *Orobanche* CAMER. Epit. p. 311. In Cannabe.
- Lathria squamaria* 297. SQUAMARIA caule simplicissimo, floribus nutantibus, labello trifido. *Anblatum* CORDI p. 89. b. Frequenter ad sepes viasque umbrosis.
- E. Alpina*— 298. TOZZIA, *Alpina lutea* A/SINES folio radice squamata, MICHLI nov. gen. p. 20. t. 16. In ruibus humectis sylvisque montanis et alpinis passim.
- L. borealis* 299. LINNÆA floribus germinis LINN. Spec. p. 380. flor. Lapon t. 12. f. 4. ad viam malam, et alibi in Rhaetia.
- L. aquatica* 300. LIMOSELLA LINN. Spec. 881. *Plantaginella* RUPP nostr. ed. t. 6. Circa Rieben, Mülhausen, Nidau In orbitis humidis.

301. MONTIA. LINN. II. p. 129. *aquatica major* *M. vulnus*  
 MICHEL t. 13. f. 1. & *minor*. ib. In sylva  
 Urban circa Mühlhausen, M. Ballon &c.

## II. DIANGIAE.

302. ERINUS floribus racemosis LINN. *Ageratum purpureum* Lusd. p. 1184. In subalpinis, etiam montanis, ad vias. *E. Alpinus*
303. EUPHRASIA foliis ovato lanceolatis, argute dentatis LINN. *L. officinalis*
- a. Flore majori. *Euphrasia Tabern.* p. 862.  
 b. Flore minori. *Euphrasia lutea alpina minima subrotundo folio nigricante*. BOCCONE *Mus. de plant. t. 60*. Illa vulgatissima, hæc in Alpinis vulgo.
- c. *Tenuissime dissecto, angusto folio* BOCCONE ib. Agauni & circa Aquilejæ &c.
304. ODONTITES bracteis ferratis hirsutis. *Odontites* *O. dissimilis*. RIVIN. t. 92. ad vias, inque Stipulis.
305. ODONTITES bracteis glabris integerrimis. *Odontites flores luteo* RIVIN. t. 91. Rupes calidæ, *O. lutea aquilejenses*.
306. ODONTITES foliis viscidis, rarer ferratis. *Pedicularis annua lutea viscosa pomum redolens*. GARIDEL. p. 351. ic. 80. In sylva supra Salges. *O. viscosa*
307. MELAMPYRUM foliis integerrimis floribus hiantibus, OED. Flor. Dan. ic. 145. In montanis & Alpinis sylvis. *M. siliculosum*
308. MELAMPYRUM foliis imis integerrimis, mediis dentatis, floralibus hastatis. *Parietaria sylvestris Hort Aichstet* aft. ord. 12. t. 2. *M. pratense*
309. MELAMPYRUM foliis ovato lanceolatis, floralibus hamatis, acute dentatis, patulis, calycibus hirsutis. *Melampyrum sylvaticum* RIVIN. t. 81. In sylvis abiegnis. *M. nemorosum*
310. MELAMPYRUM foliis integerrimis, bracteis semipinnatis. *Melampyrum arvense* RIVIN. t. 80. In agris. *M. arvense*
311. MELAMPYRUM foliis integerrimis, floribus spicatis, bracteis duplicatis, cristatis. *Melampyrum cristatum* crista-

- cristatum* RIVIN. t. 81. In pratis subhumidis & nemoribus.
- Dactylis alpina* 312. STÆHELINIA foliis cordatis, amplexicaulis, feratis, floralibus coloratis. *Clinopodium alpinum* PONA Bald. p. CCCXLIII. In lapidosis gramineis Juræ & alpium.
- Mimulus cristata* 313. ALECTOROLOPHUS calycibus glabris. *Crista Galli* DODON. cereal. p. 259. agrorum & pratorum vitiis.
- P. gallii* var. 314. ALECTOROLOPHUS calycibus hirsutis. *Pedicularis intea* TABERNÆM. p. 791. In agri & ad vias, locis siccioribus.
- P. flava* 315. PEDICULARIS caule simplici, foliis pinnatis, pinnis dentatis, denticulis retroversis t. 8. f. 3. *Pedicularis caule simplici*, foliis semipinnatis, obtusis, laciniis imbricatis, crenatis LINN. *Lapon.* t. 11. f. 2. In alpibus lapidosis infrequentior. In M. Neunnenen.
- P. reuteri* 316. PEDICULARIS caule simplici, foliis pinnatis, floribus spicatis, staminibus eminentibus t. 8. f. 2. Alpes Valesiacæ altiores.
- P. foliosa* 317. PEDICULARIS spica foliosa t. 9. f. 1. *Pedicularis major* Dalechampii I. B. III. p. 438. In alpinis & subalpinis. Scèbes amat rupestres.
- P. verticillata* 318. PEDICULARIS foliis pinnatis quaternis, floribus spicatis t. 9. f. 2. In alpibus frequentior.
- P. uniaristata* 319. PEDICULARIS foliis pinnatis, pinnis dentatis, floribus restratis, spicatis, calycibus tomentosis. *Pedicularis foliis alternis*, pinnis semipinnatis, floribus laxè & longissime spicatis ALLIONE spec. p. 54. t. 12. ad S. Bernhardi adscensum.
- P. valvestris* 320. PEDICULARIS caule ramoso, foliis pinnatis, pinnis pinnatis, dentatis, calyce bifido. *Pedicularis* RIVIN. t. 92. In aquosis pratis.
- P. silvatica* 321. PEDICULARIS caule ramoso, procumbente, foliis pinnatis, pinnis dentatis. *Pedicularis minor* RIVIN. t. 92. In M. Juræ herbosis, circa Ferrière.
- P. rostrata* 322. PEDICULARIS caule procumbente, ramoso, floribus rostratis sparsis t. 6. f. 1. *Pedicularis II.* SGUIRR. p. 125. In summis alpibus.
- P. tuberosa* 323. PEDICULARIS caule simplici, floribus spicatis, rostratis,

- stratis, calycibus glabris t. 10. *Pedicularis bulbosa* 173. Ill. p. 478. In alpinis & subalpinis.
324. PEDICULARIS caule simplici, foliis pinnatis, pin-nulis obtuse dentatis, galea rostrata t. 11. In- certa planta, neque ruper reperta, in M. Chaude.
325. SCROPHULARIA caule quadrangulo, alato, pa-niculato, foliis ovato lanceolatis. *Scrophularia f. aquatica*  
*femina* CAMER. epit. p. 827. In fossis aquosis.
326. SCROPHULARIA caule quadrangulo, paniculato, foliis cordatis oblongis. *Scrophularia f. nodosa* CAMERAR. epit. p. 866. ad vias & fossas.
327. SCROPHULARIA foliis longe petiolatis, cordatis, subhirsutis, petiolis in aliis ramosis. *Scrophula-ria f. veruatis* RIVIN. t. 107. circa Bischofszell Turgoviae.
328. SCROPHULARIA foliis pinnatis, pennis lobatis, circumferratis, caule paniculato. *Ruta canina* LOBEL. II. p. 55. In arenosis ripis.
329. GRATIOLA RIVIN. t. 106. In pratis uidis. *G. officinalis*
330. DIGITALIS foliis calycinis ovatis, galea integra. *D. purpurea* Digitalis RIVIN. t. 103. circa Badenweiler.
331. DIGITALIS foliis calycinis lanceolatis, galea inci- fa, flucibus maculosis. *Digitalis lutea* TABERN. p. 567. In montosis.
332. DIGITALIS foliis calycinis lanceolatis, galea bifida, floribus immaculatis. *Digitalis f. lutea* minore RIVIN. t. 105. similibus locis, adque vias lacidoses.
333. ANTIRRHINUM foliis ellipticis obtusis, floralibus spicatis, calycinis obtusis, calcare brevissimo. *A. majus* *Antirrhinum* RIVIN. t. 82. In transalpinis.
334. ANTIRRHINUM foliis ellipticis obtusis, floribus sparsis, calycibus tubulatis, longissimis, calcare brevissimo. *A. arvense* RIVIN. t. 182. Passim in agris.
335. ANTIRRHINUM viscidum, foliis inferioribus con-jugatis, ellipticis, obtusis, calcare dimidiis floris longitudine. *Linaria arvensis minima* RIVIN. t. 85. In arenosis passim.
336. ANTIRRHINUM foliis linearibus, adscendentibus, congestis, caule erecto, spicato. *Linaria f. linearis* RIVIN. t. 83. ad vias & fossas.

337. ANTIRRHINUM foliis linearibus, adscendentibus,  
*A. genistifolium* spicatis, confertis, calcare flore longiori †. *Linaria lutea montana Genistæ tinctoriae folio* C. B.  
 In M. S Bernhard adscensu,

338. ANTIRRHINUM caule procumbente, rarer spi-  
*A. Alpinum* cato, foliis verticillatis. *Linaria Pannonica II.*  
 CLUS pann. p. 309. In glareis alpinis & subalpinis.

339. ANTIRRHINUM caule repente, foliis reniformi-  
*A. Cymbalaria* bus, quinquelobatis. *Cymbalaria RIVIN.* t. 86.  
 In muris calidioribus.

340. ANTIRRHINUM caule procumbente, foliis hastata-  
*A. Elatine* tis, imis conjugatis, superioribus alternis. *Elatine CAMERAR.* epit. p. 754. In agris.

341. ANTIRRHINUM caule procumbente, foliis villosis  
*A. Spuria* ovatis, imis conjugatis, superioribus alternis.  
*Elatine RIVIN.* t. 86. In agris.

342. ANTIRRHINUM foliis imis elliptico lanceolatis,  
*A. Bellidifol.* acute dentatis, caulinis capillaribus trifidis. *Linaria odorata DODON.* coron. p. 399. In segeti-  
 bus versus Vernier haud longe Geneva.

### I. II. III. STAMINIBUS CONNATIS.

#### FLORE POLYPETALO DIFFORMI.

#### I. TRIPETALE OCTOSTEMONES.

343. POLYGALA procumbens, foliis imis subrotundis,  
*P. anacra* supremis linearibus. *Polygala Buxi minoris folio* VAILLANT. t. 32. f. 2. In pratis altioribus.

344. POLYGALA caule erecto, foliis linearibus acutis.  
*P. vulgaris* *Polygala vulgaris major* VAILLANT. ib. f. 1. In pratis, ad vias.

345. POLYGALOIDES precumbens, foliis duris, ova-  
*Polygala chamaebuxus* tis, nervo aristato. *Anonymos flore Coluteæ* CLUS. pann. p. 47. In montanis & subalpinis.

#### II. TETRAPETALÆ HEXASTEMONES.

346. FUMARIA foliis multifidis, subrotunde lanceola-  
*F. officinalis* tis, fructibus monospermis. *Fumaria RIVIN.*  
 tetrap. t. 1. In vineis, hortis.

347. FUMARIA foliis pinnatis, pinnis pinnatis, pinnulis lobatis, ovatis, siliquis brevibus incrispatis. *F. capnoidea*  
*Pseudo-Fumaria flore luteo* RIVIN. t. 74. In transalpinis.
348. FUMARIA radice bulbosa, cava, caule simplici bifolio, bracteis ovato lanceolatis. *Fumaria altera* CAMER. epit. p. 891. ad sepes.
349. FUMARIA radice bulbosa, solida, caule simplici multifolio, bracteis digitatis. *Fumaria bulbosa*  
*f. tuberosa minor* TABERN. p. 39. In montanis.

III. TETRAPETALÆ DECASTEMONES.

PAPILIONACEÆ.

I. FOLIIS SIMPLICIBUS AUT TERNIS.

350. GENISTA inermis, foliis glabris, confertis, ellipticis, lanceolatis, floribus sessilibus, spicatis. *G. tinctoria*  
*Genistella* RIVIN. I. B. In arvis siccis.
351. GENISTA inermis procumbens, foliis duris, subhirsutis, spinis brevibus, foliosis. *Chamägenista prima* CLUS. pann. p. 50. In M. Juræ adclivibus. *G. pilosa*
352. GENISTA foliis ovato lanceolatis, hirsutis, spinis ramosis, in ramis senescentibus. *Genistella spinosa* RIVIN. t. 67. In nemoribus agri Vaudensis. *G. geruviana*
353. GENISTA foliis adpressis, ellipticis, fine lanceolato patente. *Chamägenista altera* CLUS. pann. p. 51. In alioribus sylvis Vaudensis. *G. sagittalis*
354. SPARTIUM foliis inferioribus ternatis, hirsutis, superioribus simplicibus. *Genista* RIVIN. t. 65. *S. Scoparium* in Helvetia transalpina.
355. SPARTIUM caule decumbente, ramoso, foliis foliariis ovatis, hirsutis, floribus longe petiolatis. † Passim in montis Juræ vallibus.
356. ANONIS caule decumbente, ramis senescentibus spinosis. *Anonis* FUCHS p. 60. In agris, ad vias. *Anonis spinosa*
357. ANONIS foliis subrotundis, serratis, ternatis, petiolis, multifloris. *Cicer sylvestre trifolium* I. B. II. p. 295. ad rupes alpium aquilejensium & Valesiacarum. *O. rotundifolia*

- O. uatica* 358. ANONIS viscosa, foliis petiolatis ternatis, petiolis unifloris. *Ononis lutea* CAMER. epit. p. 344. ad ripas & torrentes Aquilejæ, Valesiæ.
- O. micantissima* 359. ANONIS foliis ternatis, ovatis, serratis, hirsutis, floribus sessilibus, calycibus hiantibus. *Ononis lutea sylvestris minima* COLUMN. ecphras. p. 301. 304. ad declivia graminea Aquilejæ, Valesiæ.

## II. FOLIIS TERNATIS.

- C. laburnum* 360. CYTISUS inermis, floribus racemosis pendulis, foliolis ternatis LINN. *Laburnum* RIVIN. t. 62. in dumetis Aquilejæ, Valesiæ.
- C. nigricans* 361. CYTISUS foliis ovatis nitidis, floribus spicatis, cernuis, calycibus & siliquis sericeis. *Cytisus primus* CLUS. parv. p. 36. in Helvetia transalpina.
- Trif. Melilotus* 362. MELILOTUS siliquis racemosis, pendulis, acutis, rugosis, dispermis. *Melilotus* RIVIN. t. 6. in agris & ad vias.
- officinalis*
- T. agrarium* 363. TRIFOLIUM caulibus diffusis, spicis ovatis strepentibus. *Lupulinum* RIVIN. t. 10. in agris.
- T. praeannuum* 364. TRIFOLIUM caule erecto, spicis strepentibus paucifloris. *Trifolium lupulinum alterum minus* RAJ. syn. III. t. 14. f. 3. in pratis subudis.
- T. radicans* 365. TRIFOLIUM caule erecto, spicis strepentibus ovatis. *Trifolium lupulinum montanum* C.B. prodr. p. 140. in agris & adclivibus.
- T. repens*. 366. TRIFOLIUM capitulo squamoso aspero majus C.B. prodr. p. 140. *Michelfeldæ* C. B. plantam indicat, ignotam nuperis.
- T. repens*. 367. TRIFOLIUM caule repente, spicis depressis, siliquis tetraspermis. *Trifolium repens* RIVIN. t. 13. Plurimæ varietates in viis, pratique.
- T. orientale* 368. TRIFOLIUM caule subrecto, spicis depressis, siliquis tetraspermis. *Trifolium orientale altissimum*, caule fistuloso, flore albo VAILLANT. t. 25. f. 5. ad pabula cultum.
- T. alpinum* 369. TRIFOLIUM scapis radicatis, floribus racemosis, foliis lanceolatis nervosis. *Trifolium angustifolium alpinum* PONA bald. p. 194. in alpinis.
- T. fragiferum* 370. TRIFOLIUM caule repente, spicis glabris, calyci- bus

bus sericeis, ampullascentibus. *Trifolium fragiferum frisicum* CLUS. posth. p. 39. in herbosis uidis.

371. TRIFOLIUM caulis prostratis, capitulis ovatis, in aliis sessilibus, calycibus rigidis, segmentis rectis. *Trifolium flosculis albis, in glomerulis asperis, cauleulis proxime adnatis* VAILLANT. t. 33. f. 1. in aridis Basileæ, Aquilejæ &c.

*Z. Seabrum.*

372. TRIFOLIUM caulicolo paucifloro, foliis elliptico lanceolatis, nervosis, subtus subhirsutis. *Trifolium folio longiore, flore albo* RIVIN. t. 12. in pratis adclivibus.

*E. montanum.*

373. TRIFOLIUM caule ramoso, foliis lanceolatis, serratis, spicis villosis ovatis. *Lagopus* RIVIN. t. 15. in agris.

*Z. arvense.*

374. TRIFOLIUM foliis subrotundis, spicis cylindricis, calycibus plumosis. *Lagopus latifolius* RIVIN. t. 17. Genevæ in pratis adclivibus ad Arve fl.

*Z. inaequatum.*

375. TRIFOLIUM foliis nervosis, ciliatis, spicis ovatis, obesis, calycis denticulis plumosis, imo longissimo. *Cytisus* TRAG. p. 601. in pratis adclivibus calidioribus.

*Z. rubens*

376. TRIFOLIUM foliis nervosis, supremis conjugatis, vaginis lanceolatis. *Trifolium spica longiore flore purpureo* RIVIN. t. 12. in pratis montanis & sylvis.

*Z. alpestre*

377. TRIFOLIUM caule obliquo, foliis ovatis hirsutis, supremis conjugatis, vaginis aristatis. *Trifolium* RIVIN. t. 11. in pratis, potissimum uidis, & pinguis.

*Z. pratense.*

*P. Flore ochroleuco, forte diversum. in alpibus.*

378. TRIFOLIUM caule erecto, foliis hirsutis, supremis conjugatis, spicis oblongis †. *Trifolium* E. L. CHENAL diff. in p. 2. in pratis circa Basileam & Roche.

*Z. Oleraceum*

379. BUCERAS siliquis sessilibus, arcuatim, undique divergentibus. *Fenùm græcum polyceratum* RIVIN. t. 82. in agris circa Foulby.

*Trigonella foenum-græcum*

380. MEDICA caule diffuso, capitulis hemisphæricis, siliquis reniformibus. *Melilotus minima* RIVIN. t. 8. in viis glareosis.

*Medicago lupulina*

*M 2° falcata*

381. MEDICA foliis oblongis ferratis, siliquis racemosis  
falcatis. *Falcata RIVIN.* t. 84. in aridis & se-  
pibus Aquilejæ, Basileæ.

*M 3° sativa*

382. MEDICA caule recto, foliis oblongis, ferratis,  
racemis erectis, siliquis planis, iterato contortis.  
*Medica DODON. cereal.* p. 208. ad vias & agros,  
casu nata.

383. MEDICA foliis emarginatis, ferratis, racemis pauci-  
floris, siliquis cohinatis globosis. *Medica echinata*  
*minima I. B. II.* p. 386. & *Medica echinata*  
*hirsuta Ej. ib.* in Aquilejensibus, Basileæ &c.

*M 2° Polygalophylo  
hirsuta*

### III. FOLIIS QUINIS.

*Lotus Dorydium*

384. DORYCNIUM hispanicum Clus. hisp. 201. 202.  
in Sabaudia Helvetiæ finitima, etiam in Rhætia,  
hic minus certo.

*L. corniculatus*

385. LOTUS siliquis umbellatis rectissimis, cylindricis.  
*Lotus RIVIN.* t. 76.

*L. siliquosus*

386. LOTUS caule prostrato, scapis unifloris, siliquis  
alatis. *Lotus siliquosa hiteo flore Clus. pann.*  
p. 763. in pratis uidis & ad vias.

### IV. FOLIIS PINNATIS.

*C. varia*

387. CORONILLA caule brachiato, angulato, foliis  
vigenis, aristatis, floribus umbellatis. *Coronilla*  
*flore vario RIVIN.* t. 94. in agris & ad sepes A-  
quilejensium &c.

*C. coronata*

388. CORONILLA caule erecto, foliis undenis, ovatis,  
floribus umbellatis, siliquis articulatis pendulis.  
*Coronilla montana RIVIN.* t. 99. ad rupes val-  
lium M. Juræ.

*C. emerus*

389. CORONILLA frutescens, foliis retusis, septenis,  
siliquis longissimis, obiter articulatis. *Coronilla*  
*major RIVIN.* t. 95. in sylvis & ad rupes Jura-  
nas & subalpinas.

*C. micrantha*

390. CORONILLA caulis lignosis, procumbentibus,  
foliis ovatis, floribus umbellatis, siliquis alatis.  
*Polygonum*

*Polygalon Cortusi* I. B. II. p. 351. alpium Aquilejenium & Valesianorum, ut tamen in planitiem usque descendat.

*Hippocrateis leucosoma*

391. FERRUM EQUINUM siliquis umbellatis, undulatis. *Ferrum equinum comosum* RIVIN. t. 97. *H. multiflorum*
- ad vias aridas.
392. FERRUM EQUINUM siliquis solitariis, lunatim excisis. *Ferrum equinum* RIVIN. t. 98. auctore CHREBLERO. in M. Dolaz & Geneva. *Eruicopis perpusilla*
393. ORNITHOPODIUM caule prostrato, foliis pinnatis, siliquis umbellatis, articulatis. *Ornithopodium Dodon. cereal.* p. 155. in agris trans Rheum prope Basileam.
394. GALEGA foliis ellipticis, spinis & siliquis acutis. *Galega* RIVIN. t. 72. in M. Randenberg & Rhätia.
395. HEDYSARUM caule erecto, ramoso, foliis ovatis, siliquis pendulis levissimis t. 12. *Astragalus alpinus helveticus* SCHEUCHZER. It. II. p. 330. Comm. Lit. Nor. 1736. p. 101. in alpibus aquilejensibus &c. *H. obscurum*
396. ONOBRYCHIS caule erecto, ramoso, floribus spicatis. *Onobrychis* RIVIN. t. 2. *Rupium alpinum*, etiam collium. *Heb. Onobrychis*
397. VULNERARIA caule procumbente, foliis pinnatis sericeis, ovato lanceolatis, umbellis globosis. *Barba Jovis pumila villosa*, flore globose purpureo BREYNE prædr. II. p. 41. *Saleva mons*. *V. montana*
398. VULNERARIA foliis radicalibus ovatis, caulinis pinnatis, umbelliis transversis. *Anthyllis* RIVIN. t. 18. flore flavo, albo, & coccineo. in pratis aridis, etiam alpinis. *Aut. vulneraria*
399. CICER foliis serratis LINN. II. p. 1040. in valle Tellina. *C. Arietinum*
400. COLUTEA foliis ovatis, emarginatis, floribus racemosis. *Colutea* RIVIN. t. 20. *Aquileja*, Neo-comi. *C. arboreus*.
401. ASTRAGALUS caule erecto, ramosissimo, foliis ellipticis, hirsutis, siliquis vesicariis. *Astragaloides elatior erecta*, *viciae foliis*, *siliquis pendulis* AMMAN. Ruthen. p. 148. *Alpes Aquilejenses & vicinæ Valesiacæ*. *Phaca Alpina*

402. ASTRAGALUS caule erecto, stipulis maximis, foliis ovalis, novenis, siliquis vesicariis †. *Astragalus recticaulis hispida* I. B. II. p. 334. Alpes Aquilejenses, Valesiacæ, Rhäticae.
- Phaea Australis*
403. ASTRAGALUS caule ramoso, prostrato, foliis lanceolatis, florum alis emarginatis †. Annon *Astragaloides alpina spinosa glabra*, foliis acutioribus TILL. Hort. Pisani. t. 14. f. 1. Alpes Valesiacæ Rupi proximæ, etiam aquilejenses.
- & - Alpinus*
404. ASTRAGALUS caule procumbente ramoso, foliis ovatis, siliquis inflatis, pendulis, hirsutis. *Astragalus alpinus minimus* LINN. Flor. Lapon. t. 9. f. 1. Prata subalpina, ipsæque alpes.
- & Tragacantha*
405. ASTRAGALUS petiolis ramorum spinescentibus. *Tragacantha* CLUS. posth. p. 60. alpina & subalpina Valesiacæ inferioris & vicinæ Aquilejæ.
- & lanuginosus*
406. ASTRAGALUS spicis aphyllis, foliis lanceolatis hirsutis, siliquis erectis, inflatis, semibilocularibus t. 13. *Astragalus Pyrenaicus Barbæ Jovis folio, non ramosus* flore ochroleuco glomerato SCHREUCHZER. It. IV. p. 330. alpina.
407. ASTRAGALUS scapis aphyllis, foliis ovato lanceolatis, glabris, siliquis inflatis, hirsutis, ovatis †. Summæ alpes Valesiacæ, nova, nondum satis certa civis.
- & montanus*
408. ASTRAGALUS foliis ovato lanceolatis, sericeis, siliquis erectis, inflatis, subhirsutis. *Onobrychis* IV. CLUS. p. 755. 756. alpina.
- & liceus*
409. ASTRAGALUS caule ramoso, diffuso, spicis erectis, siliquis inflatis, rotundis, unguiculatis. *Glaux Rivin.* t. 108. in agris calidioribus.
- & uraleus*
410. ASTRAGALUS scapis aphyllis, foliis ovato lanceolatis, sericeis, siliquis turgidis, hirsutis, erectis, styliferis t. 14. It. Helv. II. 83. t. 2. alpina *Juga nostra* & Valesiaca. Etiam in vallem Valesiacæ inferioris descendit.
- & pilosus*
411. ASTRAGALUS caule erecto, ramoso, ex alis spicifero, siliquis teretibus Comm. Gotting. Vol. 1. tab. 12. *Cicer montanum lanuginosum* erectum C.B. prodr. p. 48. *Oedoturi*, etiam in Rhätia.
- & pubescens*
412. ASTRAGALUS caule subrecto, ramoso, foliis linearibus

nearibus, sericeis, vexillis longissimis. *Onobrychis purpureo flore* CLUS. pann. p. 751. 752.  
ad vias Valesiæ.

413. ASTRAGALUS caule prostrato, foliis ovatis, scapis brevibus racemosis, siliquis subtriquetris incurvis. *Astragalus RIVIN.* t. 103. ad vias inque sylvis.

414. ASTRAGALUS caule procumbente, scapis radicatis aphyllis, foliis ovatis, vexillo longissimo, silique teretibus. *Polygala CAMER.* epit. p. 929.

415. ASTRAGALUS acaulos, floribus summæ radici insidentibus, foliis ovatis, petiolis tomentosissimis. *Astragalus acaulos flore luteo* BUXBAUM. Cent. III. t. 38. f. 2. in valle S. Nicolai inter larices.

416. OROBUS caule simplicissimo, foliis senis, ovatis, acutis LINN. *Asperula* DIOSCOR. COLUMN. *phytobasan.* p. 60. in sylvis vulgo.

417. OROBUS caule simplici, foliis senis, ellipticis, radice tuberosa. *Astragalus sylvaticus* THAL. p. 7. ic. 1. in sylvis abunde.

418. OROBUS caule ramoso, foliis ovatis duodenis. *Orobus foliis Viciae* RIVIN. t. 60. in dumetis agri Aventicensis, Aquilejæ.

419. OROBUS caule ramoso, erecto, foliis ovato lanceolatis. *Orobus alpinus latifolius* C. B. prodr. p. 149. in sylvis Aquilejensibus.

420. ERVUM RIVIN. t. 61. Bernæ seritur.

421. LENS RIVIN. t. 35. in vineis Valesiæ.

422. VICIA foliis linearibus, siliquis racemosis, dispermis, hirsutis. *Cracca minor* RIVIN. t. 53. in segetibus.

423. VICIA foliis linearibus, siliquis gemellis glabris. *Cracca minor siliquis glabris* RIVIN. t. 13. in agris montosis.

424. VICIA foliis linearibus sericeis, racemis multifloris reflexis, stipulis integerimis. *Cracca RIVIN.* t. 49. in segetibus & pratis humidiis.

425. VICIA foliis ellipticis, floribus racemosis erectis, stipulis argute dentatis. *Vicia Onobrychidis* C. B. prodr. p. 149. in segetibus Valesiæ inferioris.

*O. Glycyphloios*

*O. Monspeliana*

*O. Tragacanthoides*

*O. verus*

*O. tuberosus*

*O. niger*

*O. luteus*

*E. Erilia*

*E. leuca*

*E. hirsutum*

*E. tetrasperma*

*V. Cracca*

- V. silvatica* 426. *VICIA* foliis ovatis, stipulis argute dentatis, siliquis racemosis pendulis t. 12. *Vicia pulchrum genus multifolium*, *Galega quibusdam* I. B. III. p. 309. in nemoribus, & ad vias subalpinas.
- V. Diuuelorum* 427. *VICIA* foliis ovatis, oblongis, stipulis serratis, siliquis racemosis, pendulis. *Cracca sylvatica RIVIN.* t. 50. *Rarius circa Basileam, Tigurum, Solodurum, in transalpinis.*
- V. pisiformis* 428. *VICIA* foliis ovatis, maximis, siliquis racemosis pendulis. *Cracca flore ochro'euco RIVIN.* t. 52. *Lobelius* in *Helvetia nasci* scripsit, nuper non repertam.
- V. sepium* 429. *VICIA* foliis ovatis oblongis, scapis brevibus quadrifloris. *Vicia sepium perennis* I. B. II. p. 313. ad sepes & in sylvis,
- V. sativa* 430. *VICIA* foliis imis ovatis, superioribus linearibus, scapis brevissimis, bifloris. *Vicia angustifolia RIVIN.* t. 55. in segetibus.
- L. palustris* 431. *LATHYRUS* foliis senis, floribus racemosis. *Lathyrus palustris* flore *Orobi nemorensis verni* RUPP. ed II. p. 260. t. 1. in pratis uidis circa lacus helveticos.
- L. Heterophyllus* 432. *LATHYRUS* caule alato, foliis quaternis & binis lanceolatis, scapis multifloris. *Lathyrus sylvestris major angustifolius* I. B. II. p. 704. circa les Passes, suspecta species.
- L. latifolius* 433. *LATHYRUS* caule alato, foliis ovato lanceolatis, rigidis, scapis multifloris. *Lathyrus Narbonensis RIVIN.* t. 40. circa Neocomum.
- L. silvestris* 434. *LATHYRUS* caule alato, foliis geminis ensiformibus. *Lathyrus sylvaticus RIVIN.* t. 39. Passim in dumetis.
- L. tuberosus* 435. *LATHYRUS* scapis multifloris, foliis ovatis, capreolis trifidis. *Lathyrus arvensis RIVIN.* t. 42. Passim in segetibus planioribus.
- L. pratense* 436. *LATHYRUS* scapis multifloris, foliis lanceolatis, capreolis simplicibus. *Lathyrus pratensis RIVIN.* t. 43. in pratis subudis.
- L. hirsutus* 437. *LATHYRUS* foliis geminis, ellipticis, floribus solitariis & geminis, siliquis hirsutis. *Lathyrus siliquaversuta RIVIN.* t. 41. Passim in segetibus,

438. LATHYRUS foliis geminis, gramineis, stipulis folii latitudine, petiolis unifloris, siliquis alatis. *Lathyrus siliqua latiori* RIVIN. t. 47. in agro Vaudensi. *L. sativus*
439. LATHYRUS foliis lanceolatis, stipulis latissimis, scapis brevibus, unifloris, siliquis brevissime alatis. *Lathyrus flore rubro* I. B. II. p. 502. etiam in Vaudensi agro. *L. lutea*
440. LATHYRUS foliis gramineis, petiolis unifloris setigeris, siliquis longis erectis. *Lathyrus folio tenuiori, floribus rubris* BUXBAUM. Cent. III. p. 29. t. 42. f. 2. circa Branson Valoisæ. *L. Aquatilis*
441. LATHYRUS pedunculis unifloris, foliis gramineis, stipulis minimis. *Nissolia vulgaris* LINDERN. hort. Als. p. 73. ic. circa Basileam & in segetibus M. Juræ. *L. Uibolia*
442. LATHYRUS aphyllus, stipulis sagittatis latissimis. *Aphaca* DODON. certal. p. 157. in segetibus. *L. Aphaca*

I. I. IV. TETRAPETALE SILIQUOSÆ.

STAMINIBUS SENIS.

QUORUM DUO BREVIORA.

I. SILIQUOSÆ,

443. LEUCOJUM foliis glabris, lanceolatis, integermis. *Leucojum aureum* MATTHIOL. p. 877. In muris vetus. *Cheiranthus cheiri*.
444. LEUCOJUM foliis acute dentatis, amplexicaulibus, si quis nurantibus incanis *Flor. Dan.* t. 62. in rupibus Helvetiæ calidioris. *C. Turrito*
445. LEUCOJUM foliis oblongis dentatis, spica nutante. *an Draba succentra tertia* CLUS. pann. p. 463.  
464. alpium editiorum.
446. LEUCOJUM foliis levissimis, rariter dentatis, imis petiolatis ovatis, caulinis amplexicaulibus. *Turritis foliis caulem ambeuntibus polyceratione*  
*BOCCONE mus. di plant. p. 49. t. 71.* in rupibus alpinis, potissimum aquilejensibus. *C. bellidifolia*

447. LEUCOJUM foliis radicalibus subrotundis, scabris, dentatis, cauliis amplexicaulibus hirsutis. *Ara-bis bellidifolia* CRANZ. fasc. I. p. 44. n. 4. iisdem locis, rarer.

*H. inodora*

448. HESPERIS caule hirsuto, foliis ovato lanceolatis, ferratis, periolatis, subasperis. *Hesperis sylvestris inodora* ad RUPP. t. I. p. 78. in ruderis rarer.

- Chieranthus alpinus* 449. HESPERIS foliis glabris, linearibus, lanceolatis, obiter dentatis t. 14 †. *Leucojum angustifolium alpinum* flore sulfureo ALLIONE spec. f. 20. ad pedem rupium M. Chasseral: in M. Creux du Vent au pertuis de la Bise.

450. HESPERIS foliis linearibus lanceolatis, obiter dentatis, siliquis erectis tetragonis. *Leucojum syl-vestre* CLUS. Pann. p. 337. 338. ad vias Va-lesiae & Helvetiae transalpinæ.

- A. cypria* 451. ARABIS caule ramoso, folioso, diffuso, foliis amplexicaulibus dentatis, incanis. *Draba II.* CLUS. Pann. p. 452. in rupibus humiis mon-tanis & alpinis.

- A. Thalica* 452. ARABIS foliis radicalibus petiolatis, ovatis, den-tatis, caule subnudo, ramoso. *Pilosella si qua-ta minor* THAL. ic. I. locis aridis & in agri sterilibus passim.

453. ARABIS multicaulis, foliis radicalibus, scabris, dentatis, dentibus ciliatis †. *Hesperis alpina minor*, flore albo, siliquis longis. RAJ. *Syllog. plant. exter.* p. 296. in M. Saleva.

- Braffica Alpina* 454. TURRITIS foliis glaberrimis, radicalibus petiola-tis, rotundis, incurvis, caulinis amplexicau-libus, sagittatis, obtusis †. *Braffica alpina peren-nis* RUPP. p. 75. in M. Surchamp.

- C. glabra* 455. TURRITIS foliis radicalibus dentatis, hispidis, caulinis integerrimis, amplexicaulibus, glabris. *Glastifolia cichoroides* I. B. II. p. 836. Non rara ad vias inque rupestribus.

- E. hirsuta* 456. TURRITIS foliis hispidis, caulinis amplexicauli-bus LINN. p. 930. *Barbarea muralis* I. B. II. p. 869. in rupibus, etiam in agris.

- Braffica orientalis* 457. ERUCA foliis glabris integerrimis ovatis. *Braffi-ca campestris* I. CLUS. hist. p. 127. *Mulhusia*.

458.

458. ERUCA caule paniculato, foliis nervosis, ovato lanceolatis, integerimis. *Arabis quibusdem dicta planta CAMER. Epit. p. 341.* In Vallesia valli Augustæ contermina, ad sepes. *Sisymbrium strictissimum*
459. ERUCA caule hirto, foliis hirsutis, semipinnatis, pinnis subrotunde deritatis. *Leucojum terrestre majus frigidarum regionum COLUMN. p. 260.* *Raparia erucastrum*
262. Et ♂ Eruca sylvestris minor bursæ pastoris folio italica BARRELIER ic. 1016. Prior ad fossas agri aventicensis: altera ad ripas & vias Aquileja & Valesiae. *Sisymbrium supinum*
460. ERUCA foliis pinnatis, pinnis acutissime serratis. *Eruca fruticosa Tanaceti folio indica ZANON.* *S. tanacetifolium*  
*bifl. plant. t. 22. in M. S. Bernhard.*
461. ERUCA foliis glabris pinnatis, pinnis linearibus difformibus. *Sinapi sylvestre DODON. p. 707.* *S. tenuifolium*  
*Basileæ, Geneva. In Vallesia ad vias, inque muris.*
462. ERUCA foliis scabris, semipinnatis, pinnis rectangularibus, rarer dentatis. *Eruca cœrulea in arenosis crescens. C. B. Prodr. p. 40.* Basileæ in gla-  
reosis. *Burgdorfi in rupibus arenosis.* *S. areosolum*
463. SINAPI foliis radicalibus pinnatis, hirsutis, incanis, cornu sua siliqua breviori. *Erysimum foliis subincanis siliquis brevissimis HERMAN Paradisi Batav. p. 155.* in agris versus Alschweiler. *Sinapi incana*
464. SINAPI foliis tetragonis, hirsutis, floribus venosis. *Eruca sativa DODON. p. 702.* ad vias Aquilejæ & Valesiacas. *Raparia erucina*
465. SINAPI glabris, siliquis tetragonis. *Sinapi siliqua latiuscula, glabra, semine rufa, s. vulgare I. B.* II. p. 855. Agauni & passim in planicie. *S. nigra*
466. SINAPI siliquis hispidis, rostro longissimo, LINN. *S. alba*  
p. 933. *Sinapi album siliqua hirsuta semine albo & rubro I. B. II.) p. 856.* in maceziis & ru-  
derosis.
467. SINAPI siliquis multangulata, torose turgidis, pro prio rostro longioribus LINN. p. 933. *Irion. S. arvensis*  
FUCHS p. 256. in agris.
468. RAPHANUS siliquis teretibus articulatis, levibus, unilocularibus LINN. p. 935. *Lampsana apula P. inii & Dioscoridis COLUMN. p. 261.* in agris. *Raphanistrum*

469. DENTARIA foliis quinis digitatis. *Dentaria minor* CAMER. Epit. p. 708.  
*D. pentaphyllum*  
 C. *Dentaria pentaphyllum* V. CLUS. Pann. p. 453.  
 in sylvis subalpinis & montanis.
470. DENTARIA foliis inferioribus pinnatis, supremis simplicibus, LINN. p. 912. *Coralloides* CORD. p. 151. WAGNERUS habet, non certam civem.  
*D. Dulcis*  
*C. impatiens*
471. CARDAMINE foliis pinnatis, imis obtuse lobatis, caulinis acute dentatis, floribus apetalis. *Cardamine impatiens*, P. ALPIN. Exot. p. 331.  
 in subalpibus frequens, etiam Rupe.
472. CARDAMINE caule foliisque pinnatis, hirsutis, subrotundis. *Silymbrium aquaticum* alterum CAMER. Epit. p. 270. in sylvis circa Farnsberg &c.  
*C. hirsuta*
472. β. CARDAMINE caule glabro, foliis subhirsutis, imis subrotundis. *Cardamine IV.* DALRCH. LUGD. p. 659. in glaciis & pratis circa Roche. (\*)
473. CARDAMINE foliis pinnatis, subrotundis, angulosis. *Nasturtium aquaticum majus* & *amarum* C. B. Prodr. p. 45. Passim in aquosis.
475. CARDAMINE foliis ternatis obtusis, caule subnudo LINN. p. 913. *Cardamine alpina* CLUS. pann. p. 455. 456. in M. Speluga.  
*C. trifolia*  
 β. *Cardamine alpina* foliis latis, teneris, longo pediculo insidentibus SCHEUCHZER. It. VI. p. 454. huc pertinet.
476. CARDAMINE foliis radicalibus petiolatis, ovatis, caulinis ovatis, aut pinnatis, obtusis. *Barbarea montana* integro folio BOCCONE Mus. di piante t. 88. Passim in altioribus & saxosis alpium.  
*C. Nellyifolia*
- β. *Nasturtium alpinum minus* Resedæ folio. C. B. Prodr. p. 45. Similibus locis.
477. ERYSIMUM foliis scabris, lanceolatis, integerrimis, LINN. p. 923. *Erysimum tertium* TABERN. p. 449. Basileæ, Biennæ, in agris & ad vias.  
*C. reedifolia*
- 478.

(\*) Hæc plantula, quam Cl. viri, ob nescio quam causam, tetraestemonem fecerunt, quatuor habet manifestissima & longa stamina, & duo breviora: petala parva, longe petiolata; priori certe proxima, durior paulum & erectior.

478. ERYSIMUM foliis pinnatis, pinnis rectangularis acutis, extrema triangulari maxima. siliquis adpres. sis. *Erysimum Irio* I. TABERN. p. 448. ad vias. *E. officinale*
479. ERYSIMUM foliis pinnatis, prima extrema maxima, subrotunda. *Barbarea* I. B. II. p. 868. in *E. Barbarea* fossis.
480. ERYSIMUM foliis cordatis. *Alliaria* FUCHS p. 104. *E. Alliaria* ad vias & in sylvis meduis.
481. SISYMBRIUM foliis radicalibus ovatis, dentatis, caulinis pinnatis, pinnis linearibus, extrema maxima. an *Hesperis* flore albo minimo, siliqua longa, folio profunde dentato. *Hort. Elth. f.* 177. in editioribus alpium. *S. Burifolium*
482. SISYMBRIUM foliis pinnatis, pinnis rubrotundis, spicis sessilibus. *Nasturtium aquaticum* offic. DODON. *Cereal* p. 246. in fossis & rivis lentioribus. *S. nasturtium*
483. SISYMBRIUM siliquis sessilibus extrorsum recurvis. *Irio alter vulgaris* CAMER. *Epit.* p. 344. *S. polyceratum* Olim Bernæ crescebat, nunc destructum: suspesta planta.
484. SISYMBRIUM pinnis & pinnulis pinnatis, lacinias linearibus subhirsutis. *Sophia Chirurgorum* Lo. BRL. IC. p. 738. in coemeteriis & ad vias. *S. Soytua*
485. SISYMBRIUM foliis pinnatis, pinnis dentatis distitis. *Eruca palustris minor* TABERN. p. 447. *S. Silvestre* Basileæ, Genevæ.
486. RADICULA foliis integris & pinnatifidis, petatis calyce longioribus. *Raphanus aquaticus* alter C. B. *Prodr.* p. 37. *S. subriuum* *austriuum*
487. RADICULA foliis pinnatis, pinnis dentatis, petatis calyce brevioribus †. *Radicula sylvestris* sive *palustris* I. B. II. p. 866. Passim in aquosis.
- II. SILICULOSÆ.
488. ALYSSUM foliis imis subrotundis, caulinis pinnatis, filiformibus, amplexicaulibus. *Alysson* foliis *S. pyrenaicum* *pinnata*.

*pinnatis, multiformibus, floribus racemosis luteis ALLIONI specim. t. 7. p. 40. + in alpibus Graeis, circa Basileam.*

489. ALYSSUM foliis sagittatis, siliquis cordiformibus.

*Myagrum sativum* L. *Myagrum* DODON. Coreal. p. 130.  
*Myagrum sativum* C. B. Prodr. p. 51. Basileæ, Lausannæ, in Vallesia.

490. ALYSSUM foliis scabris, radicalibus petiolatis, ovatis, dentatis, caule subnudo flexuoso. *Thlaspi petraeum nyagroides* PON. baid. p. 185. in alpinis & subalpinis, etiam montanis.

*M. sativum*  
491. ALYSSUM foliis radicalibus petiolatis, hirsutis, caulinis lanceolatis, levissimis +. *Ocroduri* & in Vicinia.

492. ALYSSUM subfruticosum foliis ellipticis scabris.

*Thlaspi luteo flore incanum discoides umbellatum montanum* COLUMN. Ecphras. p. 280. 281. ad rupes fabulosas Burgdorff: circa Birsek.

493. ALYSSUM caulis fruticosis diffusis, foliis subrotundis, incanis + GERARD Flor. Prov. t. 17. f. 2. in M. Stok Valesiæ superioris.

494. ALYSSUM foliis ellipticis scabris, calycibus persistentibus. *Alyssum minimum* CLUS. Pann. p. 473. in arvis & macilentis.

495. ALYSSUM incanum, serpylli folio, fructu nudo. *A. canum* I. R. H. Circa Branjon.

496. DRABA cauliculis nudis, foliis subhirsutis, tridentatis. *Alpine minima* TABERN. p. 708. in aridis.

- D. stricta* 497. DRABA cauliculis subnudis, foliis ovatis tomentosis. *Draba austriaca* CRANZ. fasc. 1. t. 194.

498. DRABA cauliculis nudis, foliis linearibus ciliatis. *Sedum alpinum* VI. CLUS. pann. p. 491. in subalpinis & submontanis.

499. DRABA caule ramoso, foliis cordatis, dentatis, amplexicaulibus LINN. p. 909. *Draba minima muralis discoides* COLUMN. p. 272. 279. Circa Basileam ad sepes.

500. LUNARIA perennis, siliquis ovato lanceolatis. *Viola lunaria latifolia odorata* CLUS. bist. p. 297. in rupibus Valesiæ inferioris & Juræ &c.

501. BISCUTELLA siliqua levi, foliis dentatis asperis.  
*Leucojum alyssoides umbellatum montanum* Co. *D. levigata*  
 LUMN. p. 283. 284. in alpinis & subalpinis.
502. CORONOPUS BLAKWELL t. 120. Geneva, Ba. *Cochlearia*  
*sileæ ad vias.*
503. NASTURTIUM foliis radicalibus subrotundis, cau-  
 linis oblongis, subsinuatis LINN. p. 903. *Cochlearia officinalis*  
*learia* DODON. pempt. p. 594. in rupibus die  
*Grand Val;* in paludosis haud longe a rupe.
504. NASTURTIUM foliis radicalibus lanceolatis crena-  
 tis, caulinis incisis. *Raphanus magna* DODON.  
 p. 678. *Nidoviae.* *C. avicinata*
505. NASTURTIUM foliis ovato lanceolatis, integris,  
 serratis. *Lepidium* PLIN. 716. in alpibus aqua-  
*lejenibus: Arbergæ ad Arolam.* *L. sativum*
506. NASTURTIUM fruticosum, foliis glaucis, linea-  
 ribus, subhirsutis. *Thlaspi fruticosum alterum*  
 LOBEL. p. 218. in Valesia inferiori SCHEUCH-  
 ZER, nuper non visum. *T. subulatum*
507. NASTURTIUM foliis imis pinnatis, incisis, superio-  
 ribus linearibus, integerimis. *Iberis MATTHIOL.*  
 p. 293. in *Vaudenfi* agro ad vias. *T. granosifolium*
508. NASTURTIUM apetalum, foliis pinnatis, radica-  
 lium pinnis semipinnatis, caulinis simplicibus.  
*Thlaspi angustifolium* FUCHS p. 307. ad vias  
*Basileæ, in agro Vaudenfi, Rupe.* *L. murale.*
509. NASTURTIUM foliis imis petiolatis ovatis, cau-  
 linis sagittatis, dentatis. *Thlaspi latifolium*  
 FUCHS p. 306. *Thlaspi* I. MATTH. p. 566. ad  
*vias.* *T. angustifolium*
510. NASTURTIUM foliis imis ovatis, reliquis am-  
 plexicaulibus cordatis *Thlaspi alterum minus*  
*rotundum* COLUMN. p. 276. in arvis, vallis,  
 ad vias. *T. perfoliatum*
511. NASTURTIUM siliquis orbiculatis, planis, foliis  
 oblongis, dentatis, glabris. *Thlaspi cum sili-  
 quis latis* I. B. II. p. 923. *T. arvense*
512. NASTURTIUM foliis pulposis, ellipticis, siliculis  
 alatis emarginatis. *Lithonthlaspi parvum car-*  
*ne* *T. saxatile*

- geo rotundo folio COLUMN. Ecphræs. p. 277. 279.  
in rupestribus circa Ruchenette*
- §13. NASTURTIUM. *Alpinum capsula nasturti hor-  
tenis I. B. II. p. 918. Planta nuperis ignota*
- E. Versa pastoris* §14. NASTURTIUM si quis triangularibus. *Bursa pa-  
storis CAMBR. epit. p. 340. ad vias.*
- Lepidium pratense* §15. NASTURTIUM foliis pinnatis, radicalibus ovato-  
lanceolatis, caulinis linearibus. *Cardamine pu-  
lla saxatilis montana diographes COLUMN. p.  
273. 277. in rupibus circa Porte du Sex, circa  
Genevam.*
- L. Alpinum.* §16. LEPIDIUM foliis pinnatis, pinnis ovatis æquali-  
bus. *Lepidium Halleri CRANZ. fasc. I. t. I. f. 3.  
in alpinis ubique.*
- J. oœus rotundi-  
folia* §17. LEPICTIUM caule repente, foliis ovatis, amplexi-  
caulibus. *Enum. Stirp. helv. ALLIONE Spec. p. 27. t.  
4. in alpinis glareosis frequens.*
- T. Thlaspi monta-  
næ.* §18. LEPICTIUM caule erecto, foliis radicalibus petio-  
latis, caulinis amplexicaulibus sagittatis. *Thlas-  
pi Badense CLUS. pann. p. 275. 276. in mon-  
tanis rupestribus.*
- H. annua.* §19. LEPICTIUM caule erecto, foliis radicalibus petio-  
latis, caulinis ovatis, amplexicaulibus. *Thlaspi  
pumilum CLUS. pann. p. 468. 469. in summis  
alpibus.*
- G. rotundifolia* §20. IBERIS foliis dilatatis, dentatis, floribus umbel-  
*j. Quara* lati. *Tblaspidium folio iberidis RIVIN. tetrap.  
irreg. t. 112. in agris vaudensibus.*
- J. nudicaulis* §21. IBERIS foliis pinnatis, pinnis ovatis acutis. *Na-  
sturtium petraeum TABERN. p. 451. in sabulo-  
sis circa Genevam, Basileam &c.*
- M. myagrum* §22. RAPISTRUM foliis amplexicaulibus auriculatis,  
*- planifolium* acutis. *Pseudo myagri alia species minor, vas-  
culis rotundioribus CAMERAR. Epit. p. 902. n. 5.  
Passim circa Bevieux, in Valesia, circa Biennam,  
Moncharans &c. in agris planioribus.*
- J. hectoria* §23. ISATIS foliis radicalibus petiolatis, ovatis, cauli-  
nis amplexicaulibus. *Isatis sylvestris CAMERAR.  
Epit. p. 410. in Valesia ad vias.*

- §24. MYAGRUM loculo secundo conico, sterili biloculari. *Myagrum monospermum latisolum*, C. B. *M. perfoliatum*  
prodr. p. 51. §2. circa Bühlbercken.
- §25. MYAGRUM siliquæ articulo primo stricto, altero globoso striato. *Rapistrum monospermum* C. B. *M. perenne*  
prodr. p. 37. circa Aquilejam &c.
- §26. BUNIAS siliqua tetragonia, quatuor alis emarginatis. *Sinapi echinatum* L. B. II. p. 856. in sege. *B. eruago*.  
tibus Valesiæ, circa Chexbres.
- §27. TRAPA foliis natantibus, petiolis verticosis. *Tribulus aquaticus* CAMERAR. epit. p. 715. in lacu Clavennensi. *T. natans*.

## I. II. V. MEIOSTEMONES.

## I. TETRAPETALÆ DISTEMONES.

- §28. FRAXINUS apetala, foliis pinnatis serratis. *Fraxinus* MATTHIOL. p. 135. in collibus & sylvis. *F. excelsior*

## II. MONOPETALÆ DISTEMONES.

- §29. JASMINUM foliis oppositis lanceolatis. *Jasminum album* TABERN. p. 886. in valle Tellina & Aquilejensibus. *J. officinale*
- §30. LIGUSTRUM MATTHIOL. p. 170. ad sepes. *L. vulgare*
- §31. SYRINGA foliis ovato cordatis LINN. *Syringa flore varuleo* CLUS. hist. p. 58. in sylvis. *S. vulgaris*
- §32. VERONICA foliis lineari lanceolatis, racemis ex alis paucifloris. *Veronica aquatica angustifolia* RIVIN. monop. irreg. t. 96. passim in fossis. *V. austellata*
- §33. VERONICA foliis lanceolatis, serratis, glabris, ex alis racemosa. *Beccabunga minor* RIVIN. t. 100. in fossis vulgo. *V. angustifolia*
- §34. VERONICA foliis ovatis, serratis, glabris, ex alis racemosa. *Beccabunga* RIVIN. t. 100. vulgatissima in fossis. *V. Beccabunga*
- §35. VERONICA foliis hirsutis, nervosis, sessilibus, cordato lanceolatis, floribus racemosis, longe petiolatis. *Veronica pretenensis omnium maxima* BUTZSCHL. Cent. I. t. 24. in sylvis circa Bernam &c. *V. latifolia*

- §36. *VERONICA* foliis cordatis, subrotundis, hirsutis, nervosis, ex alis racemosa. *Veronica pratensis latifolia* RIVIN. t. 94. in pratis & ad vias.
- v. clavata*
- §37. *VERONICA* foliis cordatis obtusis, nervosis, serratis, racemis densissimis. *Veronica montana* RIVIN. t. 95. ad vias montanas.
- v. Teucrium*
- §38. *VERONICA* foliis imis ellipticis, dentatis, supremis lanceolatis, ex alis racemosa. *Veronica angustifolia minor* RIVIN. t. 95. circa Bileam.
- v. prostrata*
- §39. *VERONICA* caule procumbente, foliis hirsutis, cordatis, retusis, racemis paucifloris. *Veronica procumbens* RIVIN. t. 93. in sylvis Bernæ & alibi.
- v. officinalis*
- §40. *VERONICA* caule procumbente, foliis scabris, petiolatis, ovatis, ex aliis racemosa. *Veronica CAMERARI* epit. p. 461. vulgo in sylvis.
- v. Epiphylla*
- §41. *VERONICA* caule nudo, foliis ovatis, serratis, racemo paucifloro. *Veronica alpina pumila caule aphylo* BOECON. mus. di plant. t. 1. & 9. in alpinis, etiam montibus altioribus.
- v. spicata*
- §42. *VERONICA* foliis ellipticis, serratis, conjugatis, floribus spicatis. *Veronica spicata minor* VAILANTI. t. 33. f. 4. passim in gramineis aridis & calidis.
- v. major*
- §43. *VERONICA* caule simplici, pauciflora, foliis scabris, serratis, ovatis, spica pauciflora tab. 15. *Veronica alpina Bellidis folio hirsuto* C. B. prodr. p. 116. in alpibus insprimis Aquilejensibus.
- v. Bellidifolia*
- §44. *VERONICA* caule simplici, foliis ovatis, glabris, subserratis, spica pauciflora t. 15. *Teucrium Etcherianum* CLUS. pann. p. 616. in alpibus ubique.
- v. Alpina*
- §45. *VERONICA* caulis fruticosus, declinatis, foliis glabris ellipticis, dentatis, floribus in summitate confertis, petiolatis t. 16. *Veronica tertia* CLUS. pann. p. 620. 621. in alpinis & subalpinis.
- v. fruticulosa*
- §46. *VERONICA* caule recto, foliis ovatis, erenatis, glabris,
- v. Saxifraga*

# M E I O S T E M O N E S .

glabris, petiolis ex alis unifloris, brevissimis.  
*Veronica erecta sylvestris* RIVIN. t. 93. ad vias  
& in pratis.

- §47. VERONICA caule subpiloso, foliis ovatis, glabris,  
crenatis, pedunculis unifloris. *Veronica minima*  
*Clinopodii minoris* folio, glabra *Romana* VAIL-  
LANT. t. 23. f. 3. locus incertus. *v. minima*
- §48. VERONICA caule erecto, foliis ovatis, subhir-  
sutis, dentatis, petiolis brevissimis. *Alysson*  
COLUMN. *phytobas.* p. 27. 28. in pratis. *v. arvensis*
- §49. VERONICA caule procumbente, foliis petiolatis,  
ovatis, crenatis. *Veronica folio Chamædryos*  
RIVIN. t. 97. in hortis & agris. *v. agrestis*
- §50. VERONICA caule procumbente, foliis lobatis,  
petiolatis, pedunculis unifloris. *Veronica Hedera*  
*folio* RIVIN. t. 97. in hortis & agris. *v. hederafolia*
- §51. VERONICA foliis ovatis, tripartitis & quinque-  
partitis, petiolis unifloris. *Veronica folio Ruta*  
RIVIN. t. 96. Basileæ, Genevæ &c. *v. Riptigloa*
- §52. VERONICA foliis ovatis, tripartitis & quinque-  
partitis, petiolis unifloris brevissimis. *Veronica*  
*montana* RIVIN. t. 96. in Valesia inferiori. *v. verus*

## III. MONOSTEMONES.

- §53. STELLARIA foliis petiolatis, subrotundis. *Calli-* *Callitricha versa-*  
*triche Plinii* COLUMN. p. 315. 316. ubique in fos-  
sis aqua plebis.
- §54. STELLARIA foliis imis linearibus, supremis sub- C. var.  
rotundis †. *Stellaria aquatica* LOBEL. p. 792.  
circa Bernam.
- §55. STELLARIA foliis omnibus linearibus. *Lenticula* C. *autumnalis*  
*palustris*, *angustifolia*, folio in apice bisepto LOB-  
SEL. ic 38. iisdem locis.
- §56. NAJAS fructu monospermo. *Fluvialis latifolia* N. *Mariua*  
*fructu minus obtuso monospermo* MICHELI p. 11.  
t. 8. f. 2. Basileæ.



## I. I. VI. ISOSTEMONES.

## I. FLORE DIFFORMI POLYPETALO.

557. *IMPATIENS* caule geniculato, pedunculis ramosis, foliis petiolatis, ovatis, crenatis. *Balsamina altera, noli me tangere* COLUMN. *ecphras.* p. 150. in umbrosis sylvarum & urbium.
- J. uscive tangere*
558. *VIOLA* acaulis, stolonifera, foliis cordatis LINN. *V. florata* p. 1324. *Viola RIVIN.* pentap. irreg. t. 117. ad sepes.
- v. lutea*
559. *VIOLA* acaulis, foliis cordatis hispidis LINN. p. 1724. *Viola martia hirsuta inodora* HIST. OXON. II. p. 415. t. 9. f. 1.
- v. palustris*
560. *VIOLA* acaulis, foliis reniformibus. *Icon ORDRA.* t. 83. in alpinis humidis.
- v. pinuata*
561. *VIOLA* acaulis, foliis multifidis obtusis. *Viola acaulis*, foliis palmato multifidis & laciniatis ALLIONE *Misc. Taur.* III. p. 181. t. 5. in summis alpibus Rhaticis & Valesiacis.
- v. laevigata*
562. *VIOLA* caule procumbente ramoso, foliis petiolatis, cordatis. *Viola inodora major* RIVIN. t. 117. in sylvis & ad vias.
- v. lutea*
563. *VIOLA* caule debili, foliis petiolatis reniformibus, obtuse dentatis. *Viola flore luteo* RIVIN. t. 119. *v. leucostoma* in petrosis montanis & alpinis.
564. *VIOLA* multicaulis, foliis ovatis, petiolatis, integerrimis. *Viola acutalis foliis uniformibus obtusis integerrimis* ALLIONE p. 14. t. 3. f. 7. in alpibus Aquilejensibus & obversis Valesiacis.
- v. grandiflora*
566. *VIOLA* caule erecto, paucifloro, foliis imis subrotundis, caulinis ellipticis, stipulis semipinnatis maximis t. 17. *Viola montana* II. *purpureo flore* CLUS. *pann.* p. 376. & *V. tricolor* I. EJ. p. 358. & *V. tricolor odoratissima* EJ. ib. in alpibus.
- v. colorata*
567. *VIOLA* caule lato, erecto, foliis ellipticis, crenatis, stipulis semipinnatis. *Viola arborescens* CAMBR. epit. p. 911. in humidis montanis & subalpinis.
- v. involucrata*
568. *VIOLA* caule anguloso, diffuso, foliis ovatis, dentatis, flore calyce duplo longiore. † *Viola tricolor* RIVIN. t. 120. in montanis & subalpinis pratis & arvis.
- v. tricolor*

## II. DICARPÆ. III. CUCURB. IV. SOLAN. 53

- §69. VIOLA caule diffuso, ramoso, foliis ovatis, dentatis, flore calyce paulo majori. *Jacea altera*  
*Camer. epit.* p. 913. *v. tricolor.*
- §70. VIOLA foliis cordato lanceolatis, serratis, stipulis lanceolatis, acute dentatis. *Viola pyrenaica*,  
*Teucr. folio longius caudato* I. R. H. in paisquis M. *Juræ Rajus.* *v. cornuta.*

## II. DICARPÆ.

- §71. ASCLEPIAS ex alis racemosa, caulibus simplicibus erectis, foliis ovato lanceolatis. *Vincetoxicum*  
*DODON. purg.* p. 21. in lapidosis. *v. vires toxicorum.*
- §72. PERVINCA caulibus procumbentibus, foliis ovato lanceolatis, petiolis unifloris. *Clematis Daphnoides* *BLAKWELL.* t. 59. ad sepes. *v. minor.*
- §73. PERVINCA caulibus erectis, foliis ovato lanceolatis, ciatiatis, petiolis unifloris. *Clematis Daphnoides major* *DODON.* p. 406, in lapidosis circa *Tvorne, Grandchamp &c.* *v. major.*

## III. CUCURBITACEÆ.

- §74. BRYONIA foliis palmatis, scabris LINN. p. 1438. *Bryonia alba* *DODON. purg.* p. 230. ad sepes. *D. Alba.*

## IV. SOLANACEÆ.

- §75. SOLANUM caule flexuoso, frutescente, foliis cordatis & tripartitis. *Dulcamara* *DODON. purg.*  
*p. 239.* in aquosis. *S. Dulcamara.*
- §76. SOLANUM inermi, herbaceo, foliis dento angulatis, umbellis nutantibus LINN. p. 266.  
*Solanum hortense* FUCHS p. 686, in hortis & ad vias. *S. nigrum.*
- §77. PHYSALIS foliis conjugatis, cordatis, sinuatis, caule ramoso. *Solanum vesicarium* *DODON. purg.*  
*p. 355.* in umbrosis. *P. Alkekengi.*
- §78. MANDRAGORA *DODON. purg.* p. 362. in M. *Gennero.* *Aconitum Mandragora.*

## §4 ISOSTEMONES. IV. SOLANACEÆ.

- §79. *BELLADONNA* caule herbaceo, brachiato, foliis  
~~*Belladonna.*~~ ovato lanceolatis, integrerrimis. *Solanum lethale*  
 DODON. puer. p. 360. in sylvis cæduis.  
 §80. *HYOSCYAMUS* foliis amplexicaulibus, sinuatis,  
~~*H. uirgin.*~~ floribus sessilibus LINN. *Hyoscyamus* RIVIN.  
 monop. irreg. t. 102. ad vias non frequentissimus.  
 §81. *VERBASCUM* foliis decurrentibus, utrinque to-  
~~*V. Thapsus*~~ mentosis. *Verbascum* CAMER. epit. p. 878. ad  
 vias.  
 §82. *VERBASCUM* foliis ovatis, utrinque tomentosis,  
~~*V. Lychnitis*~~ imis petiolatis, stigmate bicollis. non satis certa  
 species.  
 §83. *VERBASCUM* spica ramosa, foliis ovato lanceo-  
~~*V. nigra*~~ latis, inferioribus petiolatis. *Verbascum luteum*  
 TABERN. p. 565.  
~~*V. Lychnitis*~~ §. *Verbascum* flore albo, parvo I. B. III. p. 813.  
 ad vias.  
 §84. *VERBASCUM* foliis imis petiolatis, cordato lan-  
~~*V. Blattaria*~~ ceolatis, superioribus sessilibus, ovato lanceola-  
~~*nigrum*~~ tis. *Verbascum nigrum* TRAG. p. 217. ad vias.  
 §85. *VERBASCUM* spica rarissima, foliis glabris, serra-  
~~*V. Blattaria*~~ tis, cordato lanceolatis, imis semipinnatis, su-  
 perioribus amplexicaulibus. *Blattaria* flore luteo  
 HOR. AICHSTETT. astiv. ord. 10. t. 4. f. 2. ad  
 vias agri Ebrodunensis, Genevensis.  
 §86. *STRAMONIUM* foliis angulosis, fructu erecto,  
~~*Datura stramonium*~~ muricato, calye pentagono. *Solanum manicum*  
~~*Dioscoridis*~~ COLUMN. phytobas. p. 47. ad vias  
 circa urbes.

## V. ASPERIFOLIE.

- ~~*C. officinale*~~ §87. *CYNOGLOSSUM* foliis ellipticis, lanceolatis, fe-  
 riceis. caule folioso. *Cynoglossum vulgare* MATTH.  
 §88. *CYNOGLOSSUM* foliis alperis, planis, sessilibus,  
~~*C. Apenninum*~~ elliptico lanceolatis. *Cynoglossum* folio vidente  
 I. B. III. p. 600. infrequenter in sylvis subalpinis  
 & montanis.  
 §89. *CYNOGLOSSUM* glandulis faucium glabris. *Cy-  
~~*Myosotis* lappula~~ noglossa minor montana serotina atra* COLUMN.  
 cephras. p. 179. 180. in maris calidis.  
 §90. *SCOR.*

590. SCORPIURUS annuus radice exigua. *Auricula* M. Scorpionea  
*muris cærulea* TABERN. p. 197. in pratis, ad  
vias; in agris.
591. SCORPIURUS radice longa, fibrosa, perenni. *Lycopsis montana cærulea* BARRELIER. IC. 404.  
in aquosis & in dumetis.
592. SCORPIURUS foliis ovatis, spica pauciflora, ca-  
lycib s tomentosis †. *Lithospermum a pinum to-  
mentosum minimum* SCHREUCHZER. It. II p. 137.  
in summis alpibus.
593. HELIOTROPIUM foliis ovatis petiolatis, spicis  
irregularibus simplicibus, supremis gemellis. *He-  
liotropium vulgare* BOCCONE plant. sicut. t. 49.  
in agris pl. viriei.
594. HELIOTROPIUM foliis lingulatis, floribus tubu-  
losis. *Echiodoides flore albo* RIVIN. t. 9. in agris  
planitieis.
595. LITHOSPERMUM caule erecto, ramosissimo, fio-  
ribus calycem vix superantibus. *Lithospermum arvense* TABERN. p. 850. in glareosis & dumetis circa fluvios.
596. LITHOSPERMUM caule procumbente, radicato,  
ramis floralibus erectis. *Lithospermum minus* DODON. p. 85. in dumetis circa Aquilejam,  
Basilam.
597. PULMONARIA foliis radicalibus cordatis, scabris  
LINN. *Pulmonaria altera* MATTHIOL. p. 840. *P. officinalis*  
in dumetis, adque sepes.
598. PULMONARIA foliis radicalibus lanceolatis. *Pul-  
monaria rubro flore* CLUS. pann. p. 671. in syl-  
vis montanis.
599. BUGLOSSUM foliis linguiformibus asperis, spicis  
supremis gemellis. *Buglossa altera* TRAG. p. 232.  
232 in planicie calida, Rhaetia, Valesia.
600. SYMPHYTUM foliis ovato lanceolatis, décurren-  
tibus LINN. *Watwurz*. Weiblein BRUNFELS. I.  
p. 76. ubique in aquosis inque silvis.  
& flore rubro. *Watwurz*-Männlein BRUNFELS.  
l. c. in planicie circa Basilam &c.
601. SYMPHYTUM foliis linguiformibus hispidis. *An-  
chuæ echinoides*, Cerintes flore montana COLUMN.

- p. 182. 183. in Aquilejensi Deminio inque Valesia.
602. CERINTHE solii amplexicanibus ovatis, floris denticulis brevissimis, revolutis. *Cerinthe quorundam* Clus. hisp. p. 140. in montosis sylvis Aquilejensium &c.
- C. major.*
603. ECHIUM alis spiciferis, foliis asperis, lingulatis, calycibus hirsutis. *Echium RIVIN.* t. 7. ad vias.
- E. vulgare*
604. ECHIUM foliis hirtis, linguatis, calycibus pun-  
gentibus, spicis laxis, paniculatis. *Echium flore  
alto CAMER.* epit. p. 758. in Valesia.
- E. italicum*
605. LYCOPOSI S foliis asperimis, undulatis, ferratis, linguliformibus. *Echioides RIVIN.* t. 7. passim ad vias inque ruderosis.
- 606. ASPERUGO calycibus fructus compressis LINN.
- B. procumbens* Borrago minor sylvestris, *Kaoptoxynotous Co-*  
*LUMN.* p. 181. 183. passim in herbosis viarum.
607. BORRAGO foliis asperis lanceolatis, palis florum  
*D. officinalis* duplicatis. *Borago DODON.* p. 627. in hortis,  
ad vias, in maceribus.

## VI. VASCULIFERÆ.

608. PRIMULA foliis hirsutis, rugosis, dentatis, scapis unifloris. *Alisma sylvarum* COLUMN. phytobas. p. 19. in lagro Vaudensi ad vias.
- P. veris* *caerulea*
609. PRIMULA foliis rugosis dentatis, scapis multifloris, floribus exterioribus nutantibus. *Primula veris altera* CAMER. epit. p. 884. in pratis, sylvis.
- P. elatior*
610. PRIMULA foliis rugosis, dentatis, hirsutis, scapis multifloris, floribus omnibus nutantibus. *Alisma pratorum* COLUMN. phytobas. p. 11. in pratis apricis.
- P. officinale*
611. PLIMULA foliis glabris, ellipticis, rugosis, serratis, floribus umbellatis, tubo longissimo †. in summis alpibus Valesiae mediae.
- P. auricula*
612. PRIMULA umbellifera, foliis ferratis, glabris, carnosis. *Alisma* COLUMN. phytobas. p. 17. in alpinis & montanis.
613. PRIMULA foliis subhirsutis, dentatis, scapo pauciflo-

10. † *Auricula ursi II. rubro flore* CLUS. pann. p. 341  
 346. in alpibus passim, inque Valesia inferiori.
614. PRIMULA foliis cuneiformibus, nitidis, scapis unifloris JACQUIN. obs. p. 25. t. 14. *Auricula* *P. auricula*  
*ursi VI.* CLUS. pann. p. 350. CHREBNER supra M.  
*S. Gotthardi* indicat, nuper non visam.
615. PRIMULA foliis ciliatis, ellipticis, carnosis, in *P. indegitolica*  
 tegerrimis. *Auricula ursi IV.* CLUS. pann. p. 359.
616. ARETIA foliis rugosis, acutis, retroversis, scapis brevissimis, unifloris. *Sedum alpinum* F. Gregorii *Rbegiensis* COLUMN. ecpbras. II. p. 63. 65. in alpibus summis australibus Valesiae mediae & superiore.
617. ARETIA foliis subhirsutis, ovatis, caulinulos gentibus, floribus brevissime petiolatis t. 11. in alpibus occidentalibus frequens. *A. helvetica*
618. ARETIA foliis ovatis repandis, scapis unifloris t. 11. in alpibus Aquilejensibus & Penninis. *A. Alpina*
619. ARETIA foliis crassis, rugosis, gramineis, scapis multifloris t. 17. † in alpibus Valesiae inferioris, *Androsace carnea* Abbatiscellorum &c.
620. ARETIA foliis ovatis, villosis, scapis umbellatis. *Sedum alpinum alterum lacteo flore* CLUS. pann. p. 489. 490. in alpibus vulgo. *S. villosa*
621. ARETIA foliis ellipticis lanceolatis, glabris, scapis umbellatis. † *Androsace glabra obtuso folio umbellifera* ALLIONE spec. p. 22. t. 4. in alpibus passim. *Aud. testacea*
622. ARETIA foliis gramineis, scapis paucifloris. *Sedum alpinum tertium lacteo flore* CLUS. pann. p. 490. in Jura M. frequens. *Aud. testacea*
623. ARETIA foliis glabris, ellipticis, rugosis, subtus farinosis, floribus umbellatis. *Primula veris rubro flore* CLUS. pann. p. 340. ubique in aquosis montanis & subalpinis. *P. veris*
624. ANDROSACE stipulis quinis amplissimis. *Androsace altera* CAMER. epit. p. 639. circa Avén Vallesiae. *A. maximowiczii*
625. ANAGALLIS caule procumbente, foliis ovato lanceolatis, petalis ferratis, calycis segmentis subulatis. *Anagallis semina* CAMER. epit. p. 395. in agris planitiei. *Anag. Arvensis*

627. CENTUNCULUS. *Anagallis palustris* VAILLANT.

*C. vivium* p. 12. t. 4. f. 2. ad sumnum lacum Lemanum: circa Domum rubram Bosilea.

628 LYIMACHIA caule decumbente, foliis ovato lanceolatis, petiolis alaribus unifloris. *Anagallis lut. o flore* CLUS. pann. p. 492. 493. in sylvis.

629 LYSIMACHIA caule p. ostrato, foliis subrotundis, petiolis ala ibus unifloris. *Nummularia* CAMBR. epit. p. 755. vulgo in humidis.

*L. nummularia* 630 LYIMACHIA foliis ovato lanceolatis, spicis paniculatis. *Lysimachia* MATTHIOL. p. 349. in aquosis.

*L. vulgaris*

631. LYSIMACHIA racemis alaribus, densissimis, folio brevioribus. *Lysimachia lutea altera* Lobelii, CLUS. t. LIII. circa Hegnau agri Tigurini.

632. HOTTONIA fl. r. m. verticillata spica is. *Sratientes*

*H. palustris* vulgare VAILLANT. mem. 1719. p. 20. passim in fossis, circa tres lacus Neocomensem, Biennensem, Moratensem. Michel fel.

633. MENIANTHES foliis ternatis LINN. *Trifolizum*

*M. trifolista* paustre CORD. p. 96. vulgo in humidis fossis, & inundatis.

634. SOLDANELLA minore folio CLUS. pann. p. 355. in alpibus ubique, in montibus rarius.

635. CYCLAMINUS fl. re cernuo, segmentis revolutis. *Cyclaminus* CAMBR. epis. p. 357. in saxosis subalpinis & Juianis.

*C. Cyclaminus parva radice* I. B. III. p. 553. in sylvis h. ud lo g. Curia Rhaetorum.

*γ. Cyclaminus μενοσοριός* CAMBR. epis. p. 358. inter Flasch & Lucijterg.

636. GENTIANA foliis radicalibus petiolatis, ovatis, fl. ibus pari latit, rotatis, spicatis. *Gentiana*

*G. peregrina* XII. CLUS. pann. p. 292. in aquosis subalpinis, non ubique.

637. GENTIANA caule folioso, foliis ovatis, nervosis, fl. ibus verticillatis, rotatis. *Gentiana* CAMBR. epis. p. 415. in subalpinis & montanis ubique.

638. GENTIANA foliis ovato lanceolatis, nervosis, fl. ibus campaniformibus, fasciculatis, creberrime punctatis.

*G. punctata*

punctatis. *Gentiana major pallida punctis distincta* CLUS. pann. p. 280. in alpibus, non tamen perinde vulgaris.

639. GENTIANA foliis ovatis, lanceolatis, nervosis, floribus campaniformibus, fasciculatis, rarer punctatis. *Gentiana I. f. major purpureo flore* CLUS. pann. p. 277. 278. in alpinis non infrequens.

640. GENTIANA floribus campaniformibus, aliis paucifloris, foliis ovato lanceolatis. *Gentiana Asclepiadis folio* GESNER. pann. p. 280. 281. passim in subalpinis.

641. GENTIANA aliis floriferis, foliis linearibus. *Gentiana angustifolia* CLUS. pann. p. 284. in uidis non rara.

642. GENTIANA caule uniflоро, foliis lanceolatis, flore maximo, campaniformi. *Gentianella verna major* CLUS. pann. p. 284. 285. in montibus inque subalpinis.

643. GENTIANA foliis ovato lanceolatis, nervosis, vaginalibus, floribus verticillatis & umbellatis. *Cruciata* DODON. purg. p. 71. in pratis & sylvis Bernæ & alibi.

644. GENTIANA foliis ovato lanceolatis, caule uniflоро. *Gentianella verna minor* CLUS. pann. p. 285. in uidis submontanis & subalpinis.

645. GENTIANA foliis ovatis, caule uniflоро. *Gentianella elegantissima* Bavarica CAMER. bort. ic. XV. alpina saxosa.

646. GENTIANA caule ramoso, calycibus alatis. *Gentianella cerulea cordata* COLUMN. p. 220. 221. in montanis & alpinis, etiam in uidis planitiei.

647. GENTIANA caule ramoso, foliis ovato lanceolatis, floribus infundibuliformibus. *Gentiana XI.* CLUS. pann. p. 291. alpina.

648. GENTIANA caule dichotomo, floribus infundibuliformibus strictis. *Centaurium minus* DODON. purg. p. 52. in sylvis & pratis.

649. GENTIANA foliis radicalibus ovatis, caulinis triangularibus perfoliatis, floribus octofidis. *Centaurium luteum* CAMERAR. Epit. p. 427. circa *Gencvam*, *Viviscum*, *Michefeldam*.

650. GENTIANA faucibus barbatis, calycis foliis quaternis, alterne majoribus. *Oxybryon RENEAUL.*  
*G. caucasica* ternis, alterne majoribus. *Oxybryon RENEAUL.*  
 ma p. 71. in submontanis & subalpinis.

651. GENTIANA faucibus barbatis, calycis segmentis quinque aequalibus. *Gentianella purpurea minima* COLUMN. p. 221. 223. Basileæ, circa Ferrières.  
*G. amarella*

652. GENTIANA floribus solitariis, longissime petiolatis, faucibus fimbriatis +. in M. Auffes & circa glacialia *Valforey Valfie.*

653. GENTIANA flore quadrifido, oris ciliatis. *Gentianella carulea autumnalis angustifolia* COLUMN. p. 221. 223. passim ad vias & in sylvarum oris.

654. CUSCUTA floribus sessilibus. *C. minor*. Illa in frigidis montanis, hæc in calidis.

655. PLANTAGO scapo unifloro. *Plantago floribus semineis sessilibus ad exortum scapi uniflori maris Iussieu mem. 1742. p. 131. t. 7. ad lacus Tigu-*  
*P. maritima* *rinum, Biennensem, Thunensem in arenosis.*

656. PLANTAGO foliis lanceolatis, quinquenerviis, scapo nudo, spica ovata. *Plantago angustifolia minor* TABERN. p. 732.

*P. angustifolia alpina* I. B. III. p. 506. Illa ad vias, hæc in alpinis nigrior.

657. PLANTAGO foliis linearibus, planis, spica cylindrica. *Coronopus serpentina* I. B. III. p. 510. & *Coronopus serpentina omnium minima* EJ. p. 511. in montibus & pascuis subalpinis.

658. PLANTAGO foliis subhirsutis, semipinnatis, pinnae raris, lanceolatis. *Herba stellata* DODON. p. 109  
*P. coronopifolia* prope S. Julies.

659. PLANTAGO foliis subhirsutis, ellipticis, spica cylindrica densa. *Plantago media* CAMER. epiti. p. 262. in pratis.

660. PLANTAGO foliis petiolatis, ovatis, glabris, spica cylindrica. *Plantago major* CAMERAR. epit. p. 261. ad vias.

661. PLANTAGO caulibus erectis, herbaceis, foliis linearibus, patulis, capitulis ovatis, hirsutis. *P. hyssopifolia* *Phyllium herba pulicaris* I. TABERN. p. 145. & II. EJUSD. Genevæ ad vias.

## VI. VASCULIF. VII. CORONATÆ 67

662. PLANTAGO caule lignoso, prostrato, foliis linearibus erectis, capitulis subhi sutis. *Psyllium majus supinum* I. B. III. p. 513. Genevæ. *P. supinum.*
663. CONVOLVULUS foliis sagittatis, hamis emarginatis angulosis, petiolis unifloris, stipulis cordatis maximis. *Smilax levis major* DODON. purg. p. 210. ad sepes. *C. levis.*
664. CONVOLVULUS foliis sagittatis, latescentibus, petiolis unifloris, stipulis remotis, subulatis. *Smilax levis minor* EJ. purg. p. 213. in agris. *C. arvensis.*
665. POLEMONIUM foliis pinnatis, floribus erectis, elliptico lanceolatis. *Valeriana græca* DODON. p. 252. passim in sylvis, rarum tamen. *P. laevigatum.*
666. AZALEA caule procumbente, foliis ovatis, margine introverso. *Anonymous foliis Thymi* CLUS. pann. p. 57. 58. 521. in alpibus, in primis A. quilejensibus. *A. procumbens.*
667. AQUIFOLIUM MATTH. p. 161. ad sepes & in sylvis. *A. aquifolium.*

## VII. CORONATÆ.

668. OPULUS. *Sambucus aquatica* CAMBR. epit. p. 977. in sepibus & ad vias. *O. aquatica.*
669. VIBURNUM foliis ovato serratis, subtus tomentosis. *Viburnum* CAMBR. epit. p. 975. ad sepes. *V. laetum.*
670. SAMBUCUS arborea floribus umbellatis. *Sambucus* CAMBR. epit. p. 975. ad sepes. *S. nigra.*
671. SAMBUCUS herbacea, floribus umbellatis. *Ehus* CAMBR. epit. p. 979. ad vias & in fossis subhumidis. *S. Ebulus.*
672. SAMBUCUS arborea, floribus spicatis. *Sambucus montana* CAMBR. epit. p. 976. in sylvis. *S. racemososa.*
673. CAPRIFOLIUM capitulis ovatis, imbricatis, terminalibus, foliis omnibus distinctis LINN. *Periclymenum* FUCHS p. 646. in sylvis & ad sepes, non ubique. *C. officinale periclymenum.*
674. CAPRIFOLIUM foliis ovatis, bacca singulari, ova, biflora. *Periclymenum rectum fructu caruleo* CLUS. pann. p. 85. I. B. II. p. 108. *C. officinale caruleum.*

675. CAPRIFOLIUM foliis ovato lanceolatis, subhirsutis, bacca singulari, bicolli, biflora. *Periclymenum rectum* III. CLUS. hisp. p. 94. in montanis & subalpinis frequens.  
*Lou. Alpigena*
676. CAPRIFOLIUM foliis ovato lanceolatis, glabris, baccis gemellis, calyce quinquefido. *Periclymenum rectum* II. CLUS. hisp. p. 92. 93. in montanis & subalpinis.  
*Lou. nigra*
677. CAPRIFOLIUM foliis ovatis, acuminatis, subhirsutis, baccis gemellis. *Xylosteon RIVIN.* monop. irreg. t. 120. ad sepes.  
*Lou. Tylestanus*
678. RAPUNCULUS foliis linearibus subasperis, spica planiuscula, petalis liberis. *Scabiosa* DODON. p. 122. in viis apricis.  
*Jacione montana*
679. RAPUNCULUS foliis linearibus, bracteis ovato lanceolatis. *Rapunculus sylvestris umbellatus* CAMERAR. ad THAL. ic. VIII. a. d. alpinus.  
*Rhytisma lucidum*
680. RAPUNCULUS foliis ovatis, obtuse dentatis, bracteis maximis, obtusis. *Rapunculus alpinus parvus comosus* I. B. II. p. 811. in M. Pündtnerberg forte non satis diversus a 681.  
*Plant. Orbicularis*
681. RAPUNCULUS foliis imis cordatis, oblongis, caulinis sessilibus acutis, bracteis ovato lanceolatis. *Rapuntium montanum rarius corniculatum* COLUMN. p. 223. 224. subalpina & montana.
682. RAPUNCULUS foliis imis longe petiolatis, caulinis linearibus, integris, bracteis linearibus, dubiis imis longissimis †. *Rapunculus alpinus cæruleus*, angusto, raro, subinde dentato folio FERDINANDI BASSI Comment. Bonon. T. IV. p. 289 t. 1. f. 2. in M. Cenero & Speuga.
683. RAPUNCULUS foliis radicalibus cordiformibus, acute incisis; tubis longissimis hirsutis, emarginatis †. *Rapunculus spicatus flore purpuro violaceo* SCHUCHZER It. VII. p. 518. in pratis subalpinis, non tamen ubique.  
*Plant. spicata*
684. RAPUNCULUS foliis radicalibus cordatis, tubis bicarinibus revolutis. *Rapunculus corniculatus spica longiore* RIVIN. monop. irreg. t. 109.  
*C. flore cæruleo* DODON. p. 166. Prior ubique in sylvis, alter in subalpinis circa les Plans.

685. CAMPANULA caule simplici , aspero , foliis amplexicaulibus , floribus capitatis. *Ranunculus sylvestris cæruleus umbellatus* THAL. ic. VIII. n. 2. in pratis. *C. glomerata*
686. CAMPANULA caule simplici , aspero , foliis ligulatis , asperis , floribus capitatis. *Ranunculus sylvestris cæruleus umbellatus minor* THAL. ic. VIII. n. 1. SCHEUCHZERUS loco non definito. *C. cervicaria*
687. CAMPANULA caule simplici , aspero , foliis linearibus , floribus laxe & loneissime spicatis. *Trachelium altissimum foliis asperis , floribus parvis* I. B. II. p. 801. in Valesia inferiori. *C. filiata*
688. CAMPANULA foliis lingulatis aperis , floribus hirsutis , densissime spicatis. *Trachelium thyrsoides* CLUS. *pannon.* p. 688. alpi a, etiam montana. *C. thysoides*
689. CAMPANULA caule erecto ramissimo , foliis ovato lanceolatis , subtus tomentosis , petiolis multifloris erectis. *Campanula f. Cervicaria Bononiensis , flore parvo* I. B. II. p. 806. in Valesia inferiori. *C. Noisettiana*
690. CAMPANULA foliis cordato lanceolatis , acute serratis , hirsutis , petiolis ex alis paucifloris , calycibus hispidis. *Ranunculus sylvestre alterum , Cervicaria major* DODON. *coron.* p. 31. 32. ad sepes orasque sylvarum. *C. Trachelium*
691. CAMPANULA foliis ovato lanceolatis , serratis , petiolis unifloris , calycibus glabris. *Trachelium angicum candidum majus* I. B. II. p. 807. in sylvis Juræ. *C. latifolia*
692. CAMPANULA foliis cordato lanceolatis , subhirsutis , petiolis unifloris. *Campanula repens flore minori cæruleo* I. B. p. 816. in sepibus. *C. rapunculoides*
693. CAMPANULA caule simplici , levi , foliis glabris , ovato lanceolatis , serratis , petiolis paucifloris. *Campanula alpina glabra flore dilatissime cærulea* I. B. II. p. 806. in subalpinis & submontanis. *C. rhomboides*
694. CAMPANULA caule simplici , foliis ligulatis , aperis , petiolis unifloris , floribus hirsutis. *Campanula barbata* JACQUIN. obff. II. t. 37. *C. Barbata*
695. CAMPANULA foliis ellipticis hirsutis , petiolis alaris. *C. Alpina*

alaribus unifloris, floribus glabris. *Campanula caule simplici, pedunculis unifloris, axillaribus diphyllis*. JACQUIN. off. 12. alpina.

696. CAMPANULA uniflora, foliis radicalibus ovatis, integerimis ALLIONE spec. t. 5. f. 1. alpes occidentales editores Bernenses & Valesiacæ.

697. CAMPANULA foliis radicalibus ovatis, caulinis linearibus, petiolis longissimis paucifloris. *Rapunculus nemorosus* II. TABERN. p. 411. ad oras viarum.

698. CAMPANULA caule brachiato, foliis lanceolato linearibus glabris, petiolis paucifloris, nudis. *Campanula esculenta* facie, ramis & floribus patulis DILLEN. hort. Elth. t. 58. in alpinis.

699. CAMPANULA foliis ellipticis ferratis, subhirsutis, caule aspero, floribus paniculatis. *Erinus Nicandri* COLUMN. p. 225. vulgo ad sepes.

700. CAMPANULA caule simplici, foliis subhirsutis, linearibus, petiolis unifloris. + *Campanula linifolia*, rara, *cerulea* I. B. II. p. 797. subalpina & submontana.

701. CAMPANULA foliis ferratis, radicalibus cordatis, caulinis lanceolatis. + *Rapunculus sylvestris minor* TABERNÆM. p. 409. in muris adque vias.

702. CAMPANULA foliis ferratis, radicalibus cordatis, caulinis linearibus. *Campanula alpina rotundifolia minor* C. B. prodr. p. 34. in rupibus alpinis & montanis.

703. CAMPANULA caule procumbente, fructibus prismaticis, floribus solitariis, rotatis, longissime petiolatis. *Campanula arvensis minima* DODON. coron. p. 38. in segetibus Bernæ frequens.

704. CAMPANULA caule erecto, fructibus prismaticis, floribus rotatis, sessilibus, congestis. *Pentagonium, viola pentagonia* TABERN. p. 316. similibus lœcis.

- Sanguisorba officinalis* 705. PIMPINELLA tetrastemon, spica brevi. *Sanguisorba major* FUCHS p. 785. in pratis uidis.

- Poterium sanguisorba* 706. PIMPINELLA polystemon. *Sanguisorba minor*, TABERN. p. 1034. in adclivibus & siccis.

- S. Valerandi* 707. SAMOLUS. *Anagallis aquatica tertia* LOBEL. ad folias prope Roché. VIII, STEL.

## VIII. STELLATÆ.

708. RUBIA foliis senis ellipticis, asperis. Wildmader PETIVEE. plant. Brit. t. 30. in Valesia, prope Tvorne, circa Orbe, Antagne &c. *R. fructuosa*
709. GALIUM foliis quaternis, hirsutis, petiolis acti-  
floris. Cruciata DODON. p. 107. ad vias & in  
sepibus. *G. hirsutum*
710. GALIUM foliis octenis, linearibus, perangustis,  
racemis multifloris spicatis. Gallium DODON.  
purg. p. 103. ad vias siccas. *G. verum*
711. GALIUM foliis octonis, ellipticis, caule angulofo-  
Mollugo vulgaris herbariorum LOBBEL. p. 802. ad  
vias & in pratis. *G. mollugo*
712. GALIUM foliis octonis, ellipticis, caule terete.  
Mollugo DODON. purg. p. 161. in sylvis. *G. pilosum*
713. GALIUM caule subaspero, foliis senis, ellipticis  
lanceolatis, aristatis †. Gallium alpinum floribus  
albis, veluti in umbellam dispositis SCHEUCHZER.  
herb. sicc. alpina. *G. uliginosum*
714. GALIUM caule erecto, foliis octonis, subtus ca-  
naliculatis, petiolis multifloris umbellatis. *Gallium montanum altissimum*, foliis angustis, in-  
bicantibus RUFF. p. 5. circa Basileam, Genevam. *G. montanum*
715. GALIUM caule angulofo, foliis senis, subasperis,  
aristatis. † Rubeola saxatilis alpina BOCCONE  
t. 101. ad vias, etiam in alpinis.
716. GALIUM foliis octonis, supremis lanceolatis, flo-  
ribus in summa planta fasciculatis. *Gallium sa-  
xatile glauco folio* BOCCONE t. 116. circa Ge-  
nevam. *G. glaucum*
717. GALIUM caule procumbente, ramosissimo, foliis  
quinis, subrotundis, aristatis, petiolis ramosis †.  
*Gallium album spinosum multicaule* DILLEN. Ba-  
fileæ, in M. Mürtschen, &c.
718. GALIUM foliis senis, ellipticis, petiolis brevissimis  
unifloris †. *Gallium saxatile spinosum*; molliore  
folio Iussiu mem. de l' Acad. 1714. t. 15. alpina. *G. saxatile*
719. GALIUM caule radicato, diffuso, foliis quaternis  
ovatis, obtusis. *Gallium palustre album* C.B. in  
fössis abunde. *G. salustre*

720. GALIUM foliis quaternis, glabris, ovato lanceolatis racemis brevissimis, reflexis æqualibus.  
*GALIUM* floribus polygamis, racemis lateralibus biratis, nudis, foliis quaternis lanceolatis glabris SCOPOLI p. 344. (\*). in transalpinis.
- G. purpureum*
721. GALIUM caule erecto, ramosissimo, foliis linearibus, perangustis, petiolis confertis, ramosis. *Gallium nigro purpureum*, *montanum tenuifolium* COLUMN. ecphras. I. p. 398. Transalpina.
- G. bracteatum*
722. GALIUM caule erecto, foliis quaternis, lanceolatis, glabris, trinerviis, seminibus hispidis LINN. p. 156. *Rubia pratensis* *levis acuto* folio C. B. prodr. p. 145. in pratis uidis.
- G. Aparine*
723. GALIUM caule terete. foliis senis, linearibus, ferratis, petiolis unifloris, seminibus hispidis. *Aparine*. purg. DODON. p. 98-99. ad sepes.
- G. parvum*
724. GALIUM foliis ferratis, petiolis divaricatis, seminibus rugosis. *Aparine vulgaris* *semine minori* VAILLANT. t. 4. f. 3. in agris passim, in montanis & circa Roche.
- Valantia Aparine*
725. GALIUM foliis ferratis, petiolis trifloris, recurvis *Aparine semine levi* VAILLANT. t. 4. f. 3. circa Roche, Montcharans.
- G. parisiense*
726. GALIUM panicula ramosissima, foliis asperis, ferratis, seminibus hirsutis. *Aparine minor palustris Parisiensis* VAILLANT. circa S. Roc.
- Asperula laevigata*
727. GALIUM foliis quaternis, petiolis longissimis, brachiatis, seminibus hirsutis. *Rubia quadrifolia* *semine duplice hispido* I. B. III. p. 718. in sylvis abiegnis.
- A. odorata*
728. ASPERULA caule erecto. foliis octonis, petiolis ramosis erectis, seminibus hirsutis. *Hepatica stellata* TABERN. p. 816. in sylvis.

729.

- (\*) Flores, quibus carebam, habet specimen a Cl. SCOPOLI missum. Petoli florigeri binati, foliis multo breviores, decemflori. Flores flavescentes, & fertiles. Semen glabrum, quo maturante petiolus deorsum reflectitur. Ejice in Historia stirpium synonymum LINNAEUS & corrige floris colorem.

729. ASPERULA caule flaccido, foliis linearibus quaternis, umbellulis petiolatis. *Gallium album* & *tectoria*. TABERNÆMONT. p. 151. in sylvis circa Moncharans.
730. ASPERULA caule firmo, ramoso, foliis linearibus quaternis, supremis conjugatis. *Gallium albunt minus* TABERN. p. 151. ad sepes. & *viguina*
731. ASPERULA foliis quaternis, lanceolato linearibus, caule erecto, floribus saepe trifidis LINN. p. 151. & *Pyrenaica*. *Rubia cynanchica saxatilis* C. B. prodr. p. 146. non satis certa species Basileæ.
732. ASPERULA foliis ovato lanceolatis, quaternis, petiolis unifloris erectis, bracteis ciliatis *Rubia levis Taurinense* LOBEL. ic. p. 800. subalpinæ sylvæ. & *Taurica*.
733. ASPERULA foliis octonis, obtusis, floribus sessilibus congestis, bracteis ciliatis. *Asperula cærulea* DODON. pent. p. 355. in agris planitiei. & *Aureus*
734. SHERARDIA foliis senis, lanceolatis, floribus sessilibus umbellatis. *Rubeola arvensis repens*, *s. Arvensis* *cærulea* C. B. prodr. p. 145. in agris.

IX. UMBELLIFERÆ.

735. ERYNGIUM foliis semipinnatis, pinnis pinnatis, pinnulis lobatis spicatis. *Eryngium CAMER. epit.* p. 447. ad lacum Lemanum. Basileæ. *L. campestre*
736. ERYNGIUM foliis radicalibus petiolatis, cordatis, involucro pinnato, ciliato. *Eryngium alpinum cæruleum capitulo Dipsaci* MANGER. dict. pharm. I. p. 866. in alpibus potissimum aquilejensibus, aux Nombrieux. *L. Alpinum*
737. SANICULA foliis radicalibus trilobatis, lateralibus lobis tripartitis, umbellis globosis. *Sanicula RIVIN. monop. irreg. t. 30.* in nemoribus. *S. Europaea*
- 737\* SANICULA involucris maximis quinquefoliis, seminibus tuberculosis. *Helleborine alpina Sanicula* & *Ellebori nigri facie* LOBEL. advers. p. 298. icon p. 664. *Helleborine TABERNÆMONI.* p. 84. *Astrantia floribus masculis pedunculatis, femininis sessilibus, seminum angulis obtusis glabris*

Scoroli p. 337. in valle Augusta, haud longe  
a monte Pennino (\*).

738. CAUCALIS foliis asperis, pinnatis, pinnis ferratis,  
*C. latifolia* involucris ovato lanceolatis. *Echinophora major*  
platyphyllus COLENN. ecphras. p. 97. 98. in agris  
Valesiae inferioris.

739. CAUCALIS foliis triplicato pinnatis, involucris li-  
*C. Danuviae* gulatis, universali unifolio. *Echinophora RIVIN.*  
t. 24. in agris planitiei.

740. CAUCALIS umbellis planis, petalis extremis &  
*C. grandiflora* involucris maximis. *Echinophora flore magno*,  
RIVIN. t. 25. in agris planitiei.

741. CAUCALIS foliis duplicato pinnatis, nervo mul-  
*C. latifolia* toties latioribus. *Caucalis RIVIN.* t. 31. ad se-  
pes, in sylvis cæduis.

742. CAUCALIS foliis duplicato pinnatis, pinnulis longe  
*C. leptophylla* confluentibus. + *Caucalis procumbens RIVIN*  
t. 33. in agris planitiei.

743. CAUCALIS vaginis lanuginosæ, foliis triplicato  
*Caudex Atropurpureus* pinnatis, semiribus restratis. *Caucalis folio Cha-  
ropylli RIVIN.* t. 34. ad sepes & muros in ca-  
lidioribus.

744. DAUCUS (\*\*) involucris cavis, communibus pin-  
*D. carola* natis,

(\*) Plantæ rarissimæ specimen misit Cel. SCOPOLI.  
Folia radicalia longe petiolata, g'abra. nitida,  
ferrata. denticulis ciliatis. Medianus lobus mi-  
nor, obiter tripartitus: laterales majores, bi-  
partiti; lobuli interiores trifidi, exteriores bi-  
fidi, non profunde. Caules aphylli, pedales.  
Umbellæ involucrum maximum, profundissime  
quinquefidum, sexfidum; segmentis ovatis,  
circumserratis, dentibus ciliatis. Capitulum  
sessile, decuplo unico involuci folio minus:  
flores luteoli, tubæ prælongæ. Addo ex SCO-  
POLIO, flores masculos pedunculatos esse, feminas  
sessiles, petala citius amittere. Fructum sub-  
rotundum esse, seminibus pentagonis tuber-  
culosis, angulis obtusis.

(\*\*) Hi duo numeri in Historia sunt 746. & 745.

- natis, peculiaribus linearie lanceolatis. *Staphylinus* RIVIN. t. 27. in pratis udis & ad vias.
745. vide n. 751\*. (\*)
746. LIBANOTIS foliis hirsutis, triplicato pinnatis, lobulis profundissime bipartitis. *Daucus Creticus* *Athamanta retrorsis* CAMER. epit. p. 536.
747. CEREFOLIUM foliis glabris, triplicato pinnatis, lobulis obtusis. *Cerefolium* RIVIN. t. 42. in macerieribus. *Scandix cerefolium*
748. CEREFOLIUM foliis triplicato pinnatis, acute dentatis, glabris, nervis hirsutis. *Cerefolium sylvestre* RIVIN. t. 43. in pomariis. *Chrysanthemum sylvestre*
749. CEREFOLIUM foliis hirsutis, petalis cordatis, seminibus obscure striatis ad KUPP. t. 5. Circa Bernam & in montosis pratis. *Ch. aureum*
750. MYRRHIS foliis hirsutis, laciniis obtusis, caule geniculato. *Myrrhis* RIVIN. t. 40. ad sepes planitiei. *Ch. tenellum*
751. MYRRHIS radice prælonga, foliis triplicato pinnatis, acutis, seminibus cylindricis. *Myrrhis palustris* RIVIN. t. 50. ad rivos. *Ch. tenuatum*
752. MYRRHIS radice bulbosa, caule inferne hirto, superne levi, foliis triplicato pinnatis, acute incisis. *Myrrhis fætens* RIVIN. t. 49. ad sepes *Mülhusiae*, *Basileæ*, &c. *Ch. bulbosum*
753. MYRRHIS foliis triplicato pinnatis, mollibus, seminibus fulcatis, maximis. *Odorata* RIVIN. t. 56. in subalpinis & alpinis. *Scandix odorata*
754. MYRRHIS seminis cornu longissimo. *Scandix f. pecten* RIVIN. t. 37. in segetibus planitiei.
755. OENANTHE foliis radicalibus rotunde lobatis, planis, caulinis fistulosis. *Oenanthe* RIVIN. t. 65. in fossis aquosis. *O. fistulosa*
756. OENANTHE foliis planis, imis subrotundebatis, caulinis trilobatis, linearibus. circa Roche.
757. PHELLANDRIUM foliis refractis. *Phellandrium* *P. aquaticum* RIVIN. t. 64.
- 757\* LIGUSTICUM foliis triplicato pinnatis, pinnulis primis *Athamanta libanotis* E 3

(\*) Melius ad Ligusticum refertur ob calycem proutum, & seminis figuram.

primis decussatis, seminibus hirsutis. *Apium petreum* s. *montanum album* I. B. III. p. 105. *Libanotis RIVIN.* t. 96. ad rupes alpinas & montanas.

758. *LIGUSTICUM* foliis duplicato pinnatis, pinnulis acute dentatis, longe lanceolatis. *Seseli Peloponnesense CAMER.* epit. p. 514. ad rupes circa *Formazz.*
- O. apodum prosto* 759. *PODAGRARIA RIVIN.* t. 46. ad sepes.
- Euthymia frumentaria* 760. *FOENICULUM RIVIN.* t. 60. in vineis & ad vias.
- C. frutescens* 761. *MEUM RIVIN.* t. 62. in nonnullis Juræ pascuis.
- J. auricula* 762. *SESELI* foliis linearibus, triplicate pinnatis, caule vaginoso. *Pimpinella tenuifolia RIVIN.* in aquilejensi Dominio.
- J. apodum* 763. *SESELI* foliis duplicato pinnatis, pinnulis semi-pinnatis, lobulis lanceolatis. *Muttellina CAMER.* epit. p. 8. in pascuis alpinis, etiam montanis.
- C. sativum* 764. *CORIANDRUM fructibus globosis LINN.* *Coriandrum CAMER.* epit. p. 523. circa *Tramlingen.*
- C. lyngsium* 765. *AETHUSA LINN.* *Cynapium RIVIN.* t. 75. in segetibus.
- C. officinale* 766. *CICUTA RIVIN.* t. 74. ad vias & in cœmteriis.
- D. rotundifolium* 767. *BUPLEURUM* caule brachiato, rameissimo, foliis ovato lanceolatis, amplexicaulibus. *Perfoliatum RIVIN.* t. 45. in segetibus planitiei.
- D. tenuifolium* 768. *BUPLEURUM* foliis imis petiolatis, ovatis, superioribus amplexicaulibus, ovato lanceolatis. *Perfoliata montana CAMER.* hor. ic. 38. in M. Legerberg, Creux du vent &c.
- D.* 769. *BUPLEURUM* foliis amplexicaulibus, ovato lanceolatis, aristatis. † *Perfoliata alpina latifolia minor C. B. prodr.* p. 129. in alpibus.
- D. angustatum* 770. *BUPLEURUM* foliis radicalibus gramineis, caulinis ovato lanceolatis, amplexicaulibus, calycibus umbellatum quinquefoliis. *Pianta alpina di Corsica BOCCONE mus. di plant.* t. 107. alpina.
- D. bellatum* 771. *BUPLEURUM* foliis gramineis, involucro peculiariter octies emarginato †. *Agrostana HILL.* V. t. 119. alpina.
- D. dentata* 772. *BUPLEURUM* caule brachiato, involucris utrisque pentaphyllis. aristatis, petiolos excedentibus. *Perfoliatum angustifolium montanum COLUMN.*

- p. 247. non certa civis, dicitur in Valesia pro-  
venire.
773. BUPLEURUM . . . Sedum petraeum Bupleuri fo-  
lia PONA Bald. Ital. p. 246. J. GESNER in alpibus. *B. petraeum*  
Abbatiscellanorum.
- B. Bupleurum alpinum angustifolium minus* I. R. H.  
*Perfoliata alp. angustifolia minor* C. B. prodr.
- p. 129. alpina, utraque non satis nota.
774. BUPLEURUM caule ramosissimo, umbellis alari-  
bus, paucifloris, involucris pentaphyllis lanceo-  
latis. petiolo longioribus. *Bupleurum tertium*  
*minimum* COLUMN. p. 85. 247. circa Basileam  
nuper non repertum. *B. tertiuum*
775. BUPLEURUM caule ramosissimo, umbellis petio-  
latis, involucris pentaphylis, petiolo breviori-  
bus. *Bupleurum angustifolium* C. B. circa Se-  
dunum nasci dicitur, nuper non visum. *B. juncinum*
776. BUPLEURUM foliis radicalibus petiolatis, ellip-  
tico lanceolatis, caulinis falcatis, caule flexuoso.  
*Bupleurum RIVIN.* t. 24. passim ad vias & in  
collibus.
777. SIUM foliis pinnatis, argute dentatis, umbellis  
erectis. *Sium RIVIN.* t. 77. in fossis aquosis  
planitiei. *S. latifolium*
778. SIUM foliis radicalibus ovatis, pinnulis dentatis,  
caulinis appendiculatis, umbellis alatis. *Sium*  
*minus* RIVIN. t. 18. in fossis ubique. *S. angustifolium*
779. SIUM foliis pinnatis, umbellis cernuis LINN.  
*Sium terreste* umbellis rarioribus MORISON. III.  
p. 283. T. IX. t. 5, f. 7. in pratis vallis Erguel,  
ex non bono specimine. *S. vegetum*
780. SIUM foliis radicalibus capillaribus multifidis, cau-  
linis pinnatis, ultima pinna trilobata. *Sium mi-*  
*nimum*, foliis imis ferulaceis MORISON. l. c. t. 9.  
f. 5. ultra Novillé in fossa semel lectum. *S. inundatum*
781. SIUM foliis duplicato pinnatis, pinnulis acute ser-  
ratis, trifidis & simplicibus. *Cicuta aquatica*  
WEPFER in libello proprio. In aquosis planitiei,  
circa Noville, Fridlingen &c. *C. virosa*
782. SIUM foliis firmis, ferratis, pinnatis, nervo fo-  
lioso latefcente. *Eryngium quartum* DODON.  
p. 732. Basileæ ad vias. *S. falcaria*

- Dulium bulbocastanum* 783. BULBOCASTANUM I. B. III. p. 30. in segetibus montanis & subalpinis.
- U. graveolens* 784. APIUM foliis pinnatis, pinnis trilobatis. *Apium polystre* CAMER. epit. p. 527. ad fossas.
- Pimpinella major* 785. TRAGOSELINUM foliis pinnatis, pinnis lanceolatis serratis, extremis trilobatis. *Pimpinella Rivin.* t. 79. vulgo ad vias inque sylvis.
- L. saxifraga* 786. TRAGOSELINUM foliis pinnatis, pinnis ovatis. *Pimpinella saxifraga minor* CAMER. epit. p. 775. passim ad vias, inque vallis.
- D. Disca* 787. TRAGOSELINUM foliis duplicato pinnatis, pinnulis profundissime lobatis. *Pimpinella media Rivin.* t. 81. in aridis.
- Taraxacum officinale* 788. TRAGOSELINUM caule crasso, fulcato, divaricato, foliis multifidis capillaribus. *Seseli Massiliense* fœniculi folio, quod *Dioscoridis* censetur C. B. Bas. p. 49. in calidioribus ad vias, in aquilejensibus &c.
- A. transsilvanicum* 789. CARUM RIVIN. t. 54. in pratis.
- A. minor* 790. ASTRANTIA foliis quinquelobis, trifidis LINN. *Astrantia Rivin.* t. 69. in montanis & subalpinis.
- Helleborus niger* 791. ASTRANTIA foliis septenis, digitatis, serratis LINN. *Helleborus minimus alpinus Astrantie* folio BOCCONI plant. sicul. t. 5. f. 3. alpes, etiam valles alpinae.
- L. latifolium* 792. LASERPITIUM foliis cordatis, inciso serratis LINN. *Laserpitium Rivin.* t. 21. in pratis subalpinis & montosis iapidosis.
- L. aquilegiifolium* 793. LASERPITIUM foliis imis rotunde lobatis, vaginalibus linearibus, trifidis. *Ligusticum Rauwolfii Aquilegiae* folio I. B. III. p. 148. in M. Generoso.
- L. filicinum* 794. LASERPITIUM foliis duplicato pinnatis, pinnulis integerrimis lanceolatis, simplicibus & ternatis. *Sil'er montanum* DONON. purg. p. 484. in montanis & alpinis ad Rupes &c.
- L. virginicum* 795. LASERPITIUM foliis triplicato pinnatis, lobulis lanceolatis t. 19. + *Panax asclepium semine foioso* C. B. in alpinis editis.
- L. Juncifer* 796. LASERPITIUM foliis triplicato pinnatis, pinnulis lanceolatis, involucris semitrifidis +. in alpibus aquilejensibus & vicinis Valesiacis.

797. PEUDEDANUM foliis triplicato pinnatis, pinnulis nervo distinctis, lanceolatis, imparibus trilobatis. *Seseli pratense* RIVIN. t. 57. in pratis uidis.
798. SELINUM foliis quadriplicato pinnatis, nervis canaliculatis. *Daucus alsaticus* C. B. prodr. p. 77. *Præstatum effusum*. circa *Mulhusiam*.
799. SELINUM sublaetescens leve, foliis quad ualicate pinnatis, linearibus. *Thysselinum angustifolium* RIVIN. t. 13. in palustribus frequens ad lacus & fluvios.
800. SELINUM lactescens, caule aspero, foliis triplicato pinnatis. *Thysselinum* RIVIN. ad lacum *Vervai* &c.
801. Est LIGUSTICUM 757\*.
802. SELINUM foliis triplicato pinnatis, pinnulis latiusculis, simplicibus & trifidis t. 20. *Carvifolia* J. carifolia. VAILLANT. t. 5. f. 2. passim circa Bernam, *Ebrodunum*, Michelfeldam in uidis.
803. SELINUM foliis triplicato pinnatis, refractis. *Oreoselinum* RIVIN. t. 8. in subalpinis & montanis. *Alpinum Oreo-selinum*.
804. SELINUM foliis duplicato pinnatis, pinnis semibilobatis, circumferratis. *Cervaria* RIVIN. t. 12. *C. cervaria* in montanis & subalpinis.
805. IMPERATORIA RIVIN. t. 7. alpina. *Imperatoria*
806. ANGELICA foliis duplicato pinnatis, ovatis, ferratis. *Angelica palustris* RIVIN. t. 17. in sylvis *A. silvestris* & aquosis.
807. ANGELICA foliis duplicato pinnatis, ovato lanceolatis ferratis. *Angelica* RIVIN. t. 17. inter *Pocco d'Adda* & *Morbegno*. *A. archangelica*
808. PASTINACA foliis pinnatis. *Pastinaca* RIVIN. t. 6. ad vias, in ruderosis. *P. sativa*
809. SPHONDYLIUM foliis hirsutis, pinnatis, pinnis quinquefidis. *Sphondylium* RIVIN. t. 4. in pratis. *Hirsutum Sphondylium*
810. SPHONDYLIUM foliis subrotundis, glabris, obtuse semitrilobatis. *Sphondylium alpinum glabrum* C. B. prodr. p. 83. Hinc inde in Juræ ad clivibus. *H. Alpinum*
811. TORDYLIUM foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, seminis limbo levi. *Caucalis major semine* *T. marianum* nus

*nus pulchro hirsuto* I. B. III. p. 85. nuper non repertum.

812. HYDROCOTYLE foliis rotundis, emarginatis, petiolis centralibus, umbellis fastigiatis. *Cotyledon pauciflora* DODON. pempt. p. 133. circa lacus Helvetiae in pratis humidis.

*H. vulgaris*

## X. CORONATÆ.

### FLORE POLYPETALO.

813. CIRCÆA foliis subcordatis, subserratis. *Herba Stephani* TABERN. p. 730. ad sepes & in umbrosis.

*C. lutetiana*

814. CIRCÆA foliis cordatis, acute dentatis. *Circæa minima* COLUMN. ecphras. II. p. 80. in montanis & subalpinis sylvis.

*C. alpina*

815. CORNUS arborea umbellis involucrum æquantibus Linn. p. 171. *Cornus mas* BLAKWELL. t. 121. ad rupes aquilejenses.

*C. mascula*

816. CORNUS arborea umbellis nudis. *Cornus femina* LOBEL, II. p. 169. ad sepes.

*C. faguncula*

817. RIBES inerme, floribus planis, stipulis florum longitudine. *Ribes alpinum dulce* I. B. II. p. 98. in subalpinis & montanis.

*R. alpinum*

818. RIBES inerme foliis planiusculis, stipulis minimis. *Ribes flore rubente* I. B. II. p. 98. in sylvis supra Roche.

*R. rubrum*

819. RIBES inerme, oolidum, calyce oblongo, petalis ovatis. *Ribes nigra* TABERN. p. 1083. in aquofis planitiei.

*R. nigra*

820. RIBES ramis aculeatis, foliis rotunde lobatis. *R. uva-nigra* Grossularia BLAKWELL. t. 277. ad sepes.

## XI. POLYPETALÆ PERICARPIÆ.

821. RHAMNUS inermis, foliis ovato lanceolatis, integris, floribus quinquefidis androgynis. *Fragula* CAMERAR. epit. p. 978. in udis.

*R. frangula*

822. RHAMNUS spinosus, foliis ovato lanceolatis, serratis, glabris, floribus androgynis, baccis te-

*R. fraxatilis*

trap.

trypyrenis. *Spina infectoria altera* CLUS. pann. p. 106. 107. inter Chur & Ems.

823. RHAMNUS inermis, foliis ovatis crenulatis t. 40. *R. Alpinus* Conum. Gott. II. t. 16. *Frangula altera polycarpos* C. B. Iprodr. p. 160. in montanis & sub. alpinis.
824. RHAMNUS foliis spinosis, ovato lanceolatis, ferratis. *Spina infectoria* CAMER. Epit. p. 82. ad sepes inque aquosis. *R. latifolius*
825. VITIS foliis semitrilobatis, hirsutis, dentatis. *V. Labrusca* s. *Labrusca* I. B. II. p. 96. ad sepes planitie*s*.
826. HEDERA foliis sterilibus tribolatis, fructiferis ovato lanceolatis. *Hedera* MATTHIOL. p. 626. TRAG. p. 802. ad rupes et arbores. *H. helix*
827. RHUS racemis plumosis, foliis ovatis *Coccygria*. *R. cotinus* CLUS. pann. p. 98. in saxosis ad Rhodanum supra Leuk.
828. BERBERIS floribus racemosis, foliis ciliatis. *Oxyacanthus Galeni* TABERN. p. 1035. ad sepes & in dumetis. *B. vulgaris*
829. EUONYMUS foliis ovato lanceolatis, ferratis, ramis tetragonis. *Euonymus* CAMER. Epit. p. 102. *E. europaeus tenuifolius*
830. EUONYMUS pedunculis lateralibus patulis, foliis subrotundis, fructibus akatis SCOPOLI p. 315. *E. latifolius* CLUS. pann. p. 94. 95. *Chionanthus venne*.
831. STAPHYLEA foliis pinnatis LINN. *Staphyloeden* *ft. pinnata* dron CAMER. Epit. p. 171. Rarius ad sepes planitie*s*.
832. PARNASSIA. *Hepatica alba* CORD. p. 153. *H. cordifolia* aquosiss.
833. RORELLA foliis ellipticis, caule nudo paucifloro. *R. longifolia* *Salsifora* s. *sponsa solis* THAL. ic. IX. n. 2. in ruditis palustribus torfaceis.
834. RORELLA foliis petiolatis subrotundis, caule nudo paucifloro. *R. rotundifolia* *Salsifora* s. *ros solis* THAL. l. c. n. i. similibus locis.
835. STATICÆ scapo simplici capitato, foliis linearibus LINN. *Gramen polyanthemon majus* DODON. prompt. p. 564. in alpibus Griseis, inque valle Praetoria. *S. Crassifolia*

- L. sylvestre* 836. LINUM sylvestre MATTH. p. 416. Passim ad vias.  
 837. LINUM foliis linearibus lanceolatis, aristatis, calycibus ovato lanceolatis, semiembranaceis. *Linum montanum* foliis tenuibus erectis, flore ampio ZANON. p. 177. 147. in montanis & alpiniis.
- L. Harboeuse*
- L. tenuifolium* 838. LINUM f. liis linearibus, calycibus longe aristatis. *Linum sylvestre angustifolium*, flore albo IIII, CLUS. pann. p. 303. 304. ad vias calidiores.
- L. catharticum* 839. LINUM foliis conjugatis, ovatis, calycibus aristatis, patulis, lanceolatis. *Linum catharticum* BLARWELL t. 368. ad vias inque pratis.
- L. radiola* 840. LINUM tetrapetalon, caule ramissimo dichotomo BLAIR. p. 180. *Chamaelinum vulgare* VAILLANT. t. 4. f. 6. Mulhausiae in sabulosis.
- L. imperati* 841. TELEPHIUM foliis alternis LINN. *Telephium legitimum* Imperati CLUS. V. LXVII. in Valesia inferiori ad vias.
- L. littorale* 842. CORRIGIOLA LINN. Icon ØEDERI t. 354. Bafileæ, Mulhusie, Vivisci ad torrentium ripas.
- L. natans* 843. POTAMOGETON foliis firmis, petiolatis, ovatis, natantibus LINN. *Potamogeton* FUCHS p. 651. In stagnis & fluviis tranquillis.
844. POTAMOGETON rotundifolium alterum LOESEL, p. 206. ic. 65. Bernæ HAGENBACHIUS, nuper ignotum.
- L. perfoliatum* 845. POTAMOGETON foliis tenuibus, cordatis, ampliicarolis, LIMN. p. 182. *Potamogeton tertia* DODON. p. 582. in stagnis & lacubus.
- L. feriatum* 846. POTAMOGETON foliis tenuibus, ellipticis, nervis convergentibus. *Potamogeton altera* DODON. l. c. in lacubus & fossis latioribus.
- L. lucens* 847. POTAMOGETON foliis tenuibus, longissime lanceolatis. *Fontinalis major lucens*. I. B. III. p. 777. in lacubus, fluviis & fossis.
- L. crispa* 848. POTAMOGETON foliis lanceolatis, alteris, umbellatis, ferratis LINN. *Tribulus aquaticus minor* CLUS. pann. p. 715. in rivulis.
- L. Deudorix* 849. POTAMOGETON caule dichotomo, foliis conjugatis, ellipticis, complicatis, imbricatis. *Tribulus aquaticus minor* CLUS. pann. p. 714. iisdem locis.

850. POTAMOGETON foliis gramineis, petiolis erectis, vaginis laxis numerofissimis. *Potamogeton* *gramineum latifolium* foliis & ramificationibus *densissime stipatis* RAL. Syn. III. t. 4. f. 3. *P. gramineum*
851. POTAMOGETON caulis compressis, foliis gramineis, lanceolatis, spicis paucifloris OEDR. ic. 203. LOSEL 66. in paludosis torfaceis. *P. compressum*
852. POTAMOGETON caulis teretibus, foliis perangustis, spicis paucifloris minimis ic. OEDR. 186. LOSEL 67. in Gürbenmoos, Reusa fl. *P. angustum*
853. POTAMOGETON caule terete, foliis linearibus planis, spica multiflora, senescente interrupta. *Potamogeton pusillum* BOCCONE plant. sicut. p. 42. t. 20. f. 5. Passim in fossis. *P. pusillum*

## XII. CALYCIFLORÆ.

854. SALICARIA foliis lanceolatis, subhirsutis, floribus spicatis. *Lysimachia altera* CAMR. Epit. p. 687. *S. hirsutaria*  
ad fossas.
855. SALICARIA foliis linearibus, floribus in aliis sessilibus, ad RUPP. t. 6. *Hippopifolia aquatica* I. B. III. p. 792. Basileæ, Mühlusiae. *L. hirsutifolia*
856. PEPLIS petalis senis, plerumque apetala. *Glaucoides palustre* portulacæ folio, purpureo flore. MICHEL. t. 13. Basileæ rarer. *P. glaucula*

## I. I. VIII. DIPLOSTEMONES.

### I. CARYOPHYLLEÆ.

857. ELATINE foliis verticillatis LINN. *Alsinastrum Gallii* folio VALLANT. p. 6. t. 1. f. 6. Mühlusiae. *E. verticillatum*
858. ELATINE foliis conjugatis. *Alsinastrum serpilli folium* flore albo tetrapetalo VAILLANT. t. 2. f. 2. & flore roseo tripetalo f. 1. Mühlusiae. *E. trigynipsper*
859. CHERLERIA t. 21. SEGULER. suppl. t. 4. f. 3. Alpina. *C. sedoides*
860. ALSINE octostemen foliis linearibus confatis, *Alsine muscosa* quibusdam I. B. III. p. 365. in nudis rupibus montanis & subalpinis. *A. muscosa*

861. ALSINE tetrastemon, foliis lanceolatis connatis.  
*Sagina prostrata* *A sine pusilla graminea* flore tetrapetallo SEGULER  
 II. t. 5. f. 3. in arcis hortorum & testis.

862. ALSINE foliis linearibus connatis, pediculis longissimis unifloris. Icon OEDERI t. 12. in saxosis alpium. *Lugani*.

- Hellaria biflora* 863. ALSINE foliis linearibus, obtusis, calycibus viscidis. †. Alpina.

864. ALSINE caule flaccido, dichotomo, foliis linearibus acutis. † in loco die *Chus vallis Gastern*.

865. ALSINE foliis linearibus lanceolatis, hirsutis, calyce petalis æquali. Inter stipulas, in vallis.

866. ALSINE foliis linearibus glabris, petalis calyce brevioribus. *A sine tenui folia* I. B. III. p. 364. in muris.

- Aruncaria secalifolia* 867. ALSINE foliis linearibus, petalis calyce longioribus.  
*A sine saxatilis* & *multiflora capillacea* folio VAILLANT t. 2. f. 3. in saxosis montanis & subalpinis.

868. A sine foliis sulcatis, recurvis, radicalibus linearibus, congestis, caulinis lanceolatis †. Alpinum editiorum.

- Aruncaria latifolia* 869. ALSINE foliis linearibus, angustissimis, calycibus tubulosis, villosis. *A sine alpina juncea* folio C. B. prodr. p. 118. in montanis altioribus & Alpibus.

- E. universale* 870. ALSINE foliis filiformibus, pungentibus, calycibus aristatis t. 17. In glareosis aquilejensium & Valeſiæ.

- Spergula arvensis* 871. ALSINE foliis superioribus fasciculatis, imis conjugatis. *Polygonum* foliis gramineis alterum LOESL ic. 64. in torfaceis.

- Aruncaria rubra* 872. ALSINE foliis linearibus, stipulis ovato lanceolatis argenteis. *Spergula purpurea* I. B. III. p. 722. In glareosis & agris arenosis.

- Spergula arvensis* 873. ALSINE foliis verticillatis, scminibus rotundis. *Spergula Dodon.* Cereal p. 179. Passim in agris.

874. ALSINE foliis sulcatis, argute lanceolatis, petiolis unifloris. *A sine uniflora* & *grandiflora*, foliis acuminatis glabris, petalis integris ALLIONE spec. t. 10. in montibus Neocomensium.

875. ALSINE foliis ovato lanceolatis, subhirsutis, petalis calyce brevioribus. *Alsine minor* TABERN. p. 708. In muris & locis aridis. *Arenaria serpylloides*
876. ALSINE foliis ovato lanceolatis, ciliatis, petalis calyce majoribus t. 17. *Alsine serpylli folio multicaulis & multiflora* SEGUIER I. p. 421. t. 5. f. 2. *Ar. multiflora*  
Alpina.
877. ALSINE caule recto prostrato, foliis ovatis t. *Ar. biflora*.  
*Alpium editiorum.*
878. ALSINE foliis ovato lanceolatis trinerviis. *Alsine plantaginis folio* I. B. III. p. 763. ad pedem arborum. *Ar. trinervia*
879. ALSINE floribus umbellatis, petiolis serratis. *Ho-losteum caryophylleum arvense* TABERN. p. 233. *holosteum umbellatum*  
in aridis planitieis.
880. ALSINE foliis petiolatis, ovato lanceolatis, petalis bipartitis. *Alsine* TABERN. p. 706. ad vias, *Alsine media*  
sepes & in hortis.
881. ALSINE foliis lanceolatis, petalis bipartitis.  
*Anagallis aquatica quarta* LOBEL p. 479. Locis uidis.
882. ALSINE foliis lanceolatis, lineatis, petiolis ramosis. *Gramen floridum minus* TABERN. p. 232. *Stellaria graminea*  
in stipulis & fossis.
883. ALSINE caule nodoso, ramoso, foliis lanceolatis, lineatis, petiolis longissimis. *Alsine cariophylloides glabra, florum pediculis longissimi* SEGUEIER p. 174 in transalpinis. *Ceratium suaveolens*
884. ALSINE foliis gramineis ciliatis. *Gramen alterum* CAMER. p. 743. in dumetis. *Stellaria nemorum*
885. ALSINE foliis ovato cordatis, imis petiolatis, tubis quinis. *Alsine major* CAMER. epit. p. 851. *Stellaria cerasiformis*  
in fossis. *Ceratium aquatum*
886. MYOSOTIS foliis petiolatis, cordatis, tubis ternis. *Alsine montana hederacea maxima* COLUMER. ec. pbras. I. p. 289. 290. in sylvis subalpinis. *Stellaria nemorum*
887. MYOSOTIS foliis tomentosis ovatis. *Herba fasciæ auriculae multiris* MARTENS. Spitzberg t. G. n. 8. in summis alpibus. *Ceratium latifolium*
888. MYOSOTIS foliis ovato lanceolatis, subhirsutis, petalis calyce duplo longioribus. *Alsines myosotis* *alsine alpina*

sotis facie *Lychnis alpina* flore ample nivio re-  
pens RAI. SYN. III. t. 15. f. 2. *alpina* etiam  
montana.

889. MYOSOTIS foliis linearibus lanceolatis, petalis  
*C. arvensis* calyce duplo longioribus. *Ajine myosotis ar-  
vensis polygoni* folio VAILLANT. p. 141. t. 30.  
f. 5. ad vias planitiei.

890. MYOSOTIS foliis lanceolatis glbris, petiolis re-  
fractis. †. summarum alpium.

891. MYOSOTIS foliis linearibus tomentosis. *Ocymo-  
des Lychnites* COLUMN. post phytobas. p. 20.  
*C. tomentosum* in muris calidiorum.

892. MYOSOTIS foliis linearibus glabris. *Caryophyllus  
holosteus alpinus gramineus* C. B. prodr. p. 104.  
*C. strictum* Alpina.

893. MYOSOTIS foliis ovato lanceolatis, petalis caly-  
*C. vulgarium* xis longitudine. *Myosotis arvensis hirsuta par-  
vo* flore albo VAILLANT. p. 142. t. 30. f. 2.  
ad vias.

894. MYOSOTIS caule simplici, foliis ovatis hispitis,  
*C. semicaudatum* tubis ternis. *Myosotis arvensis hirsuta minor*  
VAILL. t. 30. f. 2. ad vias aridas.

895. MYOSOTIS hirsuta & viscosa VAILLANT. t. 30.  
*C. viscosa* f. 1. similibus locis.

896. TUNICA ramis unifloris & bifloris, petalis levibus,  
*Giantius Caryophyl-  
lus* stipulis calycinis brevissimis. *Caryophylli flores  
sylvestres* CAMBR. epit. p. 351. ad rupestria la-  
cuum supercilia.

897. TUNICA foliis glaucis, patentibus, floribus ferrari-  
*D. plumaria* tis, fauibus lanuginosis. *Caryophyllus sylvestris*  
V. CLUS. pann. p. 320. 321. in rupibus sabulosis.

898. TUNICA petalis minutissime laciniatis. *Caryo-  
phyllus sylvestris VI.* CLUS. pann. p. 323. ad  
vias perque nemora.

899. TUNICA fasciculis trifloris ramos terminantibus,  
*D. carthusianum* stipulis aristatis maximis. *Caryophyllus arvensis*,  
calyculo florum numero, LOESEL ic. 7. ad  
vias planitiei.

900. TUNICA floribus umbellatis, squamis calycinis  
hirsutis, mucronatis, tubum æquantibus. *Ca-  
ryophyllus barbatus* SAGVIER. t. 7. passim ad vias,  
in primis planitiei.

901. TUNICA capitulo ovali, compacto, calyce univertali quadrifolio. *Caryophyllus sylvestris prolifer*. SEGUERR. t. 7. ad vias aridas calidiorum.
902. TUNICA calycibus pelyiformibus. *Betonica coronaria* f. *Tunica minima* I. B. III. p. 337. in *Gypsophyla* *saxifraga*
903. SAPONARIA foliis filiformibus, caule diffuso, brachiato. *Spergula folio Knawel flore purpurascente minor* Eph. Nat. Cur. Cent. VI. p. 273. t. 4. inter stipulas. *Gypsophila muralis*
904. SAPONARIA foliis gramineis, congestis, floribus umbellatis, petalis ovatis. *Lychnis floribus umbellatis, ochroleucis, petalis ovatis, filamentis nigris* ALLIONE spec. p. 29. t. 5. f. 2. in M. *Terananche*, Valesiae finitimo. *f. laticea*
905. SAPONARIA radice lignosa, maxima, foliis pulposis, petalis emarginatis. *Caryophyllus alpinus Linaria* foliis, floribus variegatis BOCCONE p. 23. t. 5. in subalpinis, etiam in alluvionibus fluviorum. *Gypsophyla* *recessed.*
906. SAPONARIA foliis pulposis, linearibus, caule umbellato, erecto, petalis ovatis ad RUPP. t. III. f. 2. SCHUECHZERUS in alpibus Rhæticis. *Gypsophila fastigiata*
907. SAPONARIA calycibus pyramidatis, quinquangularibus, foliis ovatis, connatis. *Thamæcneomon Cordi* p. 104. in segetibus planitie. *f. Vacaria*
908. SAPONARIA foliis ovato lanceolatis, trinerviis, floribus tubulosis umbellatis. *Saponaria Dodon. coron.* p. 78. ad vias. *f. officinalis*
909. SAPONARIA caulis decumbentibus, nodosis, foliis ovato lanceolatis, calycibus tubulosis hirsutis. *Ocymoides repens Polygoni folio LOBEL.* p. 341. ad vias & rupes arenosas. *f. Ovatoidea*
910. VISCAГО foliis ovato lanceolatis, tomentosis, caulis unifloris. *Lychnis pumila saxatilis alpina*, flore carneo, folio crasso, molli, tomentoso ALLIONE. in summis alpibus *Valsuicis*, M. *Sylvio*, *Pennino*. *f. Sise Vallaria*
911. VISCAГО foliis ovato lanceolatis, hirsutis, caule brachiato, calycibus venosis. *Ocymoides noctiflora* rum C. B. Basil. ic. 34. *Besilex* in segetibus. *f. noctiflora*

- Lumbulus* 912. VISCAGO baccifera petalis ferratis. *Alpine repens* DODON. p. 403. Genevæ.
- bacciferus* 913. VISCAGO caule brachiato, nodoso, calycibus inflatis, venosis. *Herba articularis* TABERNÆM. p. 298. ad vias in alpes usque.
- Luz. betae* 914. VISCAGO foliis ellipticis, calycibus lineatis, viscidis, petalis ovatis. *Viscago hirta gallica*, flore parvo carneo, petalis integris DILLEN. hort. Elth. t. 299. in transalpinis.
- Filum gallicum* 915. VISCAGO foliis lanceolatis, hirsutis, floribus paniculatis nutantibus. *Lychnis sylvestris albo flore* CLUS. pann. p. 328. ad vias, rupes.
- f. cicutaceum* 916. VISCAGO foliis glabris, ovato lanceolatis, floribus umbellatis. *Armerius flos tertius* DODON. coron. p. 73. in Valecia inferiori, circa Roche.
- f. rupestris* 917. VISCAGO foliis lanceolatis, caulibus brachiatis, calycibus infundibuliformibus, floribus laxe umbellatis, erectis. *Auricula muris alpina glabra* I. B. III. p. 360. alpina, etiam montana.
- Syberia dentata* 918. VISCAGO foliis teneris recurvis, petalis quadrifidis. *Alpine alpina glabra folio reflexo* PLUKNET. p. 23. t. 15. f. 5. in alpibus aquilejensibus.
- f. foliæ Quanticæ* 919. VISCAGO foliis gramineis, caule brevissimo, unifloro. *Caryophyllus pumilus alpinus* VII. CLUS. pann. p. 329. alpina.
- Lumbulus Orites* 920. VISCAGO floribus verticillatis, spicatis, sexu distinctis, petalis linearibus. *Sesamoides magnum Salmanticense* CLUS. p. 295. in aquilejensi domino, Valecia &c.
- L. foliæ laevi* 921. LYCHNIS petalis quadrifidis. *Caryophyllus pratensis* TABERN. p. 291. in pratis.
- L. Alpinus* 922. LYCHNIS foliis linearibus, lanceolatis, floribus umbellatis capitatis t. 17. alpium editiorum.
- L. Dioica* 923. LYCHNIS floribus sexu distinctis. *Ocymoides flore purpureo* CAMER. epit. f. 739. & *Ocymoides album multis* I. B. III. p. 292. ad vias & rivos.
- Urticaria foliæ joviæ* 924. LYCHNIS tomentosa, umbellis paucifloris, petalis cordatis. *Lychnis umbellifera montana Helvetica* ZANON, nov. t. 110. in alpibus Valeciacis & Insubricis.

925. LYCHNIS tomentosa , calycibus costatis , floribus  
longe petiolatis. *Lychnis CAMER.* epit. p. 568. *L. coronariae*  
in Valesia inferiori.
926. LYCHNIS calycibus longissime caudatis. *Nigella*. *L. githago*.  
*strum DODON.* *coron.* p. 49. in agris.
927. LYCHNIS foliis lanceolatis , floribus verticillatis  
spicatis. *Lychnis sylvestris I.* CLUS. *pann.* p. 328. *L. viscaria*  
329. in Valesia inferiori ad vias.
928. OXYS scapo unifloro , foliis ternatis , radice squa-  
mose articulata LINN. *Trifolium acetosum Do-*  
*DON. cereal.* p. 214. ad sepes & borumque radicees.
929. OXYS caule ramoso , diffuso , petiolis alaribus  
paucifloris , umbellatis LINN. *Oxys flore luteo*  
*DODON. purg.* p. 414. *transalpina*.
930. GERANIUM pedunculis unifloris , foliis septilobis,  
petalis bifidis. *Geranium III. hematodes CLUS.*  
*pann.* p. 429. 421. ad rupeſ.
931. GERANIUM caule erecto , foliis rugosis , hirsutis,  
multilobis , lobis trifidis , lobulis semipinnatis , flo-  
ribus umbellatis. *Geranium III. MATTHIOL.*  
p. 857. in montosis rarius.
932. GERANIUM caule erecto , foliis rugosis septilobis,  
lobis acute serratis , petalis emarginatis. *Gera-*  
*nium II. Batrachioides alterum CLUS.* *pann.* p. 417.  
418. ad rivorum ripas.
933. GERANIUM caule diffuso , foliis rugosis semi-  
quinquelobis , lobulis trifidis , floribus sparsis ,  
petalis integerrimis. *Geranium batrachioides pa-*  
*lustre flore sanguineo DILLEN.* *hort. Elth.* p. 160.  
t. 174. in sepibus humidis.
934. GERANIUM foliis rugosis hirsutis , semiseptilobis,  
lobis dentatis , petalis ferratis , acuminatis. *Ge-*  
*ranium I. CLUS.* *pannon.* p. 415. 416. Bernæ ,  
& in montanis pratis.
935. GERANIUM foliis semiseptilobis , rugosis , denta-  
tis , petalis planissimis , circumferratis , indivisis  
in *Aquilejensibus* & versus *Chillon*.
936. GERANIUM foliis septilobatis , rugosis , acute  
dentatis , petalis venolis , emarginatis. *Geranium*  
*incanum versicolor f. striatum HIST. OXON.* II.  
p. 516. t. 10. f. 24. in valle S. Nicolai Valesia.

- G. dissectum* 937. GERANIUM caule erecto, foliis quinquelobis, lobis trifidis, acutis. *Geranium majus*, *foliis imis longis*, *adusque pediculum divisum* VAILL. t. 15. f. 2. in agris.
- G. columbinum* 938. GERANIUM caule procumbente, foliis quinque-partitis, lobis trilobis, lobulis trifidis. *Geranium columbinum dissectis foliis*, *pediculis florum longissimis* VAILLANT. t. 15. f. 4. in agris.
- G. mollis* 939. GERANIUM foliis mollissimis, hirsutis, reniformibus, semiquinquefidiis, lobis semitripartitis obtusis. *Pes columbinus* DODON. p. 60. ad vias.
- G. pusillum* 940. GERANIUM foliis hirsutis, semiseptilobis, lobis semitriobis obtusis. *Geranium Robertianum*, *pes columbinus* TABERN. p. 56. ad vias.
- G. rotundifolium* 941. GERANIUM viscidum, caule decumbente, foliis semiquinquelobis, lobis tridentatis & quinquelobatis. In calidis scopolis, adque vias.
- G. lucidum* 942. GERANIUM foliis subrotundis, semiquinquelobis, lobis obtusis, calycibus transversim rugosis. *Geranium saxatile* οὐροσκοπελον THAL. ic. 5. Rarissimum, circa Genevam nasci dicitur.
- G. Robertianum* 943. GERANIUM foliis duplicato pinnatis, pinnis ultimis confluentibus, calycibus striatis, hirsutis. *Geranium Robertianum* DODON. p. 62. ad sepes.
- G. Cicutarium* 944. GERANIUM caule procumbente, petiolis multifloris, foliis duplicato pinnatis, pinnis acute incisis. *Geranium supinum* DODON. p. 63. *Geranium minus* TABERN. p. 57. ad vias.
- G. illoschaticum* 945. GERANIUM petiolis multifloris, caule diffuso, foliis ovatis pinnatifidis. *Geranium montanum* RIVIN. pentap. irreg. t. 110. circa Basileam, Geneva, Biennam.
- G. Cicutarium* 946. GERANIUM petiolis multifloris, foliis pinnatis, pinnis latescentibus, dentatis, alterne maximis. *Geranium Cicutae folio*, *acu longissima* C.B. prodr. p. 138. in Valesia C. B. nuper non reperta.
- Z. Terrestris* 947. TRIBULUS foliis æqualibus duodenis, conjugatis, fructu quadricorni. *Tribulus terrestris* DODON. cereal. p. 223. in valle Augusta.
- Z. geranoides* 948. TAMARISCUS spicis foliosis. *Myrica pannonica* CLUS. pann. p. 26. 27. 28. ad fluviorum ripas.

## II. SUCCULENTÆ.

949. SEDUM rosulis glabris, ciliatis, petalis quatuordecim conglutinatis, lanceolatis, hirsutis CAMERAR. epit. p. 854. in tectis & rupibus. *Sempervivum tuberosum*
950. SEDUM rosulis hirsutis, ciliatis, petalis subulato lanceolatis duodenis, *Sedum majus vulgari simile* I. B. III. p. 688. in alpibus trans M. Sylvium. *Feijoia globiflora*
951. SEDUM foliis semipatulis hirsutis, petalis novenis subhirsutis. *Cotyledon altera II. taurica* CLUS. pann. p. 481. 482. *alpina*. *Sempervivum tectorum*
952. SEDUM rosulis araneosis, calvescentibus, petalis connatis, nervosis. *Sempervivum rubrum mon. tanum YraQaλωδες* COLUMN. ecphr. p. 290. 291. *Sempervivum gracile*  
*alpina & subalpina*.
953. SEDUM sexu distinctum, foliis serratis, umbellis densissimis. *Radix Rhodia mas* CAMERAR. epit. 769. in alpinis editis australibus. *Rhodiola rosea*
954. SEDUM foliis confertis, serratis, umbellis densis terminalibus †. *Telephium album* FUCHS. p. 800. Bernæ ad sepes. *Telephium album*
955. SEDUM foliis ovatis, dentatis, conjugatis. umbellis alaribus. *Telephium I. Hispanicum* CLUS. biss. p. 331. in aquilejensibus ad rupes.
956. SEDUM caule procumbente, foliis ovatis integerrimis. *Telephium minus semperfurens* LOBEL. p. 340. in alpibus aquilejensibus. *Telephium pulchellum*
957. SEDUM foliis subrotundis, caule ramoso, floribus in alis sessilibus. *Sempervivum tertium Dioscordis* COLUMN. phytobas. p. 40. in sepibus circa Gen., nuper non visum. *Sempervivum stellatum*
958. SEDUM caulinis paniculatis, foliis ovatis, planisculis. *Cepaea MATTH.* p. 933. circa Genavam, Mendris, Chiavennam &c. ad vias. *Cepaea*
959. SEDUM caule glabro, foliis teretibus, umbellis ramosis, floribus periolatis. *Sedum minus* I. CLUS. p. LIX. & II. EJ. in muris & ad rupes. *Sedum minus*
960. SEDUM caule hirsuto, ramis simplicibus, floribus in alis sessilibus. *Sedum arvense flore rubente*, C. B. prodr. p. 132. Basileæ. *Capsula rubra*

961. *SEDUM* foliis conicis, obtusis, glaucis, reticulatis, caule ramoso viscidio. *Sedum minus* VII. CLUS. p. LX. in agro Vaudensi ad muros, etiam in alpibus.
962. *SEDUM* hirsutum & viscidum, foliis linearibus, obtusis, planiusculis. *Sedum palustre* II. CLUS. pann. p. 486. 487. ad rupes humectas inque pratis uidis montanis.
963. *SEDUM* caule folioso, erecto, umbellato, humilimo, foliis teretibus. *Sedum saxatile atrorubentibus floribus* SCHREUCHZER. It. I. t. 6. f. 34. *alpina saxa*.
964. *SEDUM* caule ramoso, prostrato, foliis teretibus remotis, floribus longe sessilibus. *Icon OEDERI* t. 39. in alpibus edulis rarius.
965. *SEDUM* foliis teretibus, ternatis, caulis simplificibus trifidis. *Aizoon minimum* CORD. p. 78. ad vias aquilejenses.
966. *SEDUM* foliis conicis, confertis, caulis ramosis, supremis trifidis. *Sedum minimum* TABERN. p. 844. ubique in muris & sterilibus.
967. *SEDUM* foliis semiteretibus, acutis, aristatis, caule suprimeo multifido, umbellato. *Sedum minus* V CLUS. p. LX. ad rupes.
968. *PORTULACA* foliis dilatatis, levibus, sessilibus, confertis. *Portulaca sylvestris minor* s. *Spontanea* I. B. III. p. 678. in gatreis ad fluviorum ripas.
969. *SAXIFRAGA* foliis lanceolatis, ciliatis, compactis, caule unifloro. *Sedum alpinum* IIII. COLUMN. epiphys. II. p. 66. 67. *alpinum*.
970. *SAXIFRAGA* foliis duris, ciliatis, caule ramoso, paucifloro. *Saxifraga Sedii foliis crenatis asperis* SCHREUCHZER. It. II. p. 140. t. 20. f. 3. *alpina*.
971. *SAXIFRAGA* foliis ellipticis, ciliatis, caule simplici, folioso, paucifloro. *Sedum alpinum* I. CLUS. pann. p. 484. 485. *montanae & alpinæ viae toridae*.
972. *SAXIFRAGA* foliis aurantiis maculosis alpinæ glareæ. *Saxifraga angustifolia autumnalis*, flore luteo guttato BABYNE Cent. c. 48. ic. 38. *torfaccea* Juræ.

973. SAXIFRAGA foliis rhomboideis, acute serratis, *s. pellucida*  
caule nudo ramoso. *Sanicula montana minor* CLUS. pann. p. 441. ad rivulos alpinos.
974. SAXIFRAGA foliis petiolatis, obtusis, caule fragili, nudo, ramoso. *Cotyledon altera* MATTHIOL. p. 1123. in rupibus alpinis & subalpinis.
975. SAXIFRAGA foliis reniformibus, acute serratis, *s. rotundifolia* hirsutis, petiolatis, caule ramoso. *Sanicula montana I.* CLUS. pann. p. 410. alpium & Juræ.
976. SAXIFRAGA foliis radicalibus reniformibus, obtuse dentatis, caulinis palmatis. *Saxifraga Docon.* p. 315. 316. ad vias arenosas.
977. SAXIFRAGA foliorum ora cartilaginea, caule trilobato ramoso, petalis immaculatis. *Sedum ser. ratum*, flore albo, *multiflorum* DODART. mem. p. 131. in summis alpibus, & earum vallibus saxosis.
978. SAXIFRAGA foliorum ora cartilaginea ferrata, *s. luteola* petiolis paucifloris, petalis punctatis. *Aizoon serratum* CORD. p. 92. alpina & montana saxosa.
979. SAXIFRAGA foliorum ora cartilaginea, rarissime dentata, petalis maculosis t. 16. *Geum alpinum majus viscosum*, foliis oblongo rotundis, atrorubentibus & croceis floribus SCHREUCHZER. It. II. p. 124. in quibusdam rupibus subalpinis.
980. SAXIFRAGA caule repente, foliis quadrifariam imbricatis, cartilagineis, ciliatis. *Saxifraga alpina*, flore cæruleo SCHREUCHZER. It. II. p. 140. t. 20. f. 3. *alpina saxosa frigida*.
981. SAXIFRAGA foliis imbricatis, ovatis, caulis reptantibus bifloris t. alpes Valesiacæ & aquilejenses editiores.
982. SAXIFRAGA foliis crassis, duris, recurvis, subtus fulcatis, basi ciliatis. *Sedum alpinum minimum* flore cinereo, floribus candidis SCHREUCHZER. It. II. p. 141. t. 21. f. 2. *alpina saxosa editiora*.
983. SAXIFRAGA foliis compactis, plicatis, pungentibus, caule viscido, paucifloro. *Saxifraga alpina*, foliis glaucis acutis, monanthos, caule folioso SEGUIER. *Suppl. p. 201. t. 5. f. 2.* in alpibus editissimis Rhætiæ & Valesiacæ.

984. SAXIFRAGA foliis hirsutis, ellipticis & tridentatis,  
*f. Deeply lobed* caule paucifloro *It. Helv. II.* p. 292. t. 2. *Sedi*  
*f. Andreacea* *alpini III. Fr. Gregorii varietas foliis incisis Co-*  
*Lumn. ecpbraf. II.* p. 66. 67. *alpina.*
985. SAXIFRAGA foliis mollibus, subhirsutis, ellipti-  
*cis*, caule paucifloro †. in alpinis saxis riguis  
*aquilejensibus & Valesiacis.*
986. SAXIFRAGA foliis petiolatis, trilobatis, caule e-  
*recto*, ramoso & folioso. *Paronychia III. TA-*  
*BERN. p. 805.* in muris, tectis & rupibus.
987. SAXIFRAGA caule folioso, multifloro, foliis pal-  
*matis*, hirsutis †. *Saxifraga foliis palmatis, cau-*  
*le denso, folioso, florigeru ALLIONE p. 12. t. 3.*  
*alpes editæ aquilejenses & Valesiacæ.*
988. SAXIFRAGA foliis integris & trifidis, caule sub-  
*nudo paucifloro SCHREUCHZ. It. II.* *Tridactylites*  
*alpina I. B. III. alpina.*
989. SAXIFRAGA foliis petiolatis trifidis, caule sub-  
*nudo viscoso. Sedum alpinum VII. Clus. pann.*  
*p. 491. alpina & hercynica.*
- ?990 SEDUM caule folioso, ramoso, foliis palmatis;  
*glaberrimis. Saxifraga tridactylites pyrenaica lati-*  
*folia I. R. H. inter plantas SCHREUCHZERORUM.*  
*locus natalis ignoratur.*

## III. EPICARPIÆ.

- A. Eupatorium* 991. AGRIMONIA foliis pinnatis, pinnis alterne mi-  
*nimis. Eupatorium MATTHIOL. p. 101. ad vias.*
- M. Myriophyllum* 992. PENTAPTERIS floribus alaribus. *Myriophyllum*  
*aquaticum minus VAILLANT. Mem. de l' Acad.*  
*verbiplattense* *1719. p. 27. t. 2. f. 3. passim in fossis aqua ple-*  
*nis.*
- M. Hyoscyamus* 993. PENTAPTERIS spica nuda. *Myriophyllum aqua-*  
*ticum majus VAILLANT. in lacubus & fossis*  
*majoribus.*
- O. Oenothera* 994. OENOTHERA foliis ovato lanceolatis, planis,  
*caule hirsuto. Hyoscyamus Virginianus I. AT.*  
*PIN. exot. p. 325. 326. in sylvis & ad vias.*
- L. Lysimachia* 995. EPILOBIUM foliis semiamplexicaulibus, lanceola-  
*tis, hirsutis. Lysimachia purpurea FUCHS. p. 491.*  
*& flore*

995. fiore parvo. *Lysimachia siliquosa* parvo fiore C.B.  
prodr. p. 116. ad fossas.
996. EPILOBIUM foliis ovato lanceolatis, glabris, dentatis. *Pseudolysimachium purpureum* primum DODON. p. 85. ad vias & fossas. *L. mucronatum*.
997. EPILOBIUM foliis lanceolatis glabris dentatis TABERN. p. 854. in aquosis. *L. tetragonum*
998. EPILOBIUM foliis glabris, ellipticis, integerrimis. *Lysimachia siliquosa minor* TABERN. p. 856. in fossis & paludosis, forte non satis diversum. *L. gallicum*
999. EPILOBIUM foliis glabiis, ovatis. *Chamenerium alpinum* *Alsines* foliis SCHREUCHZER. It. II. p. 132  
It. IV. p. 332. *L. alpinum*
- 1000 EPILOBIUM flore difformi, foliis lanceolatis, transversim nervosis. *Chamenerium* DE BRY fl. rib. t. 42. *L. angustifolium*
- 1001 EPILOBIUM flore difformi, foliis linearibus †. *Pseudolysimachium purpureum minus* DODON. p. 5 ad torrentium glareas.

## IV. PETALORUM NUMERO IN EADEM

## PLANTA VARIO.

- 1002 HYPOPOITYS spica florida nutante. *Hypopitys Rivin. tetrap. irreg.* in sylvis abiegnis. *Mouotropis hypopithis*
- 1003 RUTA foliis duplicato pinnatis, lobulis ovatis. *Ruta sylvestris* DU HAMEL II. ic. 61. saxosa Valles inferioris.
- 1004 RUTA foliis duplicato pinnatis, linearibus, lanceolatis. *Ruta sylvestris* CAMER. epit. p. 495 M. *Pilatius*. *R. graveoleus*
- 1005 MOSCHATELLINA. *Moschatella* CORD. p. 172. h. *Odoxa Moschata*

## V. BACCIFERÆ.

- 1006 PARIS. *Herba Paris* MATTHIOL. p. 1193. um. *P. quadrifolia*  
brosa.
- 1007 PHYTOLACCA floribus petiolatis decemfidis. *Bletum americanum* MUNTING. ic. 112. in transalpinis. *P. Decandra*

## VI. CORNICULATE.

- 1008 PYROLA racemo unilaterali LINN. *Pyrola II.*  
*tenerior* CLUS. pann. p. 505. 506. in sylvis.
- 1009 PYROLA foliis subrotundis, tubis rectis. *Pyrola minor* RIVIN. pentap. irreg. t. 134. in sylvis.
- 1010 PYROLA foliis subrotundis, tubis recurvis. *Pyrola folio rotundo* RIVIN. t. 135. perinde.
- 1011 PYROLA scapo unifloro LINN. *Pyrola flore singulari* RIVIN. t. 137. subalpina aquilejensis.
- 1012 ERICA foliis imis simplicibus adpressis, floralibus calcaratis. *Erica prima* MATTHIOL. p. 152. ad oras sylvarum.  
*B.* foliis omnibus calcaratis. *Erica tertia* CORTUFI I. B. I. P. II. p. 358, in sylvis alpinis.
- 1013 ERICA foliis patentibus, quaternis, acutis, cadiuis, flore calyce longiori, antheris eminentibus. *Erica III.* CLUS. pann. p. 33. 34.  
*B.* planta junior. *Erica III.* CLUS. pann. p. 33. 34. subalpina.
- 1014 ERICA ramis erectis, tomentosis, foliis perangustis, acutis, confertis, flores superantibus. *Erica I.* CLUS. pann. p. 21. transalpina.
- 1015 RHODODENDRON foliis ellipticis, glabris, subtus rubiginosis. *Rhododendron foliis glabris, subtus leprosis, mollis, infundibuliformibus.* JAC. QUIN. obs. t. 16. *alpina*, etiam montium editiorum.
- 1016 RHODODENDRON foliis ovatis, ciliatis, subtus punctatis. *Ledum alpinum* CLUS. pann. p. 73. 74. *alpina*.
- 1017 ANDROMEDA foliis alternis linearilanceolatis LINN. *Flor. Lap.* t. 1. f. 2. *torfacea*.
- 1018 ARBUTUS caulinibus procumbentibus, foliis duris integerrimis. *Uva urfi* CLUS. bish. p. 79. passim in montanis & alpinis.
- 1019 ARBUTUS caulinibus procumbentibus, foliis rugosis ferratis. *Vitis idaea prima* CLUS. pann. p. 77. 78. subalpina.
- 1020 VACCINIUM foliis venosis, ovato lanceolatis serratis,

## VI. CORNICUL. VII. TUEUL. VIII. DIFF. 91

- ratis, caule anguloso. *Myrtillus* CAMBR. epit.  
p. 135. sylvæ abiegnæ.
- 1021 VACCINIUM foliis integerrimis, ovatis, venosis.  
*Vitis Idæa* IL. CLUS. pann. p. 77. 79 torfacea.
- 1022 VACCINIUM foliis perennantibus, ovatis, subtus  
punctatis, oris contractis. *Vitis Idæa rubra*  
CAMBR. epit. p. 316. sylvæ abiegnæ.
- 1023 VACCINIUM caule prostrato, foliis ovato lan-  
ceolatis, acutis, flore quadripartito. *Oxycoccus*  
CORD. bist. II. p. 1466. torfacea.

## VII. FLORIBUS TUBULOSIS.

- 1024 THYMELÆA spica cylindrica, superne foliosa.  
*Chamælea Germanica* DODON. purg. p. 130. in  
sylvis.
- 1025 THYMELÆA foliis perennantibus, ellipticis, flo-  
ribus ex alis nutantibus. *Laureola* DODON. purg.  
p. 172. in aquilejensibus &c. per dumeta.
- 1026 THYMELÆA feliis ellipticis, calvescentibus, flo-  
ribus aggregatis, sessilibus, hirsutis. *Chamælea*  
*hirsuta* nomine data I. B. I. P. I. p. 569. in M.  
Saleva, aux Rochers de Moron &c.
- 1027 THYMELÆA foliis glabris, linearibus, aristatis,  
floribus sessilibus umbellatis. *Cneorum* CLUS.  
pann. p. 54. 55. in alpinis non frequens, etiam  
in montanis.
- 1028 STELLERA foliis linearibus, floribus quadrifidis  
LINN. *Linaria altera botryoides montana* CO-  
LUMN. ecphras. p. 81. 82. stipulæ calidiorum.

## VIII. FLORE DIFFORMI MONOPETALO.

- 1029 ARISTOLOCHIA feliis cordatis, caule erecto,  
floribus axillaribus confertis LINN. *Aristolochia*  
*multiflora* RIVIN. monop. t. 18. in ierius.
- 1029\* ARISTOLOCHIA feliis cordatis crenulatis, sub-  
tus reticulatis, petiolatis, floribus solitariis LINN.  
*Pistolochia* DODON. purg. p. 19. in M. Zere  
vallis Tellinæ.

## IX. PO.

## IX. POLYPETALO.

- 1029\*\* FRAXINELLA RIVIN. *pentap.* *irreg.* t. 132. in  
Valesia, circa Scaphusiam.  
1029\*\*\* HIPPOCASTANUM. *Castanea* *folio multifido*  
*Clus.* *bijt.* p. 7. in ambulacris.

## X. STAMINIBUS DICOLOBIS OCTONIS.

- 1029\*\*\*\* ACER foliis quinquelobis, dentibus acutis,  
intervallis lunatis, racemis erectis. *Acer platanoides* MUNTING. f. II. in sylvis & ambulacris.  
1029\*\*\*\* ACER foliis quinquelobis, acute ferratis,  
racemis pendulis. *Platanus* TRAG. p. 1029. b.  
in montanis.  
1029\*\*\*\*\* ACER foliis semitrilobis obtusis, lobis la-  
teralibus emarginatis. *Acer TABERNÆM.* p. 973.  
in sepiibus.

## I. I. IIX. POLYSTEONES.

## I. ASCYROIDEÆ.

- 1030 TILIA foliis cordato lanceolatis, spongiolis ad  
nervorum angulos sessilibus. *Tilia vulgaris plati-*  
*phyllos* I. B. I. P. II. p. 133.  
*E.* *Tilia sylvestris* TRAG. p. 1111. in sylvis rarius-  
cule & compitis.  
1031 CISTUS fruticosus, foliis petiolatis, ovatis, ru-  
gosis, ferratis. *Cistus semina* CLUS. *bijb.* p. 140.  
141. ad transalpinos lacus.  
1032 CISTUS foliis duris, linearibus, confertis, pe-  
tiolis unifloris, calycibus glabris. *Chamaecistus I.*  
*angustifolius* CLUS. *pann.* p. 59. in lapidosis a-  
pricis planicie.  
1033 CISTUS foliis conjugatis, ellipticis, hirsutis,  
integerimis, petiolis unifloris subhirsutis. *He-*  
*lianthemum germanicum* TABERN. p. 1062. ad  
vias.

1034

- 1034 CISTUS caulis duris, procumbentibus, foliis conjugatis, ellipticis, subhirsutis, petiolis confertis unifloris, calycibus tomentosis. *Chamæciostus serpylli* folio nigricante & flore aureo odorato I. B. II. p. 47. alpina, etiam montana editiora.
- 1035 CISTUS caulis duris, procumbentibus, foliis ellipticis, hirsutis, inferne cum calycibus tomentosis. *Helianthemum alpinum* folio *Pilosella minoris* Fuchſii I. B. II. p. 18. montana.
- 1036 CISTUS foliis crassis, tomentosis, ellipticis, linea exaratis. *Helianthemum montanum*, polii folio incano, flore candido Hort. Elth. t. 145. circa *Sedumum* legi: & inter plantas Pilati M. est.
- 1037 HYPERICUM caule terete, alato, ramosissimo, foliis ovatis perforatis. *Hypericum* DODON. p. 76. in arvis, ad vias.
- 1038 HYPERICUM caule quadrangulo, foliis ovatis, perforatis, punctatis. *Androsaemum CAMBR.* epit. p. 677. in fossis.
- 1039 HYPERICUM caule prostrato, foliis ovatis, calycibus ferratis punctatis. *Hypericum minus*, DODON. p. 76. inter stipulas.
- 1040 HYPERICUM foliis quaternis, linearibus, calyce ferrato, dentibus glanduligeris. *Coris CAMBR.* epit. p. 678. in M. Wiggis Glarönenſ.
- 1041 HYPERICUM foliis amplexicaulibus, cordatis, calycibus ovatis, ferratis, glanduligeris. *Hypericum pulchrum* TRAG. p. 74. Basileæ, Mühlhusiæ, in Creux du vent.
- 1042 HYPERICUM foliis ovatis, ora punctata, calycibus lanceolatis, ferratis, glanduligeris. *Androsaemum Canipoclarensium* COLUNN. ecphras. p. 73. 74. in dumetis.
- 1043 HYPERICUM foliis ovatis, hirsutis, calycibus lanceolatis, ferratis, glanduligeris. *Androsaemum alterum hirsutum* COLUNN. p. 74. 75. ad vias, sepes, sylvas.

## II. NECTARIFERÆ.

- 1044 TITHYMALUS foliis ellipticis, stipulis umbellaribus, quaternis, petalis bicornibus succiferis. *Lathyris* DODON. purg. p. 162. *Helvetia calidior & transalpina*.
- 1045 TITHYMALUS foliis ellipticis, hirsutis, stipulis umbellaribus obscuris, floralibus connatis, petalis lunatis. *Tithymalus lunato flore COLUMN. ecphras.* II. p. 56. 57. in sylvis & dumetis.
- 1046 TITHYMALUS foliis linearibus, petalis emarginatis. *Ejula minor* DODON. purg. p. 159. circa *Haltingen*. non satis certa planta.
- 1047 TITHYMALUS foliis linearibus, stipulis numerosis, floralibus cordiformibus, petalis lunatis. *Tithymalus Cyparissias* CAMER. epit. p. 964. ad vias.
- 1048 TITHYMALUS foliis linearibus, stipulis lanceolatis arittatis. *Ejula exigua* TRAG. p. 296. inter stipulas.
- 1049 TITHYMALUS foliis rotundis, stipulis floralibus cordatis obtusis, petalis argute corniculatis. *Peplos* DODON. purg. p. 162. in agris & hortis.
- 1050 TITHYMALUS foliis petiolatis, subrotundis, serratis, stipulis rotundis ferratis. *Tithymalus bellioscopius* CAMER. epit. p. 963. similibus locis.
- 1051 TITHYMALUS foliis ellipticis ferratis, stipulis umbellaribus quinis, floralibus cordatis, fructu asperrimo. *Ejula solisequa* RIVIN. tetrap. irreg. t. 117. in sylvosis, & pratis montanis.
- 1052 TITHYMALUS foliis ellipticis ferratis, stipulis umbellaribus quinis, floralibus obtuse quadrangulis, fructibus undique exasperatis. *Tithymalus verrucosus* I. B. III. p. 673. Basileæ, circa *Chillon* &c.
- 1053 TITHYMALUS foliis lanceolatis, ferratis, stipulis floralibus cordatis, fructibus asperis, lineis levibus divisis. *Tithymalus platypbyllus* I. B. III. p. 670. ad vias.
- 1054 TITHYMALUS foliis ellipticis, ramis umbellam super-

superantibus, capsulis exasperatis. *Efula palustris*  
RIVIN. t. 116. in pratis uidis.

- 1055 TITHYMALUS floribus linearibus, aristatis, imbricaris, stipulis umbellatibus ovato lanceolatis, floralibus cordatis. *Tithymalus paralias* DODON. purg. p. 144. in aquilejensium glareis, ad vias Valesiæ, Michelfeldæ.

- 1056 RESEDA hexapetala, foliis pinnatis, undulatis, calyce sexfilo. *Reseda Plinii Neotericorum &c.* LOBEL. ic. p. 722. ad vias planitie.

- 1057 RESEDA foliis radicalibus integris, caulinis integris & semitrilobis, calycibus sexfidis, florem superantibus. *Phyteuma Monspeliensium* LOBEL. p. 718. circa Dardagny hanc longe Geneva.

- 1058 RESEDA foliis ellipticis, obtuse lanceolatis, undulatis, calycibus quadifidis. *Antirrhinum* TRAG. p. 362. ad vias & in ruderosis.

### III. RHOEADEÆ.

- 1059 CHELIDONIUM lobis foliorum subrotundis. *Chelidonium majus* FUCHS. p. 865. ad muros, & macerii.

- 1060 GLAUCIUM foliis radicalibus semipinnatis, caulinis amplexicaulibus. *Papaver corniculatum*, DODON. purg. p. 336. ad glareosa litora lacus Neocomensis.

- 1061 PAPAVER foliis hispidis, pinnatis, pinnis lobatis, capsulis ellipticis, hispidis. *Argemone capitulo breviore* LOBEL. ic. p. 276. in agri Argo-viæ, Basileæ.

- 1062 PAPAVER caule nudo, unifloro, foliis pinnatis, pinnis integris & divisis, capitalis subrotundis hispidis. *Papaver alpinum Coriandri folio* SÉGUYER p. 416. t. 4. f. 4. in monte Pierre plate, Pilato.

- 1063 PAPAVER foliis hispidis pinnatis, pinnis lobatis, fructu ovato levi. *Papaver erraticum capitulo longissimo glabro* I. B. & ad RUPP. p. 79. in agris planitie.

- 1064 PAPAVER foliis semipinnatis, hispidis, fructu ovate

- ovato glabro. *Papaver erraticum* DODON. purg. p. 333. in agris.
- 1065 PAPAVER calycibus capitibusque glabris, foliis amplexicaulibus incisis LINN. *Papaver sativum* III. DODON. purg. p. 329. in agris & ad mæcieries.
- 1066 NYMPHÆA calyce pentaphyllo, petalis majori, fructu conico. *Nymphaea lutea* MATTHIOL. p. 893. in fossis & stagnis.
- 1067 NYMPHÆA calyce quadrifolio, petalis minori, fructu sphærico. *Nymphaea alba* MATTHIOL. p. 893. in fossis & stagnis lentisque flaviis vulgarior.
- 1068 HYDROCHARIS LINN. *Ranœ morsus* DODON. cereal. p. 228. in fossis circa magnos lacus.

## IV. COLUMNIFERÆ.

- 1069 MALVA caule erecto, foliis lobatis, lobis serratis, quinis & septenis. *Malva vulgaris flore majori, foliis sinuatis* I. B. II. p. 949. ad vias.
- 1070 MALVA caule repente, foliis cordato orbicularibus, obsolete quinquelobis LINN. *Malva syvestris pumila* DODON. p. 653. ad vias.
- 1071 MALVA caule erecto, foliis scabris, trilobatis, lebis lateralibus bipartitis, medio tripartito & quinquepartito. *Alcea* MATTH. p. 927. ad vias.
- 1072 MALVA foliis radicalibus reniformibus incisis, caulinis quinquepartitis pinnatis, pinnis dentatis. *Malva montana* f. *Alcea rotundifolia laciniata* COLUMN. ecpbras. p. 147. 148. Bernæ ad vias.
- 1073 ALTHÆA foliis radicalibus reniformibus, caulinis palmatis, trilobis & quinquelobis, calycibus hispidis. *Alcea villosa* I. B. II. p. 1067. in aquilejensibus & Vaudensibus montanis.
- 1074 ALTHÆA tomentosa, herbacea, caule erecto, foliis cordato lanceolatis obsolete trifidis. *Althaea* CAMBR. epit. p. 667. circa fluvios & lacus.
- 1075 ABUTILON foliis tome tosis, cordatis, petiolatis, siliquis bicornibus. *Abutilon Avicennæ* H. Aichjt. a. f. 6. t. 16. f. 1. in montibus inter Bergamum & vallem Téllinani.

## V. FRUCTU MOLLI.

## I. FLORE CIRCUMDATO.

- 1076 ACTÆA foliis circum serratis, duplicato pinnatis, pinnula extrema trilobata. *Christophoriana* DON. purg. f. 237. in umbrosis & sylvis.
- 1077 CAPPARIS pedunculis solitariis unifloris, stipulis spinosis, foliis annuis, capsulis ovatis LINN. *Capparis* BLAKWELL. t. 417. Transalpini muri.
- 1078 AMYGDALUS foliis glabris, ovato lanceolatis, ferratis, imis dentibus & petiolis glandulosis. *Amygdalus amara* DU HAMEL I. p. 38. in Vale-  
sia inferiori.
- 1079 PRUNUS foliis ferratis, hirsutis, ovato lanceola-  
tis, floribus longe petiolatis. *Prunus* DU HAMEL  
II. p. 146. passim ad sepes.
- 1080 PRUNUS spinosa, foliis glabris, ferratis, ovato lanceolatis, floribus breviter petiolatis. *Prunus*  
*spinosa* MATTHIOL. p. 206. passim secundum  
vias.
- 1081 PRUNUS pedunculis geminis, foliis ovatis, sub-  
tus villosis, convolutis, ramis spinascentibus LINN.  
p. 681. circa Kilchberg, *Courtelary*, passim.
- 1082 CERASUS foliis ovato lanceolatis, ferratis, in-  
ferne subhirsutis, mucrone producto. *Cerasus*  
*sylvestris fructu rubro & nigro* I. B. I. P. I. p. 200.  
in sylvis.
- 1083 CERASUS foliis glabris, ferratis, ovato lanceolatis,  
mucrone producto. *Cerasa rubra* BLAKWELL.  
t. 449. in colle super Portvalay, a Champsé,
- 1084 CERASUS foliis subrotundis ferratis, pedunculis  
multifloris. *Machaleb* CAMER. epit. p. 91. ad  
rupes submontanas & subalpinas.
- 1085 CHAMÆCERASUS M. Generosi GESNER. hort.  
ignota nuperis.
- 1086 PADUS foliis ovato lanceolatis ferratis. *Cerasus*  
*racemosa nigra* TABERNAM. p. 988. passim ad  
sepes.

## VI. II. FRUCTU MOLLI CORONATO.

- 1087 MESPILUS spinosa, foliis glabris, serratis, retusis, trifidis. *Acuta Spina* MATTHIOL. p. 163. ad sepes.
- 1088 MESPILUS foliis serratis septilobis, lobis primis divergentibus. *Sorbus terminalis* MATTHIOL. p. 267. passim ad sepes.
- 1089 MESPILUS foliis ovatis serratis, subtus tomentosis. *Aria* CRANZ. fasc. II. t. 2. f. 2. in dumetis montanis & subalpinis.
1090. MESPILUS foliis ovatis serratis glabris. *Coloneaster forte* Gesneri CLUS. pann. p. 83. 84. in alpinis & montanis editissimis.
- 1091 MESPILUS foliis pinnatis, utrinque glabris. *Sorbus aucuparia* CRANZ. fasc. II. p. 49. t. 2. f. 4. in sylvis vulgo.
- 1092 MESPILUS foliis pinnatis, subtus villosis. *Sorbus sylvestris domesticæ similis* C. B. passim sativa, circa Basileam.
- 1093 MESPILUS inermis, foliis ovatis integerrimis, subtus tomentosis. *Chamæespitus* GESNER hort. p. 214. 215.
- 1094 MESPILUS foliis elliptico lanceolatis, serratis, calycibus longissimis persistentibus. *Mespilus* DODON. p. 801. in dumetis rarer.
- 1095 PIRUS foliis ovatis serratis, subtus tomentosis, calvescientibus. *Vitis Idea tertia* CLUS. pann. p. 81. 82. in adclivibus montanis & subalpinis.
- 1096 PIRUS foliis ovato lanceolatis, serratis, glabris. *Pirus sylvestris* DODON. p. 799. ad oras sylvarum.
- 1097 PIRUS foliis ovatis acuminatis, subtus hirsutis, petiolis florigeris brevissimis. *Malus sylvestris* DODON. p. 790. Similibus locis.
- 1098 PUNICA spinosa, foliis nitentibus, ellipticis, integerrimis, floribus sessilibus. *Malus punica* CAMBR. Epit. p. 131. 132. in Valezia ad rupes.
- 1099 OPUNTIA foliis ovatis, compressis, spinis setaceis. *Opuntia vulgo herbariorum* I. B. I. p. 154. ad rupes Valeziæ.

- 1100 PHILADELPHUS foliis subdentatis. *Syringa flore albo* Clus. hisp. p. 125. passim in sylvis calidioris Helvetiae.
- 1101 ROSA spinis aduncis, foliis septenis, calycibus tomentosis, segmentis pinnatis & semipinnatis, tubis brevissimis. *Rosa canina vulgo dicta DODON Cereal.* p. 182. Vulgo ad sepes.
- 1102 ROSA spinis recurvis, foliis glabris, septenis, calycibus tomentosis, segmentis subpinnatis, tubis longis barbatis †. *Rosa sylvestris asperior candida* FUCHS p. 656. ad sepes.
- 1103 ROSA spinis aduncis, foliis subtus rubiginosis. *Rosa sylvestris odorata* DODON. coron. p. 100. in dumetis & solitudinibus.
- 1104 ROSA humilis, spinis subrectis, foliis quinis, rotundis, ferratis, calycis foliis simplicibus, pinnatis & semipinnatis. *Xanthogodon* Clus. pann. p. 113. Circa Genavam.
- 1105 ROSA spinis rectis, foliis quinis tomentosis, pinnae rotundis, spinosis. *Rosa pomo spinoso folio & caule hirsuto* I. B. II. p. 38. Montana.
- 1106 ROSA spinis rectis, foliis confertis, novenis, glabris, pinnae & petiolis subspinosis. *Rosa campestris odora* Clus. pann. p. 111. 112. 114. Circa Roche & passim in submontanis.

## VII. GYMNOPOLYSPERMÆ.

### I. CALYCIFLORÆ.

- 1108 RUBUS caule spinoso, subrecto, foliis quinatis & ternatis, subtus tomentosis, fructibus hirsutis. *Rubus Idæus vulgaris* Clus. hist. p. 117. in sylvis & collibus.
- 1109 RUBUS caule spinoso, serpente, foliis quinatis & ternatis, subtus tomentosis, baccis levibus. *Rubus CAMERAR.* Epit. p. 751. In sylvis renascen- tibus & ad sepes.
- 1110 RUBUS caule aculeato prostrato, foliis ternatis. *Rubus minor* DODON. p. 748. in agris humidis & ad vias.

## 100 VIII. POLYSTEMONES

- 1111 RUBUS caule herbaceo, foliis glabris, ternatis, acinis paucissimis. *Rubus saxatilis a:pinus* CLUS pann. p. 115. 116. alpina & montana.
- 1112 FRAGARIA foliis ternatis, flagellis reptans. *Fragaria sylvestris vel montana* CAMER. epit. p. 765. ad vias & colles.  
β. absque flagellis DU CHESNE p. 204. Biennæ.
- 1113 FRAGARIA caule prostrato, foliis ternatis, retusis, sericeis. *Fragaria sterilis amplissimo folio petalis cordatis* VAILLANT. t. II. f. I. Passim ad vias.
- 1114 FRAGARIA foliis ternatis, sericeis, caule declinato, petalis calycem superantibus t. 21. *Fragaria Helvetica nana* PARKINSON p. 119. Alpes potissimum aquilejenses.
- 1115 FRAGARIA foliis ternatis, hirsutis, caulinis trinerviis, stipulis ovato lanceolatis. Icon OEDERI t. 171. Alpes editiores.
- Sibbaldia procumbens*  
1116 FRAGARIA foliis ternatis, retusis, tridentatis, flore calyci æquali, pentastemone. *Sibbaldia* LINN. Ic. OEDERI t. 32. alpium editiorum, potissimum aquilejensium & Penninarum.
- 1117 FRAGARIA tetrapetala, foliis caulinis sessilibus, quinatis. *Tormentilla* CAMER. Epit. p. 685. in pratis humectis & sylvis.
- 1118 FRAGARIA foliis quinatis, serratis, petiolis unifloris, caule reptante. *Quinquefolium* MATTH. p. 1018. ad vias vulgo.
- 1119 FRAGARIA caule decumbente, foliis quinatis, serratis, subhirsutis. *Pentaphyllum s. quinquefolium minus* TABERN. p. 123. ad vias.
- 1120 FRAGARIA caule suberecto, foliis quinis & septenis, serratis obtusis. *Fragaria opaca* LINN. Cent. I. n. 35. *Fouily*.
- 1121 FRAGARIA caule erecto, foliis quinis & septenis, acute serratis. *Quinquefolium montanum reclinum hirsutum luteum* GARIDEL t. 83. in M. *Follatet* Vallesiae.
- 1122 FRAGARIA caule reclinato, foliis quinis serratis, ora sericea t. 21. *Quinquefolium aureo flore III.* CLUS. pann. p. 426, 427. alpina & montana.

- 1123 FRAGARIA foliis ovatis, acute ferratis, oris sericeis, pappo disci longissimo. *Quinquefolium* II. CLUS. pann. p. 423. 425. in rupibus aquilejensibus, & Valesiae inferioris.
- 1124 FRAGARIA caule erecto, foliis quinatis, apice ferratis, subtus tomentosis. *Pentaphyllum minus* CAMER. epit. p. 760. in muris & sterilibus viarum.
- 1125 FRAGARIA foliis subtus tomentosis, pinnatis, pinnis primis pinnatis, ultimis simplicibus. *Pentaphylloides repens* foliis pinnatis BUXBAUM cent. I p. 49. Glacialia montis Stok Valesiae.
- 1126 FRAGARIA caule repente, foliis pinnatis ferratis, tomentosis, petiolis longis unifloris. *Potentilla* CAMER. Epit. p. 718. ad vias.
- 1127 FRAGARIA foliis pinnatis, pinnis septenis, subrotundis, ferratis. *Quinquefolium* V. CLUS. pann. p. 331. Passim Genevæ & in Valesia, infrequens.
- 1128 FRAGARIA foliis pinnatis, petalis lingulatis minimis. *Pentaphyllum palustre* CORD. p. 95. b. in torfaceis.
- 1129 GEUM foliis pinnatis, pinnis acutis, extrema maxima, trilobata, floribus conniventibus, nuantibus. *Caryophyllata alpina* nutante flore CLUS pann. p. 433. 434. ad rivos & in pratis humidis.
- 1130 GEUM foliis pinnatis, pinna ultima trilobata, floribus patulis, tubis aduncis. *Caryophyllata* DODON. pempt. p. 137. ad vias.
- 1131 GEUM foliis pinnatis, extrema maxima, rotunde cordata. *Caryophyllata montana* CAMER. Epit. p. 327. alpina.
- 1132 GEUM foliis pinnatis, trilobatis, incisis, flagellis foliosis. *Cariophyllata alpina minima* II. Spec. PON. It. bald Ital. p. 205. alpes editiores, aquilejenses &c.
- 1133 DRYAS floribus octopetalis, foliis ovatis, subtus albissimis. *Chamædrys* III. CLUS pann. p. 30. 611. alpina & montana.
- 1134 FILIPENDULA dioica, foliis duplicato pinnatis, pinnis quinquefoliis, trifoliis & simplicibus.

- Barba caprae* CAMER, hort. ic. IX. in dumetis subudis.
- 1135 *FILIPENDULA* pinnis acute serratis, minimis intermis-  
tis, extrema trilobata maxima. *Ulmaria* CLUS. pann. p. 700. in pratis subudis.
- 1136 *FILIPENDULA* foliis pinnatis, minimis inter-  
mis-*tis*, extrema trilobata. *Filipendula* BLAK-  
WELL t. 767. in Valesia inferiori, circa Basileam  
& in pratis subudis.

## VIII. GYMNOPOLYSPERMÆ.

## II. PETALIS EX RECEPΤACULO NATIS.

- 1137 *THALICTRUM* foliis adscendentibus linearibus,  
panicula erecta. *Thalictrum angustissimum* folio  
C. B. prodr. p. 146. Circa Michelfelden, & JU-  
kirch, raro, ad agrorum margines.
- 1138 *THALICTRUM* foliis erectis, lobulis acute trilo-  
bis, spica adscendente. *Thalictrum magnum*  
DONON. purg. p. 434. In aquosis pratis.
- 1139 *THALICTRUM* foliis patulis, imis obtuse tri-  
lobis, supremis acutis, panicula diffusa, flori-  
bus nutantibus. *Thalictrum parvum* DODON.  
purg. p. 435. ad rupes subalpinas & montanas.
- 1140 *THALICTRUM* foliis patulis pubescentibus,  
trilobatis, floribus nutantibus, petalis subhirsi-  
tis. *Thalictrum minimum fastidissimum* C. B.  
prodr. p. 147. in alpibus aquilejenis & Valesiacis.
- 1141 *THALICTRUM* foliis triplicato pinnatis, patulis,  
obtuse trilobatis, stipulis ovatis, paniculis um-  
bellatis. *Thalictrum flore albo* H. AICHSTETT.  
*Vern.* ord. I. t. 11. in dumetis.
- 1142 *CLEMATIS* caule scandente, foliis pinnatis, ova-  
to lanceolatis. *Vitalba* DODON. purg. p. 242.  
ad sepes.
- 1143 *CLEMATIS* caule scandente, foliis pinnatis trilo-  
batis. *Flammula* DODON. purg. p. 343. I. B. in  
Rhæria ad sepes legit, nuper non visam.
- 1144 *CLEMATIS* caule erecto, foliis pinnatis, ovato  
lanceolatis. *Flammula* MATTH. CLUS. p. 296.  
297. in Valesia inferiori & trans alpes,

- 1145 ATRAGENE foliis ternatis, foliolis ternatis, foliolis trifoliis acutis. *Clematis cruciata alpina* Pon. Ital. p. 175. in M. Speluga.
- 1146 ANEMONE tubis caudatis, involucris unifoliis multifidis, foliis linearibus hirsutis, duplicate pinnatis, pinnis tripartitis & quinquepartitis. *Pulsatilla CAMER. Epit.* p. 392. in collibus apri-  
cis & aridis.
- 1147 ANEMONE tubis caudatis, involucris multifidis, foliis pinnatis, pinnis latis, lobatis t. 21. *Pulsa-*  
*tilla apii vernalis folio flore minore* C. B. HEL-  
WING ic. 10. & 9. *alpina saxosa*, in primis  
*Aquilejensia*.
- 1148 ANEMONE tubis caudatis, involucris multifidis, foliis hirsutis, pinnatis, pinnis acute lobatis. †.  
in Vallis D. Nicolai alpibus.
- 1149 ANEMONE foliis triplicato pinnatis, acute cir-  
cumferratis, caulinis ternatis, tubis caudatis.  
*Anemone sylvestris II. CLUS. pann.* p. 382. 383.  
montana & alpina.  
G. fiore flavo. *Aquilejensia*, & *Penninus* M.
- 1150 ANEMONE seminibus lanatis, foliis digitatis, hir-  
sutis, floribus pentapetalis. *Anemone sylvestris*  
I. CLUS. pann. p. 381. 382. *Mülbusiae*.
- 1151 ANEMONE seminibus lanatis, foliis caulinis ter-  
natis, triplicato trifidis, lobulis lanceolatis,  
acute trifidis bifidisve †. *Anemone alpina alba*  
*minor* C. B. prodr. p. 94. alpes *Aquilejenses* &  
*Penninae*.
- 1152 ANEMONE seminibus lanatis, foliis radicalibus  
trilobatis & multifidis, caulinis ovato lanceola-  
tis. *Anemone DODON. purg.* p. 296. Prope  
*Roche, Moutrou*.
- 1153 ANEMONE biflora, seminibus nudis, foliis cau-  
linis, quinquepartitis, lobis tripartitis incisis.  
*Nemorosis Ranunculus luteus* LOBL ic. p. 694.  
in pra:is & nemoribus planitiei.
- 1154 ANEMONE feminibus nudis, caule unifloro, fo-  
liis caulinis, quinquepartitis, lobis tripartitis  
incisis. *Anemone V. DODON. purg.* p. 300.  
ad sepes & in dumetis.

- 1155 ANEMONE seminibus nudis, rotundis, planis, foliis septifidis imbricatis, floribus umbellatis. *Ranunculus alpinus Narcissi flore* CLUS. pann. p. 366 367. *alpina & montana*.
- 1156 HEPATICA foliis trilobatis integerrimis. *Trifolium aureum* DODON. *Cereal.* p. 216. in sylvis.
- 1157 ADONIS radice perenni, flore dodecapetalo. *Ruphtalnum* DODON. *Coron.* p. 248. in Valesia inferiori circa *Foily*, *Gonthey*.
- 1158 ADONIS radice annua, flore octopetalo. *Anemone flore pallido* CAM. *Epit.* p. 648. & *Adonis flore flammneo* H. AICHSTETT *aest. ord.* 8. t. 11. f. 3. in Valesia, Basileæ, Mühlviæ.
- 1159 MYOSURUS VAILLANT *Mem. de l' Acad.* 1719. p. 33. Basileæ, Mühlviæ.
- 1160 FICARIA BRUNFELS. ad sepes.
- 1161 RANUNCULUS fluitans, petiolis unifloris, foliis capillaceis, longissimis, laciniis parallelis. *Ranunculus f. Polyanthemo aquatico albo affine*, *millesimum maratrichyllum fluitans* I. B. III. p. 782. ad Wiesam &c.
- 1162 RANUNCULUS fluitans, petiolis unifloris, foliis capillaribus, laciniis divergentibus. *Ranunculus trichophyllum aquaticus medio luteus* COLUMER. *ecphras.* p. 315. 316. in omnibus fossis & rivis non rapidis.
- 1163 RANUNCULUS fluitans, petiolis unifloris, foliis imis capillaribus, supernis reniformibus, orbiculatis, palmatis. *Ranunculus aquaticus hepaticæ facie* LOBEL II. p. 35. in rivis ad oras vadofas.
- 1164 RANUNCULUS caule ramoso, multifloro, foliis venosis, quinquelobis, lobis rhomboideis, acutis, acute serratis. *Ranunculus montanus VI.* CLUS. pann. p. 359. 370. *alpinus & montanus*.
- 1165 RANUNCULUS caule unifloro, foliis imbricatis pinnatis, pinnis lobatis, lobis obtuse palmatis. *Ranunculus praecox rutæ folio* CLUS. hist. p. 32. *altissimæ alpes Rhætiæ, Valesia*.

- 1166 RANUNCULUS foliis pulposis, repetito trilobatis, calycibus villosis. *Ranunculus caule bifloro, calyce hirsuto* LINN. *Lapon.* t. 3. f. 1. *alpina, potissimum aquilejensia.*
- 1165 RANUNCULUS uniflorus, foliis levibus, semitrilobis, rotunde ferratis, caulinis lingulatis. *Ranunculi montani Spec. I. CLUS pann.* p. 363. 364. *alpinus & montanus.*
- 1168 RANUNCULUS uniflorus, foliis glabris, reniformibus, semiquinquelobis. *Ranunculus minimus alpinus luteus* L. B. III. p. 861. *alpinus etiam montanus.*
- 1169 RANUNCULUS foliis hirsutis, semitrilobatis, lobis lateralibus bipartitis, foliis caulinis semitrilobis. *Ranunculus hortensis II.* DODON. *purg.* p. 275. *in pratis & ad vias.*
- 1170 RANUNCULUS radice subrotunda, foliis semitrilobis, ferratis, hirsutis, receptaculo lanuginosum. *Ranunculus Breyninus CRANZ. fasc. II.* p. 91. t. 4. f. 2. *alpinus.*
- 1171 RANUNCULUS ramosus, multiflorus, foliis semiseptilobis, lobis tridentatis acutis. *Ranunculus sylvestris II.* DODON. *purg.* p. 279. *in sylvis.*
- 1172 RANUNCULUS foliosus, ramosus, erectus, foliis semitrilobatis, hirsutis, vaginis sericeis. *Ranunculus nemorosus, hirsutus, folio caryophyllatæ* LOESEL. p. 220. ic. 71. *in sylvis.*
- 1173 RANUNCULUS caule reptante, radicato, foliis semitrilobatis, lobis petiolatis. *Ranunculus hortensis I.* DODON. *purg.* p. 274. *in pratis & agris.*
- 1174 RANUNCULUS radice subrotunda, foliis hirsutis, semiseptilobis, lobis petiolatis. *Ranunculus tuberosus* DODON. *purg.* p. 290. *in herbosis.*
- 1175 RANUNCULUS foliis levibus, semitrilobatis, rotunde ferratis, fructu ovato. *Ranunculus sylvestris I.* DODON. *purg.* p. 278. *in viis uidis.*
- 1176 RANUNCULUS seminibus aculeatis, foliis tripartitis, lobis longe petiolatis, bipartitis & tripartitis, acute incisis. *Ranunculus sylvestris III.* DODON. *purg.* p. 230. *in agris.*

- 1177 RANUNCULUS foliis radicalibus integris & se-mitrilobatis, rotunde crenatis, caulinis multipar-titis, linearibus, integrerrimis. *Ranunculus dul-cis f. pratensis* TRAG. p. 97. ad sepes & in sylvis.
- 1178 RANUNCULUS foliis duris, venosis, reniformi-bus, rotunde crenatis, convexitate retusa, acu-te serrata. *Thora major* CAMER. Epit. p. 826. in alpinis aquilejensibus & *M. Thuirii*.
- 1179 RANUNCULUS radicibus fasciculatis, imo caule reticulato, foliis cordiformibus. *Ranunculus dulcis foliis latis rapistri perfoliatis floribus ali-bis* MRNZEL pugill. t. 8. f. 6. in alpibus aquile-jensibus.
- 1180 RANUNCULUS radicibus fasciculatis, imo caule reticulato, foliis gramineis †. *Ranunculus pu-milus gramineis foliis* I. B. III. p. 866 in al-pibus editioribus Rhæticis & Valesiacis.
- 1181 RANUNCULUS erectus, ramosus, foliis ensifor-mibus, subferratis. *Ranunculus lanceatus major* TABERN. p. 48. ad aquas.
- 1182 RANUNCULUS caule declinato, foliis elliptico lanceolatis, subferratis. *Flaminula Ranunculus Dodon.* purg. p. 292. in uidis abunde.
- 1183 RANUNCULUS caule reptante, foliis linearibus, fasciculatis. *Ranunculus foliis linearibus caule repente* LINN. flor. Lapon. p. 236. t. 3. f. 5. in litioribus lapidosis lacuum, suspecta species.
- 1184 DAMASONIUM foliis ellipticis, lanceolatis, ca-pitulo rotunde triquetro. *Plantago aquatica* CAMER. epit. p. 264. in fossis.
- 1185 SAGITTA foliis acuminatis. *Sagitta* CAMER. epit. p. 814. in nonnullis fossis *Nidovie*, *Mülbu-sie*, *Ebroduni* &c.

## IX. MULTISILIQUÆ.

- 1186 BUTOMUS LINN. *Juncus floridus* CAMER. epit. p. 781. *Ebroduni*, *Michelfeldæ*.
- 1187 PAEONIA radice glandulosa, foliis duplicato pinnatis, pinnis ellipticis & trilobis. *Peonia fe-mina* MATTHIOL. p. 915. in pratis *M. Generosi*.

- 1188 CALTHA LINN. *palystris* LOBEL p. 594. ad rivulo; & fossas.
- 1189 TROLLIUS LINN. *Ranunculus VI.* CAMER. epit. p. 385. Subalpinus & montanus.
- 1190 ISOPYRUM. *Aquilegia montana* flore parvo thalictri folio C. B. prodr. p. 75. in helvetiorum alpibus; inde non repertum.
- 1191 HELLEBORUS flore folio insidente. *Aconitum luteum minus* DODON. purg. p. 352. in pratis pagi Bex.
- 1192 HELLEBORUS foliis multipartitis, ferratis, caule paucifloro. *Helleborum nigrum alterum* CAMER. Epit. p. 941. in montanis hinc inde & in transalpinis.
- 1193 HELLEBORUS ramosus, multiflorus, foliis multipartitis ferratis, stipulis ovato lanceolatis, coloratis. *Veratrum nigrum* DODON. purg. p. 191. Vulgo ad vias submontanas.
- 1194 NIGELLA flore nudo. filiuarum cornibus longissimis. *Melanthium sylvestre alterum* MATTHIOL. p. 797. in segetibus planicie.
- 1195 AQUILEGIA foliis trilobatis, lobis petiolatis tripartitis, subrotundis, obtuse dentatis. *Isopyrum COLUMBI Phytobas.* Vulgo in pratis submontanis & sylvis.
- 1196 AQUILEGIA foliis trilobatis, lobis tripartitis linearibus, caule paucifloro. *Aquilegia montana magno flore* C. B. prodr. p. 75. Alpina Aquilejensia.
- 1197 ACONITUM caule simplici, spica densa, petiolis unifloris, cassis mucrone brevi. *Napellus* CAMER. epit. p. 836. ad vias montanas & alpinas.
- 1198 ACONITUM caule ramoso, paniculato, petiolis multifloris, cassis mucrone longo. *Aconitum lycoctonum Jüdenbergense* CLUS. pann. p. 410, 412. in valibus subalpinis aquilejensiam.
- 1199 ACONITUM foliis hispatis, semitrilobis, lobis duplicito trifidis. *Napellus flore luteo* RIVIN. t. 127. In dumetis submontanis & subalpinis.

- 1201 DELPHINIUM trisiliquum, foliis semiquinque lobis, acute ferratis, petiolis interioribus quaternis, barbatis *Aconitum Lycoctonum* L. CLUS. pann. p. 403. 404. alpes aquilejenses.
- 1202 DELPHINIUM unisiliquum, caule recto spicato. *Delphinium sativum* RIVIN. t. 123. ad macerias.
- 1203 DELPHINIUM unisiliquum, caule brachiato diffuso, floribus sparsis. *Consolida regalis arvensis* TABERN. p. 62. in agris Valesiæ & planicie.

## IX. LILIACEÆ.

## I. TRISILIQUÆ.

- 1204 VERATRUM spica paniculata, floribus sexu distinctis. *Veratrum album* DODON. purg. p. 214. Prata subalpina & montana.
- Anthosmia iridiflora* 1205 ANTHONICUM filamentis glabris. *Phalangium alpinum palustre Iridis folio* SEGULER II. t. 2. f. 14. in pratis uidis etiam circa Bernam.

## II. FRUCTU TRiloculari.

## I. INTRA FLOREM.

## I. PETALIS PATULIS.

- 1206 ASPHODELUS caule folioso, foliis angulatis, striatis, stipulis maximis. *Asphodelus luteus* DODON. Coron. p. 142. 143. in M. Fräla val. Tellinæ.
- 1207 PHALANGIUM radicibus teretibus, foliis radicibus carinatis, ensiformibus, petiolis unifloris. *Liliago CORD.* II. c. 106. p. 190. b. Frequens in rupibus adclivibus.
- 1208 PHALANGIUM radicibus teretibus, foliis gramineis, caule ramoso, laxe paniculato. *Phalangium ramosum* LOBEL. p. 47. in sterilibus clivis.

## II. TRISIL. PETAL. PATULIS 109

- 1209 PHALANGIUM foliis crassulis, scapo unifloro.  
*Bulbocodium apicinum juncifolium flore unico, intus albo, extus sordide rubente RAY Syn. III.*  
 p. 374. t. 17. f. 2. alpes editiores.
- 1210 PHALANGIUM longissime spicatum, filamentis latis, lanceolatis. *Ornithogalum saxuwdes RENEALME* p. 90. 93. in dumetis planitiei circa Chambon aquilejensium, Genevæ &c.
- 1211 PHALANGIUM radice bulbosa, foliis latissimis obtusis, spica pauciflora, stipulis minimis. *Hya. cintus FUCHS. DODON. coron. p. 181. aquilejae, Basileæ*
- 1212 PHALANGIUM radice bulbosa, foliis latissimis obtusis, spica multiflora, stipulis longitudine petioli †. *Parvulus Hyacinthus stellaris vernus LOBEL Adruf. II. p. 486. Circa Bernam.*
- 1213 PHALANGIUM radice bulbosa, stipulis maximis, hirsutis, floribus umbellatis, petiolis unifloris. *Ornithogalum πυρροχιτων RENEALME. p. 90. 91. in pratis planitiei, ut in alpes ascendat.*
- 1214 PHALANGIUM radice bulbosa, stipulis maximis hirsutis, floribus umbellatis, petiolis multifloris. *Ornithogalum pannonicum minus luteo flore CLUS pann. p. 190. 391. Basileæ.*
- 1215 ORNITHOGALUM stipulis maximis, petiolis lateribus longissimis. *Ornithogalum ηλιοχαρμος RENEALME p. 87. 88. in aquilejensibus abunde & Basileæ.*
- 1216 ORNITHOGALUM floribus spicatis, senescentibus pendulis, filamentis staminum alterne majoribus, bicornibus. *Ornithogalum neapolitanum CLUS append. alt. Circa Bernam, Genevam.*

## VIII. III. FLORIBUS ADGREGATIS.

- 1217 ALLIUM radice ambeunte tunicata, foliis gramineis, spica sphærica, staminibus alterne trifidis. *Porrum CAMER. epit. p. 321. in vineis.*
- 1218 ALLIUM radice sobolifera, foliis gramineis, spica sphærica, staminibus alterne trifidis. *Scorodo prasum*

*prasum latifolium spontaneum italicum*, floribus veteres suave purpureis odoratis MICHELIT t. 24.  
in Basileæ inet.

1219 ALLIUM radice multiplici, foliis gramineis, spica sphærica, staminibus alterne trifidis. *Allium s. Moly montanum V. CLUS. pann. p. 216. 218.*  
*in Helvetia rarius, Genevæ indicatur & Basileæ.*

1220 ALLIUM radice gemella, foliis fistulosis, capite sphærico, staminibus alterne trifidis. *Allium s. Moly juncifolium, capite sphærico, flore purpureo C. B. II. p. 563.* in rupibus apricis.

1221 ALLIUM radice multiplici, foliis fistulosis, capite sphærico, bulbifero, staminibus alterne trifidis. *Allium sylvestre tentifolium LOBELL. p. 156.* in agris planitiei.

1222 ALLIUM foliis ciliatis, umbella bulbifera, staminibus alterne trifidis, ad RUPP. t. 2. *Allium s. Moly montanum latifolium CLUS. pann. p. 212. 213.* Circa Basileam non frequens.

1223 ALLIUM bulbo simplici, foliis fistulosis, spatha bicorni, umbella bulbifera de alio n. 26. cum icone. *Allium s. Moly montanum III. CLUS. pann. p. 213. 215. Badæ, Michelfeldæ &c.*

1224 ALLIUM bulbo sobolifero, foliis succulentis, spatha bicorni, umbella bulbifera de alio n. 27. cum icone. Frequens in dumetis calidiorum regionum. inque muris.

1225 ALLIUM radice duplici, foliis succulentis, spatha bicorni, umbellæ radiis pendulis, de alio n. 25. cum ic. *Allium montanum bicorné, floribus triquetris purpureis pediculis longis & reflexis SEGUIER II. p. 70.* Circa Neuenstatt, Pferz', & in sylva Saufeulaz supra Bex.

1226 ALLIUM radice multiplici, foliis radicalibus teretibus, scapi longitudine, floribus umbellatis cylindricis. *Allium montanum sphærocephalon purpureum SCHEUCHZER. it. 1. p. 24. t. 3. f. 2. alpina etiam M. Dolaz.*

1227 ALLIUM radice senescente lignosa. transversa, foliis radicalibus gramineis, floribus umbellatis a. minus, petræum. *Allii forte genus scorodoprasion*

II. III. PET. PATUL. IV. FL. CAMP. III

*prason alterum* I. B. II. p. 564. *Allium petreum*  
*umbelliferum* I. B. II. p. 564.

C. Pratense majus. *Allium umbelliferum pratense*  
I. B. p. 564. Prius Seduni, Badæ, alterum in  
pratis uidis aquilejenisium.

1228 ALLIUM foliis radicalibus petiolatis, ovato lan-  
ceolatis, floribus umbellatis. *Allium ursinum*  
CAMER. epit. p. 330. in sepibus.

1229 ALLIUM radice oblonga, reticulo obducta, foliis  
ovato lanceolatis, umbella sphærica. *Allium al-  
pinum* I. B. II. p. 566. alpina, etiam montana.

IV. FLORE CAMPANIFORMI.

1230 HEMEROCALLIS floribus spicatis secundis *Pha-*  
*langium allobrogicum majus* CLUS. append. alt.  
Prata alpina.

1230 \* HEMEROCALLIS foliis ensiformibus, scapo  
paucifloro, petiolis lineatis. *Lilio asphodelus*  
*phaeniceus* LOBEL. ic. p. 93. Inter les Posse  $\mathfrak{E}$   
Fenallet.

1231 LILIUM foliis sparsis, corollis campanulatis, intus  
glabris LINN. *Lilium candidum* DODON. coron.  
p. 121. 122. Am Schloßenge zu Neuenstatt.

1232 LILIUM caule folioso, foliis fulcatis, floribus cam-  
panulatis, extus floccosis. *Hemerocallis* CAMER.  
epit. p. 616. in Rhætia & descensu M. Cheville.

1233 LILIUM foliis verticillatis, floribus pendulis revo-  
lutis. *Martagon* CAMER. epit. p. 617. In syl-  
vis submontanis.

1234 ERYTHRIONUM LINN. *Dens Caninus* DODON.  
purg. p. 789. Prope Genevam.

1235 FRITILLARIA caule paucifloro, foliis caulinis  
gramineis alternis. *Fritillaria dilutior* CLUS.  
pann. p. 170. Circa Goudeba.

1236 TULIPA flore subnutante, foliis lanceolatis LINN.  
In pratis.

*in dichotomis*

*Orthocerasum filigerae*

*F. velutina*

*T. silvestris*

V. BACCIFERÆ.

1237 UVULARIA foliis amplexicaulibus. *Polygonatum*  
*latifolium ramosum* CLUS. pann. p. 266. 267. in  
fub.

subalpinis aquilejensibus, Valesiacis, etiam in montanis.

- 1238 RUSCUS foliis ovato lanceolatis, pungentibus, petiolis brevissimis vaginosis. *Bruscus vel Ruscus* BLAKWELL t. 155. in rupibus aquilejensibus, trans alpes.

- 1239 ASPARAGUS foliis filiformibus stipulatis. *Asparagus* CAMBR. p. 138. in Valesia inf.

- 1240 UNIFOLIUM DODON. Coron. p. 138. in sylvis abiegnis.

- Lourivalhera bifolia*
- 1241 POLYGONATUM scapo diphylo, floribus spicatis, nutantibus, campaniformibus. *Lilium convallium* CAMBR. epit. p. 618. in dumetis & nemoribus.

- 1242 POLYGONATUM caule simplici angulo, cernuo, foliis ovato lanceolatis, rigidis, alis unifloris. *Polygonatum flore odoro* CLUS. pann. p. 263. 264. in rupibus apricis subalpinis & submontanis.

- 1243 POLYGONATUM caule simplici cernuo, foliis ovato lanceolatis, petiolis multifloris. *Polygonatum* DODON. purg. p. 77. in sepibus & dumetis.

- 1244 POLYGONATUM caule simplici erecto, foliis ellipticis & verticillatis. *Icon Ordini* t. 56. in subalpinis & montanis.

## VI. FLORE TUBULOSO.

- 1245 HYACINTHUS foliis carinatis, spica ovata, floribus globosis. *Hyacinthus recentiorum primus*. DODON. coron. p. 176. in vineis.

- 1246 HYACINTHUS foliis gramineis, spica ovata, floribus globosis, fecundis. *Hyacinthus botryoides vernus minor latifolius caeruleus inodorus* I. B. II. p. 582. Bernæ superius in prato Rappenthal.

- 1247 HYACINTHUS spica longissima, floribus supremis sterilibus erectis, inferioribus fecundis patulis. *Hyacinthus recentiorum tertius* DODON. coron. p. 178. in pratis & agris aquilejensibus.

- 1248 HYACINTHUS floribus tubulosis, basi globosis, apice sexpartito revoluto. *Hyacinthus non scriptus* DODON. coron. p. 172. Rarior circa Roche, Moutrou.

## VII. I. FLORE FRUCTUI INNATO.

## I. HEXASTEMONES.

- 1249 AGAVE scapo arboreo ramoso. *Aloe americana*  
TREW. lib. propr. ad pagum *Gandri* haud lon.  
ge *Lugano*.
- 1250 NARCISSUS uniflorus, foliis ensiformibus, scy-  
pho brevissimo. *Narcissus medio purpureus* Do-  
DON. coron. p. 189. Subalpina vallis *Gessenai*  
deorsum pene ad *Blonai* & *Villeneuve*. *N. Poiticus*
- 1251 NARCISSUS foliis juncis carinatis, scapo uni-  
floro, scypho sexies emarginato. *Narcissus jun-*  
*ci foliis I. amplio calyce* Clus. p. 158. à la Gar-  
delle prope Genevam.
- 1252 NARCISSUS foliis ensiformibus, scapo unifloro,  
scypho undulato, ferrato, petalis æquali. *Nar-*  
*cissus luteus sylvestris* DODON. coron. p. 198. Ber-  
næ in pratis. *N. pseudonatans*
- 1253 GALANTHUS uniflorus, petalis subæqualibus.  
*Leucojum bulbosum hexaphyllum* DODON. coron.  
p. 202. in pratis & sepibus umbrosis. *Leucojum vernum*
- 1254 GALANTHUS uniflorus petalis alternis cordatis,  
brevioribus. *Leucojum bulbosum triphyllum* Do-  
DON. coron. p. 200. in pratis Bernæ, Aquilejæ.
- 1255 COLCHICUM flore folia longe præcedente, pe-  
talibus ovatis. *Colchicum* DODON. purg. p. 371.  
in pratis. *C. autumnale*
- 1256 COLCHICUM foliis florem adtingentibus, petalis  
linearibus. *Colchicum montanum* Clus. bisp.  
p. 266. circa Roche in pratis. *C. montanum*

## II. TRISTEMONES.

- 1257 CROCUS tuba brevissime trifida. *Crocus vernus*  
*latifolius albus*, *versicolore flore* Clus. hist. p. 214.  
in subalpinis & montanis. *C. vernus*
- 1257\* CROCUS tuba trifida. *Crocus vernus latifolius*  
*flavo vario colore I.* Clus. p. 205. in Abbatis-  
cellanis & Glaronensisibus alpibus.

- 1258 IRIS foliis ensiformibus distichis , petalis reflexis , barbatis , tubalium arcu obtuso. *Iris sylvestris major* CAMER. epit. p. 2. in muris & rupibus vinetorum.
- 1259 IRIS foliis linearibus , caule subnudo , petalis reflexis imberibus , venosis , tubalium arcu acuminato. *Iris angustifolia media f. varia* Clus. pann. p. 252. circa Tigurum.
- 1260 IRIS caule inflexo , foliis ensiformibus , petalis erectis minimis , reflexis imberibus. *Acorum falsum* CAMER. epit. p. 6. in fossis aquosis.

## IX. FLORE DIFFORMI.

- 1261 GLADIOLUS foliis ensiformibus , floribus distantibus. *Gladiolus Dodon. coron.* p. 162. in M. Zurichberg agris.

## I. I. X. SATYRIA.

- Ophrys Moerdingii.*
- 1262 ORCHIS bulbo unico , subrotundo , labello cruciformi t. 22. *Monorchis* MICHELI p. 30. t. 26. in subalpinis & montanis pratis , urbisque vallo.
- Ophr. Alpina.*
- 1263 ORCHIS radicibus subrotundis , labello ovato , utrinque denticulo notato t. 22. *Chamaeorchis alpina* gramineo folio C. B. prodr. p. 29. alpium editarum.
- Ophr. Anthrophophora*
- 1264 ORCHIS radicibus subrotundis , spica longa , flore inermi , labello perangusto , quadrifido t. 23. *Orchis anthropophora oreades* COLUMN. ecphras. p. 318. 320. in apricis pratis calidiorum.
- 1265 ORCHIS radicibus subrotundis , labello sericeo bisulco , brachiolis brevibus subulatis t. 24. *Orchis serapias tertia* DODON. coron. p. 222. prata aprica. Musciflora.
- 1266 ORCHIS radicibus subrotundis , labello holosericeo emarginato , appendiculato t. 24. *Orchis referens* fucum RIVIN. hexap. irreg. t. 13. in Helvetiae pratis frequens.
- 1267 ORCHIS radicibus subrotundis , petalis galeæ conglutinatis , longissime rostratis , labello trilobato ,

bato, ovato lanceolato. *Orchis macrophylla* COLUMN. ecphras. p. 321. 322. prope Dubino vallis Tellinæ.

- 1268 ORCHIS radicibus subrotundis, labello longissimo, tripartito, plicato t. 25. *Orchis barbata satyr. liriuina* fatida RIVIN. t. 18. passim in agro aventico. Scaphusii.
- 1269 ORCHIS radicibus palmatis, galea connivente, labello trifolio, calcare brevissimo t. 26. *Orchis palmata flore galericulato dilute viridi* LOSSEL. p. 182. ic. 59. in subalpinis & montanis. *Satyr. viride*
- 1270 ORCHIS radicibus confertis, teretibus, calcare brevissimo, labello trifido t. 26. *Pseudorchis alpina flore herbaceo* MICHELI t. 26. alpina & montana. *Satyr. Albidum*
- 1271 ORCHIS radicibus palmatis, spica densissima, flore resupinato, calcare brevissimo t. 27. *Palma Christi minor* CAMER. epit. p. 627. alpina & montana. *Satyr. nigra*
- 1272 ORCHIS radicibus subrotundis, spica densissima, petalis exterioribus aristatis t. 27. *Orchis rotundus* DALECH. LUGD. p. 1556. alpina, subalpina & montana. *O. globosa* / sc. /
- 1273 ORCHIS radicibus subrotundis, labello quadrifido, calcare brevissimo t. 28. *Orchis Pannonica* IV. CLUS. pann. p. 236. 238. prata. *O. ustulata*
- 1274 ORCHIS radicibus palmatis, labello obtuse trifido, concolore, calcare germine breviori t. 29. *Orchis palmata angustifolia minor odoratissima* C. B. prodr. alpina, etiam Basileæ nascitur. *O. odoratissima*
- 1275 ORCHIS radicibus subrotundis, spica brevissima, labello breviter quadrifido, circumserato, punctato t. 30. ad RUPP. t. 6. *Orchis militaris* RIVIN. t. 15. Basileæ, nuper non lacte. *O. sinuosa* - v.
- 1276 ORCHIS radicibus subrotundis, spica longa, labello quadrifido, brachiolis angustis, crusculis latis, ferratis t. 31. *Orchis militaris major* RIVIN. t. 16. circa Bernam, Tigurum &c. ad oras sylvarum. *O. militaris*.
- 1277 ORCHIS radicibus subrotundis, spica conica, labello quadrifido, brachiolis & pectore perangusti.

stis t. 28. *Orchis maculata* RIVIN. t. 15. Bernæ vulgatissima.

*O. maculata*. 1278 ORCHIS radicibus palmatis, caule solido, labello trifido, ferrato, medio segmento acuminato t. 32. *Palmata maculata* & non *maculata* RIVIN. t. 8. in pratis clivorum.

*O. latifolia*. 1279 ORCHIS radicibus palmatis, caule fistuloso, bracteis maximis, labello trifido, ferrato, medio segmento obtuso t. 32. in pratis uidis.

*O. Janubiana*. 1280 ORCHIS radicibus palmatis, bracteis coloratis, labello circumferrato, trilobato, labo medio emarginato. *Orchis palmata lutea labio floris maculata* SEGUIER. suppl. p. 248. t. 8. f. 5. in M. Joux verte, adque alpes Griseas.

*O. Pallens*. 1281 ORCHIS radicibus subrotundis, petalis galeæ lineatis, labello trifido, integerrimo t. 30. + *Orchis præcox alba barba luteola* RUPP. à la Joux verte & passim in subalpinis.

*O. Morio*. 1282 ORCHIS radicibus subrotundis, galeæ petalis lineatis, labello trifido, crenato, medio segmento emarginato t. 33. *Orchis morio femina, calcare extuberante* & bifarium diviso SEGUIER. p. 126. t. 15. f. 8. in brevi gramine.

*O. Alascula*. 1283 ORCHIS radicibus subrotundis, petalis lateralibus reflexis, labello trifido, segmento medio longiori, bifido t. 33. *Orchis folio Gladioli flore magno roseo* RIVIN. t. 21. vulgo in pratis & ad vias.

*O. longiphora*. 1284 ORCHIS radicibus subrotundis, galea connivente, labello trifido reflexo t. 34. *Orchis flore parvo viridi purpureo* RIVIN. t. 20. in Valesia inf. & cis Echarpigny.

*O. Nipolia*. 1285 ORCHIS radicibus oblongis, labello linearis t. 35. *Satyrium flore albo* RIVIN. t. 12. ad sylvularum oras.

*O. Pyramidal.* 1286 ORCHIS radicibus subrotundis, spica densa, calice longissimo, labello bicorni, æqualiter tripartito t. 35. *Orchis flore conglomerato* RIVIN. t. 14. subalpina & montana.

*O. Louopsea*. 1287 ORCHIS radicibus palmatis, calice longissimo, labello unicolo, obtuse trifido t. 29. *Palmata angusti-*

*angustifolia non maculata* RIVIN. t. 11. frequens  
in pratis & sylvis.

1288 EPIPACTIS aphylla, calcare longo, labello ovato lanceolato t. 36. *Limodorum Austriacum* CLUS. pann. p. 241. in aquilejensibus & submontanis.

1289 EPIPACTIS caule aphylo, flore supinato, labello ovato lanceolato, calare ovato turgido. *Epipogium* GMELIN. flor. t. 2. f. 2. p. 12. in sylva Sauffeullaz, aquilejensium.

1290 EPIPACTIS aphylla, flore inermi, labello bicorni t. 37. *Nidus* RIVIN. t. 3. in sylvis opacis, foliis stratis putrescentibus.

1291 EPIPACTIS foliis binis ovatis, labello bifido t. 37. *Bifolium* RIVIN. t. 7. in pomariis & nemoribus.

1292 EPIPACTIS foliis binis, cordatis, labello bifido, postice bidentato t. 22. f. 4. *Ophrys foliis cordatis* LINN. GAGNEBIN Act. Helv. T. II. p. 70. in subalpinis aquilejensibus, & montanis uidis & umbrosis.

1293 EPIPACTIS folio unico, amplexicauli, spica prolixa multiflora t. 36. *Ophrys monophyllum bulbosum* LOESEL. p. 180. ic. 17. in adscensu M. Fronalp.

1294 EPIPACTIS bulbis cylindricis, spica spirali, labello crenulato t. 38. *Orchiastrum autumnale pratense*, *spirale*, *album*, *odoratum* MICHELII t. 30. in uidis pratis Bernæ, Aquilejæ &c.

1295 EPIPACTIS foliis petiolatis, ovato lanceolatis, floribus tetrapetalis hirsutis t. 22. *Orchoides* TREW. Comm. Lit. Nor. 1736. p. 409. t. 6. f. 2. in pinetis fiscis.

1296 EPIPACTIS foliis ensiformibus, caulinis, floribus pendulis, labello obtuso, oris plicatis t. 39. *Helleborine* RIVIN. t. 3. in pratis uidis.

1297 EPIPACTIS foliis amplexicaulibus, ovato lanceolatis, labello lanceolato t. 40. *Helleborines recentiorum genus II*. CLUS. pann. p. 275. & III. p. 276. in sylvis abunde.

1298 EPIPACTIS caule paucifloro, lineis obtusi labelli levibus t. 41. *Helleborine alba barba luteola* H 3 RIVIN.

*Orchis abortiva*

*Satyr. Epipogium*

*Ophrys uida*, *Ovis*

*Ophr. Osata*

*Oph. cordata*

C

*Ophr. spiralis*

*Seraya spiraea*

*Satyr. spiraeus*

*Serapias Palustris*

*Ser. latifolia*

*Ser. nivea* (VII)

*euisifolia* L.

*grandiflora* L.

RIVIN. t. 4. & *B. Helleborine* flore albo Ej.  
t. 5. in sylvis non rara.

*Ser. rubra.* §299 EPIPACTIS caule pauciflora, lineis acuti labelli  
undulatis t. 42. *Damasonium* flore roseo RIVIN.  
t. 6. in sylvis.

*Cypripedium* - *calceolus* §300 CALCEOLUS radicibus fibrosis, foliis ovato lan-  
ceolatis t. 43. *Pseudodamasonium* CLUS. pann.  
p. 271. in sylvis circa Bernam, in valle Or-  
mond &c.

*Ophrys corallorhiza* §301 CÖRALLORHIZA t. 44. *Orchis suecorum* radice  
coralloide flore albo RUDBEK *Elys.* II. p. 234.  
f. 16. in sylvis abiegnis umbrosis Aquilejensium,  
*Neocomensium* &c.

### I. XI. SPATHACEÆ.

§302 ARUM foliis sagittatis, spatha recta, clava cy-  
lindrica. *Arum* DODON. purg. p. 27. in sepibus  
& dumetis.

### I. II. APETALÆ.

#### I. GRAMINIBUS ADFINES.

##### I. TRIGLUMES.

*J. erectum*. §303 SPARGANIUM caule foliisque erectis. *Sparga-*  
*nium* CAMER. epit. p. 732. & *B. Sparganium*  
*non ramosum* TABERN. p. 247. in fossis.

*J. Natans*. §304 SPARGANIUM foliis planis, mollibus, decum-  
bentibus. *Sparganium minimum* RAJ. syn. III.  
p. 437. in lacubus & fossis rarius.

*Z. latifolia* §305 TYPHA clava unica. *Typha* CAMERAR. epit.  
p. 607. in inundatis.

*Z. Augustifolia*. §306 TYPHA clava mascula a femina distincta. *Ty-*  
*pha palustris media* I. B. II. p. 540. & *Typha*  
*minor* I. B. &c. in Rhodani in lacum influxu,  
in fl. Arve.

### II. SEX.

## II. SEXGLUMES.

- 1307 ACORUS. *Acorum* CAMER. epit. p. 5. passim in stagnis. *Q. calamus*.
- 1308 TRIGLOCHIN capsulis trilocularibus sublinearibus *Gramen junceum spicatum* TABERN. p. 224. in udis gramineis. *T. palustre*
- 1309 VALISNERIA LINN. *Valisneria* &c. MICHELI p. 12. & *Valisnerioides* ib. suspecta civis.
- 1310 SCHEUCHZERIA LINN. flor. Lapon. t. 10. f. 1. in submontanis paludibus, nuper non reperta. *S. Palustris*.
- 1311 JUNCUS caule nudo, foliis teretibus striatis, panicula laterali sparsa. *Juncus Dodon.* cereal. p. 265. ad vias in udis. *J. effusus*.
- 1312 JUNCUS caule nudo, foliis teretibus mollibus, panicula conglomerata. *Juncus CAMERAE.* epit. p. 780. similibus locis. *J. conglomeratus*.
- 1313 JUNCUS caule nudo, foliis teretibus mollibus, panicula laterali pauciflora. *Juncus panicula* sparsa minor C. B. theatr. p. 183. alpina. *J. filiformis*.
- 1314 JUNCUS caule bifolio, foliis teretibus, floribus terminantibus ternis. *Juncus exiguis* montanus mucrone carens C. B. theatr. p. 183. alpinus. *J. Triglumis*.
- 1315 JUNCUS acumine reflexo trifidus C. B. theatr. p. 185. alpinus. *J. Trifidus*.
- 1316 JUNCUS caule unifolio, petiolis bifloris, floribus umbellatis. *Juncoides alpinum* foliis junci glomeratis atrofuscis SCHEUCHZER. Agrostogr. p. 327 t. 2. f. 3. alpina edita.
- 1317 JUNCUS rigidus, panicula spicata, floribus cartilagineis. *Gramen junceum* folio & spica junci C. B. theatr. p. 78. in paludibus M. Gotthard.
- 1318 JUNCUS foliis carinatis, panicula sparsa, fructu globoso. *Juncus parvus* cum pericarpiis rotundis I. B. II. p. 522. passim in udis.
- 1319 JUNCUS caule brachiatum, foliis setaceis, floribus solitariis ad ramum sessilibus. *Gramen parvum* busonium TABERN. p. 225. in udis.
- 1320 JUNCUS caule brachiatum, foliis setaceis, floribus fasciculatis, ad ramos sessilibus. *Juncoides culyculis*

*culis paleaceis glomeratis folio varians* SCHEUCHZER. p. 330. t. 7. f. 10. in montanis rarius.

*J. Alpinus* 1321 *JUNCUS* foliis sessilibus articulatis, panicula simplici, glumis aristatis †. *Gramen junceum folio articulato alpinum* SCHEUCHZER. Agrostogr. p. 333 334. *alpina*.

*J. articulatus aquaticus.* 1322 *JUNCUS* foliis articulatis, compressis, panicula semel ramosa. *Gramen junceum folio articulate aquaticum* C. B. SCHEUCHZER. p. 341. in fossis & uidis.

*J. Juncinus.* 1323 *JUNCUS* foliis articulatis, teretibus, panicula repetito ramosa †. *Gramen junceum folio articulato aquaticum* C. B. SCHEUCHZER. p. 334. in fossis aquilejensibus &c.

*J. pilosus.* 1324 *JUNCUS* foliis gramineis hirsutis, floribus paniculatis, fasciculatis. *Gramen Luzulae maximum* I. B. II. p. 493. in sylvis montanis & subalpinis.

*J. Luzulinus.* 1325 *JUNCUS* foliis gramineis hirsutis, floribus umbellatis, solitariis, petiolatis, aristatis. *Gramen rore lucidum nemorensē* f. *Luzula* I. B. II. p. 492. vulgo in sylvis.

1326 *JUNCUS* foliis gramineis, panicula laxa, petalis mollibus, breviter aristatis †. *Gramen hirsutum nemorosum alpinum angustifolium, paniculis obscure rufescientibus* I. I. SCHEUCHZER. It. VI. p. 458. *alpina*.

*J. proadius.* 1327 *JUNCUS* foliis gramineis, floribus umbellatis, petalis æqualibus. *Gramen hirsutum angustifolium majus* C. B. theatr. pt 105. in sylvis.

*J. affine.* 1328 *JUNCUS* foliis gramineis, paniculis umbellatis, petalis interioribus duplo longioribus. *Gramen Luzula affine fiore albo* I. B. II. p. 407. in pratis subalpinis.

1329 *JUNCUS* foliis gramineis glabris, panicula nitente, floribus obtusis †. *Juncoides alpinum latifolium glabrum, panicula sublutea splendente* I. SCHEUCHZER. Agrostogr. p. 314. cum ic. *alpina* edita.

1330 *JUNCUS* foliis gramineis hirsutis, spicis petiolatis, nutantibus, petalis aristatis. *Gramen hirsutum capitulis Psyllii* SCHEUCHZER. p. 310. ad vias, in sylvis.

## III. UNIGLUMES.

- 1331 ERIOPHORUM foliis planis, spicis pendulis.  
*Gramen tomentosum panicula sparsa* C. B. theatr.  
 p. 60. in pratis uidis.
- 1332 ERIOPHORUM caule terete, spica erecta ovata.  
*Juncus alpinus capitulo lanuginosof Schænolaguros*  
 SCHEUCHZER. p. 302. t. 7. & *Juncus alpinus*  
*capitulo tomentoso majori* Ej. p. 304. t. 7. Iste  
 in alpinis, ille in torfaceis.
- 1333 ERIOPHORUM caule foliisque triquetris, spica  
 pauciflora. *Lingrofis juncea alpina, capitulo*  
*parvo, tomento rariore* SCHEUCHZER. p. 305. t. 8.  
*alpina & montana, torfaceorum.*
- 1334 SCIRPUS caule terete, aphylo, spica pauciflora,  
 acuminata, calycinæ glumæ longitudine. *Scirpus*  
*montanus capitulo breviore* SCHEUCHZER. p. 369  
 in subalpinis & montanis uidis.
- 1335 SCIRPUS caule terete, spica nuda, pauciflora,  
 glumis calycinis longiore. *Scirpus minimus ca-*  
*pitulo breviore & crassiori fusco* SCHEUCHZER.  
 p. 366. *Scirpus montanus spica breviore squamo-*  
*sa spadicea* Ej. p. 364. ad ripas fluviorum fabu-  
 lotas. *Sc. Hallerii* (vul.)
- 1336 SCIRPUS caule terete, spica terete pauciflora.  
*Gramen cyperoides capitulo simplici* LOSSEL. p.  
 131. ic. 36. in palustribus.
- 1337 SCIRPUS caule terete, panicula laterali, ramosa,  
 locustis ovatis. *Scirpus palustris altissimus*,  
 SCHEUCHZER. p. 354. in lacubus & stagnis.
- 1338 SCIRPUS caule triquetro, panicula laterali ramo-  
 sa, locustis ovatis. *Juncus acutus maritimus*,  
*caule triangulo* C. B. theatr. p. 175. in palustri-  
 bus aquilejensibus.
- 1339 SCIRPUS caule triquetro, panicula foliosa, ramosa,  
 locustis ovatis, nutantibus, glumis dentatis ari-  
 statis. *Gramen panicula sparsa ex spicis longiori-*  
*bus teneroribus teretibus composita* SCHEUCHZER.  
 p. 398. circa Roche & Michelfeldæ.
- 1340 SCIRPUS planifolius, panicula ramosissima, lo-  
 custis ovatis. *Cyperus gramineus* SCHEUCHZER.  
 p. 323. in aquolis.

- 1341 SCIRPUS foliis setaceis, panicula plana, locustis teretibus. *Gramen cyperoides palustre leucanthemon* SCHUCHZER. p. 403. in torfaceis.
- 1342 SCIRPUS planifolius spica terminante disticha. *Gramen cyperoides, spica compressa disticha*, SCHUCHZER. p. 490. in aquosis, alpinis etiam & montanis.
- Ichneumon Mariscus.* 1343 MARISCUS panicula ramosa, folicrum oris dorsoque ferratis. *Pseudocyperus palustris, foliis & carina ferratis* SCHUCHZER. p. 375. in Aquilejensibus uidis.
- Juncus Setaceus* 1344 MARISCUS folio gramineo, culmo tereti, capitulo lateralibus, ternis, ovatis †. ad summum lacum Lemanum, in fossis. si vere differt.
- Juncus circinatus* 1345 MARISCUS setaceus, capitulis lateralibus perpau- cis. *Scirpus omnium minimus capitulo breviore*, SCHUCHZER. p. 358. passim ad stagna planitie.
- Ichneumon nigricans.* 1346 MARISCUS foliis setaceis, mollibus, spica nuda pauciflora. *Juncellus inutilis s. Chamæchanus* C. B. theatr. p. 183. in Aquilejensium uidis & ad stagna planitie.
- 1347 CYPERUS spicis conglomeratis, calyce multifolio. *Junco adfinis capitulo glomerato nigricante*, SCHUCHZER. p. 349. in torfaceis frequens.
- 1348 CYPERUS umbella trifolia, spicis sessilibus, umbellatis, glumis obtusis. *Cyperus minimus panicula sparsa flavescente* SCHUCHZER. p. 485. in aquosis & ad fossas.
- c. Puttarius* 1349 CYPERUS umbella trifolia, spicis petiolatis con- gelatis, glumis ovato lanceolatis. *Cyperus mini- mus panicula sparsa nigricante*, SCHUCHZER. p. 389. similibus locis, aliquanto rarior. circa Roche.
- 1350 CAREX spica unica, terete, feminibus rostratis. *Gramen cyperoides spica simplici caffa* SCHUCH- ZER. p. 497. in palustribus & torfaceis.
- 1351 CAREX spica unica, subrotunda, feminibus inflati. *Cyperoides parvum &c.* MICELLI p. 56. t. 32. f. 2. passim in paludosis.
- 1352 CAREX spica unica, capsulis hirsutis rotundis †. Basileæ, & circa Ferrières.

- 1353 CAREX culmo foliisque duris, curvulis, spica unica, glumis aristatis †. alpium Vallesiacarum editiorum. *C. Curvula* (flil.)
- 1354 CAREX spica unica subrotunda, glumis ovatis brevissime aristatis †. *Gramen cyperoides juncifolium spica simplici in summitate culni atrofusca* SCHRUCHZER. p. 492. alpium editiorum.
- 1355 CAREX fastidius, spica fusca conglomerata †. *Gramen enode alpinum spica parva subrotunda ferruginea* EJUSD. p. 495. t. 4. alpium editiorum. *C. fastidia*.
- 1356 CAREX spica terminali tripartita †. *An Cyperoides alpinum tenuifolium spica brevi ferruginea*; EJUSD. p. 499. alpium editiorum. *C. Naldeurii* (flil.)
- 1357 CAREX spicis androgynis, imis in ala praelongi folii sessilibus, supramis nudis. *Cyperoides angustifolium spicis sessilibus in foliorum alis* EJUSD. p. 483. in aquosis & sylvosis.
- 1358 CAREX spicis distichis, teretibus, repandis. *Gramen cyperoides elegans spica composita asperiore* HIST. OXON. III. p. 245. alpina & montana, etiam planitiae. *C. Drioides*
- 1359 CAREX spicis ovatis, imis remotis, supremis congestis. *Cyperoides polystachyon spicis laxis paniculam veluti componentibus*, SCHEUCHZER. p. 487. alpina.
- 1360 CAREX spicis ovatis, alternis, supremis se contingentibus. *Gramen cyperoides spicis erectis, divulsis* LOESEL. IC. 32. in paludosis infrequens.
- 1361 CAREX spicis nudis subrotundis, distinctis, in summo caule congestis. *Gramen cyperoides in M. Balon spica divisa* I. B. II. p. 417. in udis frequens. *C. leporina* -
- 1362 CAREX spicis in summo caule congestis, imis foliolo insidentibus. *Gramini cyperoidi in M. Balon simile, spica totali ex pluribus spicis composita* PLUKNET. t. 34. f. 7. in udis planitiae. *C. Arrearia* -
- 1363 CAREX spicis stipula brevioribus, imis distinctis, superioribus congestis. *Gramen cyperoides minus repens spica divisa* LOESEL. p. 116. IC. 31. *Mischelfeldiae*, Ferrière &c. in udis.

*C. Vulpina*

- 1364 CAREX spicis subrotundis, echinatis, supremis confluentibus, capsulis rostratis bifidis. *Grauen cyperoides majus spica compacta* C.B.theatr. p. 84. in subudis.

*C. uniuersata**et variet.*)

- 1365 CAREX caule foliisque asperis, spicis echinatis, subrotundis, supremis confluentibus. *Grauen nemorosum, spicis parvis asperis* C. B. theatr. p. 100. in sylvis & ad vias.

- 1366 CAREX spicis ternis, echinatis, glumis lanceolatis, capsulæ mucrone simplici. *Grauen cyperoides minimum spica divisa aculeata* SCHUBUCH-ZER. p. 485. in paludosis.

- 1367 CAREX spicis ternis, congestis, glumis aristatis f. in sepibus gramineis.

*C. paniculata*

- 1368 CAREX spica paniculata. *Cyperus alpinus inodorus longus, panicula inodora minus sparsa*, SCHEUCHZER. prodr. t. 8. in aquosis.

*C. atrata*

- 1369 CAREX spicis ovatis, petiolatis, congestis, senescendo nutantibus. *Cyperoides alpinum pulchrum foliis caryophyllæis, spicis atris & tumentibus*, EJUSD. p. 481. alpina.

- 1370 CAREX spica mare unica, femininis plurimis, calycinis glumis maximis, culmo senescente prostrato. *Cyperoides montanum humile, angustifolium, culmo veluti folioso spicis obfuso* EJUSD. p. 407.

- $\beta$ . *Cyperoides longifolium, culmo pumilo veluti folioso, spicis obfuso* p. 408. in rupibus subalpinis & montanis.

- 1371 CAREX spicis sessilibus, approximatis, ovatis f. *Cyperoides alpinum foliis caryophyllæis, spicis brevibus ex nigricante & albido variis* EJUSD. p. 421. Alpes Rhæticæ.

- 1372 CAREX foliis caryophyllæis, spicis sessilibus approximatis, paucifloris, capsulis ovatis subhispidi. *Cyperoides montanum foliis angustis, spica spadicea divisa* EJUSD. p. 419. montana, etiam planities.

- 1373 CAREX angustifolius, spicis sessilibus, teretibus, approximatis, capsulis hirsutis. *Cyperoides angustifolium montanum folliculis seminatibus villosis* EJUSD. p. 423. in sylvis.

- 1374 CAREX spicis sessilibus approximatis, brevissimis, glumis lanceolatis †. alpina & montana.
- 1375 CAREX spicis femininis raris, marem adæquantibus, ima petiolata. *Gramen caryophyllum nemorosum spica multiplici* SCHEUCHZER. p. 450. in sylvis & dumetis. *C. pedata*.
- 1376 CAREX spicis femininis petiolatis raris, masculam superantibus. *Gramen caryophyllum montanum spica varia* EJUSD. p. 458. in sylvis. *C. digitata*
- 1377 CAREX spicis femininis raris, petiolatis, teretibus, acutis, marem æquantibus. *Gramen spicatum angustifolium spica alba* EJUSD. p. 410. in sylvis. *C. argentea*
- 1378 CAREX spicis femininis ternis, erectis, petiolatis, folio insidentibus, capsulis ovatis, breviter mucronatis †. *Cyperoides angustifolium spica spadiceo viridi missa, spicis longioribus* EJUSD. It. VI. p. 458. alpina Valesiæ.
- 1379 CAREX spicis femininis petiolatis erectis, floribus remotis †. *Cyperoides hirsutum latifolium, spicis tenuioribus* EJUSD. p. 412. in monte Zürichberg. *C. humilis*
- 1380 CAREX spicis femininis petiolatis, erectis, ovatis, echinatis. *Gramen palustre aculeatum spica breviore* EJUSD. p. 426. in udis. *C. flava*
- 1381 CAREX foliis cespitosis, brevibus, spicis confertis, petiolis erectis brevibus, capsulis ovato triquetris †. *Cyperoides alpinum caryophyllata foliis spicis tenuibus e fusco rufescens* EJUSD. p. 433 passim in apricis. *C. verua. (vid)*
- 1382 CAREX spicis brevissime petiolatis distitis. *Cyperoides spicis parvis longe distantibus* EJUSD. p. 431. in udis & torfaceis. *C. distans*
- 1383 CAREX culmo foliisque firmis erectis, spicis femininis quaternis, longe petiolatis, erectis †. *Mischelfeldæ*.
- 1384 CAREX spicis sessilibus approximatis, teretibus, folio insidentibus †. *Cyperoides sylvaticum angustifolium spicis parvis tenuibus spadiceo viridiibus* SCHEUCHZER. p. 425. Basileæ, Michelfeldæ, in M. Uetliberg.

- C. gyuoobanis* p. 1384\* CAREX spicis femininis sessilibus, ima petiolata, glumis perangustis †. *Cyperoides spicis viridibus brevibus e squamis angustioribus compositum*, SCHEUCHZER. Agrest. p. 435. M. Uetliberg.
- C. gyuoobanis* p. 1385 CAREX spica feminina infima radicali, capsulis triquetris elongatis †. Alpina, etiam montana.
- C. gyuoobanis* p. 1386 CAREX spica feminina infima radicali, capsulis ovatis †. *Cyperoides alpinum angustifolium, spicis seminiferis tenuibus fuscovirentibus* SCHEUCHZER. p. 416. *uda alpium* Valesia.
- C. gyuoobanis* p. 1387 CAREX spicis femininis sessilibus ternis, capsulis ovato hirsutis †. *Cyperoides alpinum pumilum, spicis spadiceo viridiibus brevioribus & crassioribus* EJUSD. p. 428. *alpina*.
- C. gyuoobanis* p. 1388 CAREX foliis cespitosis brevibus, spicis femininis paucifloris, suprema sessili †. *Cyperoides alpinum angustifolium spicis laxis spadiceo viridibus* EJUSD. p. 411. *alpina*, etiam montana.
- C. gyuoobanis* p. 1389 CAREX spicis femininis binis, longe petiolatis, distitis, capsulis longe rostratis bifidis. *Cyperoides alpinum spicis seminiferis tenuioribus a trospadiceis* EJUSD. p. 415. *alpina & montana*.
- C. seuperwiries* ?/vid/ 1389\* CAREX foliis caryophylleis, spica feminina unica binisve †. *Cyperoides alpinum pumilum caryophyllatae foliis ad radicem confertis* EJUSD. H. S. In alpinis.
- C. frigida* 1390 CAREX quæ *Cyperoides angustifolium* spica tenuiore EJUSD. p. 413. M. Tschiera.
- C. limosa* 1391 CAREX spicis femininis ternis quaternisve, distichis, cernuis, capsulis longe mucronatis †. *alpina*.
- C. pallaceana* 1392 CAREX spicis femininis pendulis, capsulis ovatis compressis. *Cyperoides spica pendula breviore squamis ex spadiceo vel fuso rutilante viridibus* SCHEUCHZER. p. 433. *alpina & torfacea*.
- C. capillaris* p. 1393 CAREX spicis femininis pendulis, capsulis ovato conicis. *Cyperoides polystachyon flavicans, spicis brevibus prope summittatem caulis* EJUSD. p. 431. in montanis & alpinis.
- C. capillaris* p. 1394 CAREX spicis femininis raris, pendulis, capsulis ovato conicis mucronatis. *Cyperoides alpinum spicis*

*spicis seminiferis pendulis binis in summo caule*  
*SEGUIER. suppl. p. 83. t. 3. f. 1. summarum al-*  
*pium.*

- 1395 CAREX spicis femininis pendulis, raris, prælon-  
 gatis, capsulis rostratis, bifidis †. *Cyperoides syl-*  
*varum tenius spicatum SCHEUCHZER. p. 418. in*  
*sylvis vulgo.*

*C. satula* [Vil.]

- 1396 CAREX spicis femininis pendulis longissimis, capsu-  
 lis mucronatis ovatis †. *Cyperoides spica pendu-*  
*la longiore & angustiore EJUSD. p. 445. in sylvis.*

*C. maxima* [Vil.]

- 1397 CAREX spicis femininis pendulis, asperis, capsu-  
 lis longe aristatis, retroversis. *Cyperoides spica*  
*pendula breviore EJUSD. p. 440. in udis.*

*C. pseudocyperus*

- 1398 CAREX spica suprema mascula, secunda andro-  
 gyna, femininis sessilibus, capsulis breviter bi-  
 furcatis †. *Cyperoides latifolium spica spadiceo*  
*viridi majus EJUSD. p. 464. & Cyperoides pa-*  
*lustrum angustifolium spicis habitioribus spadiceo*  
*viridibus p. 452. in udis.*

- 1399 CAREX spicis masculis duabus, femininis sessili-  
 bus, capsulis ellipticis obscure bifidis †. in udis.

- 1400 CAREX spicis masculis duabus, femininis sessili-  
 bus, capsulis ovatis, brevissime mucronatis. *Cy-*  
*peroides foliis caryophyllais, spicis erectis sessilibus,*  
*ex seminibus confertis compositis RAJ. Syn. III.*  
*p. 418. in pratis udis.*

- 1401 CAREX spicis maribus una pluribusve, femininis  
 erectis, teretibus, capsulis ampullatis, rostratis.  
*Cyperoides vesicarium spicis teretibus erectum*  
*majus SCHEUCHZER. p. 476. & medium p. 474.*  
*& minimum p. 476. ad fluvios & in palustri-*  
*bus.*

- 1402 CAREX spicis maribus ternis emarcidis, femini-  
 nis longe petiolatis gracillimis †. *Cyperoides*  
*sylvarum spicis tenuibus e viridi albanticibus,*  
*EJUSD. p. 454. in M. Uetliberg.*

- 1403 CAREX caule foliis capsulisque hirsutis. *Cype-*  
*roides polystachyon lanuginosum EJUSD. p. 478.*  
*in udis.*

*C. hirsuta*

- 1404 CAREX spicis masculis ternis, femininis numero-  
 sis erectis, brevissime petiolatis, capsulis bicorni-  
 bus.

*C. aucta*

bus. *Cyperoides latifolium* spica rufa f. caule triangulo SCHUCHZER. p. 458. & *Cyperoides palustre latifolium* spicis teretibus erectis ex terreo obsecere fuscis EJ. p. 465. in uidis.

*C. paucica*

1405 CAREX spica mære unica, pluribusve, femininis petiolatis, erectis, capsulis rarissimis, maximis, ovato triquetris bidentatis. Gramen *Cyperoides folis caryophyllaeis* spicis ex rarioribus & tumidioribus granis compositis PLUDNET. p. 178. t. 91. f. 7. in alpibus & montanis.

1406 CAREX spicis maribus ovatis, femininis, gracilibus, erectis, capsulis triquetro conicis. *Cyperoides nigroluteum vernum minus* SCHUCHZER p. 460. videtur idem sequenti.

1407 CAREX spicis maribus tribus, femininis tribus, capsulis numerosis, breviter bifurcatis. Gramen *cyperoides angustifolium*, spica spadiceo viridi minus C. B. theatr. p. 84. & ipsum idem sequenti.

*C. glauca*

1408 CAREX spicis maribus una pluribus, femininis pendulis, capsulis ovato triquetris confertis. *Cyperoides palustre*, spicis purpuro spadiceis teretibus pediculis insidentibus SCHEUCHZER. p. 467 vulgo ad vias.

*C. Vesicularia*

1409 CAREX spicis maribus una pluribus, femininis teretibus, pendulis, capsulis conicis, rostratis, bicornibus. *Cyperoides vesicularium* spicis viridanibus vel subfuscis EJUSD. p. 470. in uidis.

#### IV. BIGLUMES.

#### II. GRAMINA.

#### I. CALYCE NULLO.

*H. stricta*

1410 NARDUS spica setacea recta LINN. Gramen spontaneum juncifolium SCHEUCHZER. p. 90. in montanis & alpinis.

1411 HOMALOCENCHRUS. Gramen miliaceum palustre serotinum paniculis ex loculis compressis compositis MONTI Prodr. p. 51. ic. 58. ad aquas circa Basileam, Spietz.

1412

- 1412 PHOENIX spica laxa, locustis longe petiolatis quadrifloris, duobus floribus sessilibus, duobus petiolatis. *Aegilops bromoides*, *spica purpurascente* SCHEUCHZER. p. 276. in transalpinis.

*Andropogon griffithii*

## II. CALYCE UNIGLUMI.

- 1413 TRAGUS. *Gramen caninum maritimum*, *spica echinata* SCHEUCHZER. p. 76. in Valesia inf.

*Caulinus racemosus*

- 1414 ANDROPOGON spicis villosis septenis, locustis bifloris, folliculis alternis sessilibus. *Gramen dactylon spicis villosis* C. B. SCHEUCHZER. p. 94. ad vias aridas.

*L. ischaemum*

- 1415 ANDROPOGON spicis geminis, locustis bifloris, folliculis alterne muticis. *Festuca juncea spica gemina* C. B. THEATR. p. 145. BURSER in Helvetia reperit.

- 1416 LOLIUM radice perenni, locustis octifloris contiguis. *Gramen loliaceum angustiori folio & spica* C. B. SCHEUCHZER. ad vias.

*Gramen loliaceum spica lata ex plurimis spicis duplice versu dispositis constante* EJUSD. p. 29.t.2.

- ?1417 LOLIUM quod *Gramen loliaceum* locustis tertiusculis muticis EJUSD. p. 28. Tiguri.

- 1418 LOLIUM perenne locustis diffitis quadrifloris. *Gramen loliaceum angustiori folio & spica, spicis partialibus rarioribus ab invicem remotis*, EJUSD. p. 26. in planicie.

- 1419 LOLIUM procumbens, spica disticha, locustis terribus trifloris. *Gramen loliaceum majus supernum spica multiplice* C. B. PRODR. p. 19. in Valesia inferiori.

- 1420 LOLIUM annuum, locustis diffitis. *Gramen loliaceum spica longiore* s. *Lolium* *Dioscoridii* C. B. SCHEUCHZER. p. 31. inter segetes humidiiores.

## III. CALYCE BIGLUMI.

- 1421 SECALE glumarum ciliis scabris LINN. in Helvetia germanica princeps est seges.

*S. cereale*

- 1422 TRITICUM locustis imbricatis, quadrifloris, glabris, muticis. *Triticum* BLAKWELL. t. 40. in Helvetia gallice loquente.

*T. engyzileum*

- Z. maximum* 1423 TRITICUM levissimum, glaucum, locustis quadri-floris, duobus floribus aristatis, duobus mucronatis †. seri incipit.
- Z. spelta* 1424 TRITICUM floribus quaternis, duobus secundis, glumis adhaerentibus. *Zea dicoccos* & *major* C. B. *theatr.* p. 413.
- Z. monococcum* 1425 TRITICUM spica disticha, floribus ternis, fertili unico, glumis tridentatis, florali aristato. *Zea Oriza dicta* f. *monococcos germanica* C. B. *theatr.* p. 415. in montanis.
- Z. repens* 1426 TRITICUM radicibus repentibus vaginosis, foliis hirsutis, locustis quinquefloris. *Gramen caninum arvense* f. *Dioscoridis* SCHREUCHZER. p. 5 ad f. pes.
- 1427 TRITICUM radicibus reptantibus vaginosis, foliis hirsutis, locustis octifloris †. *Gramen latifolium spica triticea compacta* C. B. SCHREUCHZER. p. 7 ad sepes.
- Z. junceum* 1428 TRITICUM radice rapente, culmo duro, foliis hirsutis, locustis quinquefloris. *Gramen tritici spica mutica simile angustifolium* C. B. SCHREUCHZER. p. 7. in apricis supra Tvorne, in Valesia.
- Z. caninum* 1429 TRITICUM radice fibrosa, foliis hirsutis, locustis quinquefloris aristatis. *Gramen caninum non repens elatius spica aristata* HIST. OXON. III. p. 177. Basileæ, à la Ferrière &c.
- Z. tenuellum* 1430 TRITICUM radice fibrosa, foliis angustissimis, locustis muticis, ovatis, obesis. *Gramen lolliaceum foliis & spicis tenuissimis* HIST. OXON. III. p. 182 circa Wyl.
- 1431 TRITICUM spicis distichis, locustis teretibus, hirsutis, aristatis, duodecimfloris. *Gramen lolliaceum corniculatum* SCHREUCHZER. p. 35. locis sylvosis.
- 1432 TRITICUM locostis exiguis, hirsutis, teretibus, remotis, culmis floriferis gracilibus. *Gramen lolliaceum corniculatum, spica partiali subhirsuta fragili* EJUSD. sylvæ. montanæ & subalpinæ.
- 1433 FESTUCA locustis teretibus, multifloris, glumis membranaceis breviter aristatis †. *Gramen spar-teum*

*zeum spica Briza paniculata BARRELIER. ic. 25.  
Basileæ, Bernæ.*

- 1434 FESTUCA locustis teretibus muticis octifloris, flosculis alternis imperfectis. *Gramen montanum avenaceum locustis muticis tumentibus, non pilosis* SCHREUCHZER. p. 170. montana.
- 1435 FESTUCA foliis hirsutis latiusculis, locustis paniculatis, quinquefloris, glabris, aristatis †. *Gramen pratense paniculatum elatius, spica laxa heteromalla* EJUSD. p. 289. in pratis.
- ?1436 FESTUCA quæ Gramen alpinum latifolium, paniculis heteromallis EJUSD. p. 278. in humidis alpium Rhæticarum.
- 1437 FESTUCA foliis perangustis, panicula stricta, locustis distichis, aristatis, glabris, septifloris. *Gramen pratense panicula duriore laxa unam partem spectante* RAJ. SCHEUCHZER. p. 285. in pratis siccis.
- 1438 FESTUCA foliis radicalibus setaceis, caulinis latioribus, locustis septifloris †. *Gramen nemorum foliis præter culmum junceis in culno latioribus* SCHEUCHZER. hort. sicc. haud longe Tigruso.
- 1439 FESTUCA panicula stricta, locustis teretibus quadrifloris †. in M. Tavejannaz.
- 1440 FESTUCA foliis perangustis, locustis quinqueflos-  
ris, teretibus, aristatis, oris membranaceis. *Gramen alpinum panicula duriore laxa locustis ma-  
joribus* SCHREUCHZER. p. 287. alpina & mon-  
tana.
- 1441 FESTUCA foliis perangustis, panicula stricta, locustis teretibus hirsutis, longius aristatis †. alpina.
- 1442 FESTUCA foliis perangustis, panicula stricta, locustis quinqueflos-  
ris tuberculatis, brevibus, majus, radice nigra C. B. SCHEUCHZER. p. 279.
- B. *Gramen capillaceum locustis pennatis non aristatis* EJUSD. p. 276. in torfaceis.
- Y. *Gramen montanum foliis capillaceis longioribus,*  
I 2 *panicula*

- panicula heteromalla spadicea* ♂ veluti amethystina SCHEUCHZER. p. 276.
- ♂. *Gramen alpinum pratinse panicula laxa locustis majoribus* var. *pumila* EJUSD. p. 288. Alpina.
- ♂. ♂. *Gramen sparteum montanum spica spadicea, majus* ♂ *minus* RAJ. Syn. III. p. 410. t. 22. f. 1.
- & ♀. ♂. *Gramen paniculatum sparteum alpinum, panicula angusta, spadiceo viridi, proliferum,* SCHRUCHZER. p. 213. t. 1. hæ alpinæ.
- 1443 *FESTUCA* foliis setaceis, panicula erecta, locustis glabris, longius aristatis. *Gramen festaceum mynum majori spica heteromalla* EJUSD. p. 294. Basileæ, Bernæ &c.
- 1444 *FESTUCA* locustis bifloris, mucronatis, confertim imbricatis, panicula spicata. *Gramen spica aristata subhirsutum* C. B. SCHEUCHZER. p. 167. ad vias siccas.
- 1445 *FESTUCA* locustis bifloris spicatis, calycibus glabris, floribus villosis †. *Gramen Valesiacum temnijolium panicula spicata viridi argentea splendente* EJUSD. p. 169. ad agrorum margines in Valesia inferiori.
- 1446 *SESLERIA* locustis trifloris imbricatis, flore tricorni. *Gramen glumis variis* C. B. theatr. p. 158 SCHEUCHZER. p. 83. ad rupes, etiam in pratis.
- 1447 *SESLERIA* locustis quinquefloris, distichis, calyce bidentato †. summarum alpium.
- 1448 *POA* petiolis tenuissimis, locustis ovatis. *Gramen tremulum majus* C. B. SCHEUCHZER. p. 204. in pratis.
- 1449 *POA* petiolis tenerimis, locustis triangularibus. *Gramen tremulum minus panicula parva* C. B. SCHEUCHZER. p. 205. non satis certa planta.
- 1450 *POA* locustis distichis decemfloris, calycibus acutis. *Gramen paniculis elegantissimis minimum,* C. B. SCHEUCHZER. p. 192. Villæ novæ, Basileæ.
- & ♂. *Gramen paniculis elegantissimis majus, locustis purpureo spadiceis minoribus* EJUSD. p. 193.
- 1451 *POA* foliis latis, asperis, locustis teretibus, mucicis, glumarum oris membranaceis. *Gramen lolliaceum,*

- liaceum, panicula multiplici & spicata SCHEUCH.  
ZER. p. 200. ad vias.
- 1452 POA locustis distichis muticis spicatis †. ad vias.
- 1453 POA locustis teretibus multifloris, glumis flora-  
libus exterioribus truncatis, interioribus bifidis.  
*Gramen aquaticum fluitans multiplice spica* C. B.  
SCHEUCHZER. p. 194. in fossis.
- 1454 POA altissima, foliis latissimis, panicula amplissi-  
ma, locustis distichis multifloris. *Gramen pa-  
lustre paniculatum, altissimum* C. B. SCHEUCH-  
ZER. p. 191. passim in fossis aqua plenis.
- 1455 POA culmo compresso, declinato, locustis disti-  
chis, sexfloris. *Gramen paniculatum, radice re-  
pente, culmo compresso, locustis distichis pulchellis*  
SCHEUCHZER. p. 198. in mutis.
- 1456 POA latifolia, culmo debili, locustis quadrifloris,  
calycis glumis æqualibus, floralium dorso sericeo.  
*Gramen alpinum majus panicula speciosa variagata*  
SCHEUCHZER. p. 186.
- & B. *Gramen pratense paniculatum minus rubrum*  
EJUSD. p. 190. t. 3.
- & B. *Gramen alpinum latifolium panicula laxa  
foliacea, foliolis in panicula paucioribus & ma-  
ge crispis* EJUSD. prodr. p. 22. t. 2. *alpina, etiam  
montana.*
- 1457 POA caule erecto, panicula rara, locustis triflo-  
ris, basi dorsoque villosis †. *Gramen alpinum  
paniculatum panicula spadiceo viridi elegans*,  
EJUSD. p. 163. t. 4. *prata altiora alpium.*
- 1458 POA panicula sparsa, locustis quadrifloris, folli-  
culis villosis †. *alpina.*
- 1459 POA juncea, culmo erecto, locustis quadrifloris,  
dorso sericeo †. *alpina.*
- 1460 POA foliis duris, se convolventibus, locustis  
quadrifloris, villosis. *Gramen pratense panicula-  
tum majus angustiore folio* C. B. SCHEUCHZER.  
p. 178. in pratis aridis.
- 1461 POA foliis bulbosis, panicula diffusa, locustis  
quadrifloris subvillosis. *Gramen arvense angu-  
stifolium, panicula densa foliacea, foliolis in*  
pa-

*P. aquatica**P. campiginea**P. alpina**P. montana**P. angustifolia*

- panicula angustissimis* SCHEUCHZER. p. 212. in muris & ad vias calidiorum.
- 1462 POA panicula diffusa, locustis trifloris villosis. *Gramen pratense paniculatum majus*, solis præter culnum angustioribus in culmo latioribus, SCHEUCHZER. p. 203. in pratis.
- 1463 POA culmo recto, locustis trifloris glaberrimis, calycibus mucronatis †. *Poa panicula ericta, spiculis trifloris glabris, corollis acuminatis calyce duplo longioribus* GERARD. flor. prov. p. 9. t. 2. alpina Valesiæ.
- 1464 POA stolonifera, locustis trifloris, folliculis villosis †. *Gramen pratense paniculatum medium, angustiori folio* SCHEUCHZER. p. 181. subalpina.
- 1465 POA panicula diffusa, locustis trifloris, glabris. *Gramen paniculatum pratense majus*, EJUSD. p. 177. in pratis.
- 1466 POA culmo infacto, panicula triangulari. locustis trifloris glabris. *Gramen pratense paniculatum minus* C. B. SCHEUCHZER. p. 189. ad vias.
- 1467 POA panicula stricta, locustis trifloris, calycibus aristatis, floribus villosis. *Gramen paniculatum aquaticum angustifolium panicula speciosa locustis parvis* SCHEUCHZER. p. 184. in udis.
- 1468 POA panicula stricta, locustis bifloris, folliculis basi villosis †. *Gramen paniculatum angustifolium montanum panicula densa locustis parvis muticis* EJUSD. p. 180. in muris.
- 1469 POA culmo debili, panicula nutante, locustis bifloris, folliculis subvillosis. *Gramen canino viueali simile, angustioribus foliis, paniculis minoribus non aristatis* I. I. SCH. It. II. p. 135. t. 18. f. 2.  
*B. Gramen villosa* & *cirrrosa spongia ad singula genicula donatum angustifolium spinum* I. SCH. Agrobiog. p. 165. in umbrosis montanis & subalpinis.
- 1470 POA panicula laxa, locustis bifloris, floribus calyce duplo longioribus glaberrimis †. inter *Salanche* & *Chionophyllum*.

- 1471 POA locustis bifloris, glabris, florali glumia majori plicata serrata. *Gramen miliaceum aquatum*. *Oira aquatica*. SCHUCHZER. Agrest. p. 172. in fossis.
- 1472 POA panicula laxa, locustis nutantibus, dianthis, alterno flore imperfecto. *Gramen avenaceum*, *locustis rubris montanum* C. B. prodr. n. 71. SCHUCHZER. p. 175. in sylvis.
- 1473 POA monantha, stolonifera, calycibus subsperis f. *Gramen caninum supinum minus* SCHUCHZER. p. 128. ad vias.
- G. Gramen radice repente panicula delicata spadiceo viridi* EJUSD. p. 127.
- 1474 POA monantha, foliis setaceis, calycibus dorso exasperatis. *Gramen minimum palustre*, *panicula spadicea delicata*, *tenuisolum*, *semine exiguo rotundo* EJUSD. p. 131. circa lacum Felinum.
- 1475 POA monantha, caule erecto, panicula diffusa, calycibus dorso exasperatis. *Gramen montanum panicula spadicea delicatori* C. B. theatr. p. 36. SCHUCHZER. p. 129. in aridis, apicis, etiam alpinis.
- 1476 POA monantha, caule erecto, panicula stricta pauciflora. *Gramen miliaceum*, *angustisolum*, *calyce levi*, *glumis perexiguis* DILLE. Syn. III. p. 404.
- 1477 AVENA monantha, paniculata, gluma calycina exasperata, arista flori æquali f. *Gramen parvum paniculatum panicula spadicea aristata* SCHUCHZER. p. 140. *alpina*.
- 1478 AVENA monantha, paniculata, foliis setaceis, gluma calycina exasperata, arista flore duplo longiori f. *Gramen paniculatum capillaceo folio, locustis spadiceo fuscis*, *aristatis* EJUSD. p. 141. *alpina*.
- 1479 AVENA monantha, panicula diffusa, multiflora, adscendente, gluma calycina exasperata. *Gramen caninum supinum paniculatum folio varians* C. B. theatr. p. 12.
- G. Gramen paniculatum supinum ad infima culmorum*

*rum genicula foliorum capillaceorum fasciculo donatum* SCHUCHZER. p. 141. in pratis subudis.

*Agr. spica ventosa.* 3480 AVENA monantha, panicula adscendente multiflora, calyce levi, florali arista longissima. *Gramen segetum altissima panicula sparsa* EJUSD. p. 144. in agris planioribus.

*Agr. diantha.* 3481 AVENA monantha, panicula sparsa, arista florrem superante †. *Gramen caninum vineale*, EJUSD. p. 143. *Tiguri* in vinearum viis.

*Agr. diantha.* 3482 AVENA diantha, foliis setaceis, panicula divaricata. *Gramen paniculatum purpuro argenteum locustis parvis annuum* HIST. OXON. III. p. 200. in siccioribus Basileæ, in valle Tellina.

*Aira caerulea.* 3483 AVENA diantha, foliis setaceis, panicula stricta, arillis clavatis. *Gramen foliolis junceis oblongis*, radice alba C. B. theatr. p. 72. HIST. OXON. III. p. 200. SCHEUCHZER. p. 242. Basileæ, nos in fabulosis Germaniæ.

*Aira holcus laevigata.* 3484 AVENA diantha, floribus ovatis, perfecto mutico, imperfecto a istato. *Gramen pratense paniculatum molle* C. B. HIST. OXON. p. 202. SCHEUCHZER. p. 234. in pratis.

*Aira holcus mollis.* 3485 AVENA . . . *Gramen caninum paniculatum molle* SCHEUCHZER. p. 235. Basileæ.

*Aira holcus molle.* 3486 AVENA diantha, pediculis flexuosis, floribus basi villosis, locustis ovatis. *Gramen avenaceum paniculatum alpinum*, foliis capillaceis brevibus, locustis purpuro argenteis splendentibus EJUSD. p. 216. in subalpinis.

B. *Gramen alpinum nemorosum*, paniculatum, foliis angustissimis, locustis splendentibus aristatis EJUSD. p. 218. iisdem locis.

*Aira capillaris.* 3487 AVENA diantha, panicula amplissima, patula, bicolore. *Gramen segetum panicula arundinacea* EJUSD. p. 244. in pratis & segetibus.

*A. festucales.* 3488 AVENA diantha, panicula sparsa erecta, floribus auratis, basi villosis †. in summis alpibus.

*A. Diabolo phyt.* 3489 AVENA dianha, foliis planis patulis, petiolis floribus villosis †. *alpium editiorum frequens hospita.*

1490 AVENA diantha, panicula densa spicata. Gramen aveneum paniculatum alpinum humile, locustis in spicam collectis varicoloribus aristatis, SCHBUECHZER. p. 221. alpium editiorum & steriliorum.

1491 AVENA diantha, folliculo villoso, calycis glumis inæqualibus, altera de imo dorso, altera de summo aristata. Gramen pratense spica flavescente C. B. theatr. p. 44. SCHBUECHZER. p. 88. in pratis.

1492 AVENA diantha, folliculis basi villosis, majoris arista geniculata. Gramen nodosum avenacea panicula C. B. theatr. p. 18. SCHBUECHZER. p. 239 in agris, pestis frugum.

B. Gramen avenaceum elatius spica longa splendente Ejusd. p. 239.

1493 AVENA diantha, glumis floralibus villosis, ex basi aristatis †. Gramen palustre paniculatum minor Ejusd. p. 257. in uidis Basileæ & Tiguri.

1494 AVENA diantha, locustis pendulis, floribus cartilagineis, inæqualibus, majori aristata. Avena BLAKWELL. t. 422. Seritur & sponte sata redit.

1495 AVENA triantha, locustis patulis villosis. Gramen avenaceum locustis lanugine flavescentibus, SCHBUECHZER. p. 239. in agris Helvetiæ planiosis.

1496 AVENA triantha, locustis paniculatis, hiantibus, flosculo tertio imperfecto. Gramen Marie Bonniforum LOESL. ic. 26. Mülhusiæ.

1497 AVENA triantha, locustis teretibus, calycina gluma altera minima, petiolo villoso. Gramen avenaceum pratense elatius panicula flavescente, locustis parvis SCHBUECHZER. p. 223.

& Gramen cum locustis majoribus villosis Ej. p. 225 in pratis.

y. Gramen pratense villosa panicula ex argentea dilute spadicea vel fusca Ej. p. 220.

1498 AVENA triantha, locustis teretibus erectis, petiolis sericeis, gluma exteriori lacera †. Gramen avenaceum panicula purpuro argentea splendente Ejusd. p. 226. in Helvetiæ pratis.

- O. pratensis.* 1499 AVENA petiolis brevibus unifloris, locustis teretibus quinquefloris, basi pubescentibus. Gramen avenaceum loculis splendentibus & bicornibus, VAILLANT. t. 18. f. 1. alpina & subalpina.
- O. versicolor.* 1500 *lil-* 1501 AVENA petiolis ramosis, locustis teretibus, quinquefloris, basi pubescentibus †. Gramen avenaceum, paniculatum, alpinum, loculis varicoloribus majoribus aristatis EJUSD. p. 231. alpina editiora.
- Bromus squarrosus.* 1501 AVENA loculis teretibus novemfloris, aristis reflexis. Festuca avenacea glumis vacuis EJ. p. 252 in agris Valesia.
- B. Segetum.* 1502 BROMUS foliis glabris, loculis duodecimfloris. Festuca graminea glumis hirsutis EJ. p. 253. in segetibus.
- B. mollis.* 1503 BROMUS foliis hirsutis, oris asperimis, loculis glabris, teretibus, novemfloris †. Festuca graminea nemoralis latifolia mollis C.B. theatr. p. 144 145. in segetibus.
- B. sterilis* 1504 BROMUS hirsutus, loculis septifloris, ovato conicis. Gramen avenaceum villosum loculis angustis canticantibus & aristatis, SCHEUCHZER. p. 254. ad vias, in muris & agris vulgo.
- 1505 BROMUS panicula nutante, loculis septifloris, glumis argute lanceolatis, lineatis, subhirsutis. Gramen avenaceum, panicula sparsa, loculis majoribus & aristatis EJUSD. p. 258. ad vias & muros.
- 1506 BROMUS glaber, panicula nutante, loculis quadrifloris, glumis subhirsutis †. Gramen bromoides montanum hirsutum, panicula minus sparsa corniculata EJ. p. 263.
- & Gramen bromoides panicula sparsa loculis minoribus aristatis p. 511. in sylvis & ad aquas.
- 1507 BROMUS hirsutus, angustifolius, loculis quinquefloris, aristis folliculo brevioribus †. Gramen bromoides pratense foliis præter culnum angustioribus rara lanugine villosis EJ. p. 355. in pratis.

- 1508 BROMUS hirsutus, panicula nutante, pauciflora,  
locustis quinquefloris hirsutis, glumis aigue lan-  
ceolatis. An *Festuca avenacea sterilis humilior*  
C. B. ad. ripas.
- 1509 BROMUS glaber, locustis glabris nutantibus oc-  
tifloris, glumis marginatis. *Festuca graminea*  
*effusa juba* SCHREUCHZER. p. 262. in agris. *D. Avenacea*.
- 1510 BROMUS glaber, locustis nutantibus quadrifloris,  
aristis longissimis. *Gruener bromoides aquaticum*  
*latifolium*, panicula sparsa tenuissime aristata,  
EJ. p. 264. in aquosis.
- 1511 BROMUS panicula laxa, locustis quadrifloris, bre-  
vissime aristatis. *Gramen arundinaceum*, locustis  
*viridi spadiceis loliaceis*, brevius aristatis, EJ.  
p. 266. ad aquas.
- 1512 BROMUS locustis quadrifloris, fasciculatis, imbri-  
catis. *Gramen spicatum folio aspero* C. B. theatr.  
p. 45. SCHREUCHZER. p. 299. ad vias.
- 1513 STIPA aristis nudis flexuosis, calyce semine lon-  
giori. *Festuca juncea folio* C. B. theatr. p. 145. *f. capillata*.  
SCHREUCHZER. p. 151. & *Festuca longissimis ari-*  
*stis* C. B. theatr. p. 152. 153. ad muros calidio-  
rum.
- 1514 STIPA aristis plumosis. *Gramen spicatum*, ari-  
stis pennatis SCHREUCHZER. p. 153. ad rupes ca-  
lidiores. *f. pennata*.
- 1515 ARUNDO foliis secantibus, locustis trifloris, pap-  
posis, muticis. *Arundo vulgaris* L. *Phragmites*  
*Dioscoridis* SCHREUCHZER. p. 161. in fossis, ad  
stagna.
- 1516 ARUNDO caule lignoso, geniculato, foliis latissi-  
mis, locustis trifloris. *Arundo sativa* que *Do-*  
*nax Dioscoridis* C. B. theatr. p. 271. SCHREUCHZER  
p. 156. in collibus calidis, sub Olon.
- 1517 ARUNDO locustis bifloris, spicatis, gluma florali  
exteriori ciliata. *Gramen avenaceum spica sim-*  
*plici*, locustis densissimis candicantibus  $\hat{\sigma}$  lanu-  
ginosis SCHREUCHZER. p. 174. ad rupes & muros  
calidiores.
- 1518 ARUNDO locustis bifloris conicis, petiolis sub-  
villofis. *Gramen paniculatum autumnale*, pan-  
cula *Cirro Coerulea*.

*cula ampliore ex viridi nigricante* SCHEUCHZER p. 207. & *locustis angustissimis* p. 208. in pratis Aquilejensibus.

B. *Gramen arundinaceum enode minus* EJ. p. 209. in toraceis.

1519 ARUNDO locustis unifloris, papposis, muticis, panicula alterne contracta. *Gramen arundinaceum panicula molli spadicea majus* C. B. theatr. p. 93. SCHEUCHZER. p. 122. in pratis udis arenosis.

1520 ARUNDO locustis unifloris, sericeis, muticis, panicula stricta. *Gramen arundinaceum paniculatum montanum*, *panicula spadiceo viridi*, *semine papposo* EJ. p. 124. in sylvis alpinis.

*Agr. calamagrostis* 1521 ARUNDO locustis unifloris, ex summa gluma aristatis. *Gramen arundinaceum panicula aristata densa*, *viridi argentea*, *splendente*, EJUSD. p. 146. ad rupes Gubernii Aquilejensis frequens.

*Agr. Avenaceae* 1522 ARUNDO locustis unifloris, ex imo dorso aristatis †. *Gramen avenaceum montanum panicula angusta* e *dilutissime fusco albicante* & *papposa* EJUSD. p. 507. similibus locis, in Rauracis, in M. Dansex.

1523 ARUNDO locustis unifloris, arista ex imo dorso, florem superante †. in montanis Aquilejensibus.

1524 ARUNDO locustis unifloris, fasciculatis, imbricatis, glumis floralibus nitentibus subhirsutis. *Gramen miliaceum aquaticum Phalaridis semine* SCHEUCHZER. p. 126. ad fossas & fluvios.

1525. MILIUM. paniculis rarissimis, petiolis longissimis. *Gramen sylvaticum miliaceum panicula sparsa*, EJUSD. p. 131. & *Gr. pan. alp. panicula miliacea sparsa* p. 134. in sylvis.

*Dactyla* 1526 DIGITARIA foliis subhirsutis, caule debili, spicis verticillatis, scapo ancipite. *Gramen dactylon folio latiore* C. B. theatr. p. 114. SCHEUCHZER p. 103. in hortis.

1527 DIGITARIA stolonibus teretibus, foliis patulis, glabris, spicis digitatis. *Gramen dactylon radice repente s. officinarum* EJUSD. p. 104. ad lacum Lemanum in arenosis.

- 1528 PHLEUM caule erecto, spica cylindrica longissima, glumis calycinis oblique truncatis. *Gramen typhoides maximum spica longissima C.B.theatr. p. 49.* *P. pratense*  
*SCHEUCHZER. p. 65. in pratis.*
- 1529 PHLEUM spicis ovatis hirsutis, loculis longe bicornibus. *Gramen typhoides alpinum spica brevi densa & veluti villosa EJUSD. p. 64. in alpinis pratis.* *P. Alpinum*
- 1530 PHLEUM caule imo bulbose, declinante, glumis calycinis obtuse truncatis. *Gramen typhoides asperum alterum EJUSD. p. 62. in pratis & viis.*
- 1531 PHLEUM culmo recto, spicis cylindricis glabris, calyce brevissime mucronato. *Gramen typhoides asperum primum C. B.theatr. p. 51. SCHEUCHZER p. 61. in pratis.* *P. Asperum*
- 1532 PHLEUM panicula spicata hirsuta, calyce lanceolato †. *Gramen typhoides alpinum, spica graciliori delicata & villosa EJUSD. p. 65. in alpinis & montosis pratis.* *P. Phalaridium*
- 1533 HORDEUM spica subdisticha, calyce folioso setaceo, floribus omnibus hermaphroditis, longe aristatis. *Hordeum polystichon vernum C.B.theatr. p. 439.* *H. Vulgare*
- 1534 HORDEUM spica polysticha, floribus omnibus hermaphroditis, longe aristatis. *Hordeum hexastichum. C. B.* *H. Hexastichum*
- 1535 HORDEUM . . . *Hordeum distichum C.B. theatr. p. 440.* *H. Distichon*
- 1536 HORDEUM spica crassa, longe aristata, calycinis glumis aristatis. *Gramen hordeaceum minus & vulgare C. B. theatr. p. 139. SCHEUCHZER. p. 14. ad vias.* *H. Mariannum*
- 1537 HORDEUM spica cylindrica rigida, calycinis glumis aristatis †. *Gramen hordeaceum montanum spica strigosiore brevius aristata, SCHEUCHZER. p. 16. in sylvis.* *H. silvaticum*
- 1538 HORDEUM spica disticha, foliulo brevi, glumis calycinis aristatis †. *Gramen spicatum secundum minus EJUSD. p. 17. ad agros & fluviorum oras.*

## IV. FOLLICULO UNIGLUMI.

*o. pratensis*

- 1539 ALOPECURUS spica ovata. *Gramen typhoides molle* SCHEUCHZER. p. 50. in pratis montanis.
- 1540 ALOPECURUS culmo erecto spicato, calyce ciliato. *Gramen spicatum spica cylindracea tenuissima longiore* EJUSD. p. 69. in agris.
- 1541 ALOPECURUS culmo spicato infracto. *Gramen aquaticum geniculatum spicatum* C. B. theatr. p. 41. SCHEUCHZER. p. 72. in fossis aquosis.

## V. CALYCE TRIGLUMI.

*P. verna**P. pratense**P. verticillatum**P. glaucum*

- 1542 PANICUM spica unica, flosculis sessilibus solitariis, setis numerosis. *Gramen paniceum s. sylvestre, spica simplici* C. B. theatr. p. 138. SCHEUCHZER. p. 46. in agris & hortis.
- 1543 PANICUM spica unica, paniculata, setis perpaucis. *Gramen paniceum, spica aspera* EJUSD. p. 47. C. B. theatr. p. 139. in agris.
- 1544 PANICUM spica ramosa, setis nullis. *Gramen panicum spica divisa* SCHEUCHZER. p. 149. ad fossas & in aquosis.

## VI. CALYCE PINNATO.

- 1545 CYNOSURUS bracteis pinnatis retusis. *Gramen pratense cristatum, s. spica cristata* C. B. SCHEUCHZER. p. 79. in pratis.
- 1546 CYNOSURUS bractearum dentibus lanceolato linearibus. *Gramen alopecitroides, spica aspera*, EJUSD. p. 80. ad pedem M. S. Bernhardi, in valle Prætoria.

## XIII. APETALÆ.

## I. FLORIB. UTRIUSQUE SEXUS CONJUNCTIS

## I. VASCULIFERÆ POLYSPERMÆ.

- 1547 ASARUM foliis reniformibus subhirsutis. *Asarum Dodon. purg.* p. 110. passim in sylvis montanis.

- 1548 CHrysosplenium foliis alternis LINN. &c. *C. alternaſiſolium*  
*Sedum palustre majus foliis longis pediculis in-*  
*fidentibus Hist. OXON. III. p. 477. in umbrosa*  
*pallim.*
- 1549 CHrysosplenium foliis conjugatis LINN. *Sa-*  
*xifraga aurea DODON. pempt. p. 316. supra*  
*Mulhusiam, in adscensu montis Ballon, & haud*  
*longe Ferrières.* *oppositifolium.*

## II. MONOSPERMÆ.

### I. DIPLOSTEMONES.

- 1550 SCLERANTHUS floris segmentis erectis. *Alebī-*  
*milla gramineo folio majori flore VAILLANT. t. I.*  
*f. 5. Basileæ, ad Wiesam & prope Wyl. in Va-*  
*lesiæ inferioris arenosis.*
- 1551 SCLERANTHUS floribus patulis. *Polygonum*  
*Germanis Kramel TRAG. p. 393. in agris.*

## II. ANOMALÆ.

- 1552 HERNIARIA glabra, glomerulis multifloris. *Her-*  
*niaria glabra I. B. I. II. p. 379. passim in are-*  
*nosis & glareosis.* *H. glabra.*
- 1553 HERNIARIA hirsuta, glomerulis paucifloris. *Her-*  
*niaria hirsuta I. B. ib. Misti glabré prope*  
*Basileam. In Valesia inferiori & vallibus eo-*  
*spectantibus.* *H. hirsuta.*
- 1554 POLYGONUM foliis ovato lanceolatis, vagi-  
 nis calvis truncatis. *Hydropiper DODON. cereal.*  
 p. 269. ad fossas.
- 1555 POLYGONUM foliis ovato lanceolatis glabris,  
 spicis strigosis, vaginis ciliatis †. *Perſicaria*  
*angustifolia C. B. prodr. p. 43. in torfaceis &*  
*humidis sylvarum.*
- 1556 POLYGONUM foliis ovato lanceolatis, subtus  
 tomentosis, spicis ovatis, vaginis ciliatis †. *Per-*  
*sicaria folio subtus incano RAJ. Syn. III. p. 145.*  
 in Rheni insulis.

1557

- 1557 POLYGONUM foliis ovato lanceolatis, subhirsutis, spicis ovatis, vaginis ciliatis. *Perficaria Dodon.* pempt. p. 108. ad fossas & vias.
- 1558 POLYGONUM radice lignosa, intorta, foliis nervosis, radicalibus ovato lanceolatis, caulinis linearibus. *Bistorta minor f. alpina CAMER.* epit. p. 684. *alpina*, etiam *montana* edita.
- 1559 POLYGONUM radice lignosa intorta, spica ovata, foliosis petiolis alatis. *Bistorta Dodon.* purg. p. 40. 41. in pratis udis.
- 1560 POLYGONUM procumbens, foliis linearibus acutis, floribus solitariis. *Polygonum mas MATTHIOL.* p. 911. ad vias & in agris.
- 1561 POLYGONUM caule volubili, foliis sagittatis. *Volubilis nigra TABERN.* p. 876. agrorum vitium.
- 1562 POLYGONUM caule volubili, foliis sagittatis, valvulis seminalibus alatis. *Convolvulum nigrum Dodon.* purg. p. 220. in sepibus & hortis.
- 1563 POLYGONUM caule erecto, foliis sagittatis, valvulis integerrimis. *Fagopyrum Dodon.* cereal. p. 80. in agris & ad lacum Lemanum.
- 1564 POLYGONUM caule erecto, foliis ovato lanceolatis, subhirsutis, spicis paniculatis. *Perficaria alpina folio nigricante, floribus albis BOCCONE* mis. di plant. t. 27. *ALLIONE spec.* p. 41. t. 8. ad pedem Alpium *Grisearum* circa *Formazz* in pratis.
- 1565 POLYGONUM foliis ovato lanceolatis, ciliatis, spicis ovatis. *Fontalis f. Potamogeton DODON.* cereal. p. 227. &  
B. *Perficaria acida Jungermanni*, Comm. Lit. Nor. 1737. t. 5. f. 1. in stagnis, adque fossas & in vineis.

## III. MEIOSTEMONES.

*A. vulgaris*

- 1566 ALCHEMILLA foliis ferratis, palmatis, seminovemfidis. *Stellaria CAMER.* epit. p. 908. in pratis.
- 1567 ALCHEMILLA foliis sericeis digitatis, apice dentatis. *Stellaria argentea CAMER.* epit. p. 909. in montanis & alpinis.

*A. alpina*

- 1568 ALCHEMILLA foliis glabris, quintatis, semimod.  
tilobis. *Alchemilla alpina*, *pentaphyllaea minima*  
*lobis fimbriatis* BOCCONE mas. di piant. t. I. sum-  
marum alpium. *A. Leptophyllaea*
- 1569 ALCHEMILLA hirsuta, foliis trilobatis, lobis bi-  
partitis & tripartitis. *Alchemilla minima monta-*  
*na* COLUMN. I. p. 146. 148. in agris. *Alphanea Orneusii*
- 1570 POLYCNEMON LINN. *Anthyllis altera Italorum*  
LOBEL. p. 504. in agris circa Urbam, in Valesia  
inferiori, Basileæ.
- 1571 BLITUM foliis semitrilobis, rarer dentatis. *A-*  
*triplex sylvestris*, *lappulas habens* C. B. prodr.  
p. 58. in Rhætia & Helvætia transalpina.

## IV. ISOSTEMONES.

- 1572 LIMNOPEUCE CORD. VAILL. mem. 1719. t. I. f. 3;  
in fossis aquosis & lacubus.
- 1573 THESIUM caule erecto, paniculato, foliis lan-  
ceolatis. *Anonymos Lini folio* CEUS. pann. p. 312.  
circa Mendris.
- 1574 THESIUM caule diffuso, floribus alaribus, foliis  
linearibus. *Thesium floribus tetrandris* JACQUIN.  
vindob. p. 15.
- 1575 CHENOPODIUM foliis subulatis, sericeis, florum  
glomerulis geminis †. *Kali hirsuto affinis*, *An-*  
*thylloidis forte aliqua species* I. B. III. p. 205. in  
valle Augusta ad pedem alpium Valesiacarum.
- 1576 CHENOPODIUM caule erecto, foliis ovatis inte-  
gris. *Blitum sylvestre* CAMER. epit. p. 237. in  
hortis & ad macerias.
- 1577 CHENOPODIUM caule diffuso, foliis obtuse lan-  
ceolatis. *Garosmus* DODON. pempt. p. 616. in regio-  
num vitibus alendis aptarum ruderolis & ad muros.
- 1578 CHENOPODIUM foliis triangularibus, un-  
tulatis, integerimis, subtus farinosis. *Bonus Henricus*  
TRAG. p. 317. in fumetis & ruderolis.
- 1579 CHENOPODIUM foliis subtriangularibus, farinosis rhombi-  
deis, dentatis, superioribus integerimis. *Atri-*  
*plex sylvestris tertia* CAMER. epit. p. 243. ad vias  
& in hortis.

- 1580 CHENOPODIUM foliis rhomboideis , dentatis , subius incanis. *Chenopodium opuli folio* VAILLANT. t. 7. f. 1. ad macerias.
- 1581 CHENOPODIUM foliis glabis septangulis , floribus paniculatis. *Chenopodium Stramonii folio*, VAILLANT. t. 7. f. 2. similibus locis.
- 1582 CHENOPODIUM foliis glabris trilobatis dentatis. *Blitum ficus folio* PETIVER. herb. brit. t. 8. similibus locis.
- 1583 CHENOPODIUM foliis nitentibus , glabris , acute circumdentatis. *Pes anserinus* FUCHS p. 633. perinde.
- 1584 CHENOPODIUM foliis oblongis , sinuatis , subtus incanis. *Atriplex angustifolia laciniata* I. B. II. p. 472. Aquilegiæ ad simeta.
- 1585 CHENOPODIUM foliis oblongis , semipinnatis , viscidis , rotunde dentatis. *Botrys MATTHIOL.* p. 853. passim in Helvetia calidiori , in gla- reosis.
- 1586 ULMUS foliis scabris , ovato lanceolatis , dentibus ferratis. *Ulmus CAMBRAR.* epit. p. 70. ejusque multæ varietates. in Aquilejensibus , &c.
- 1587 LAPATHUM foliis obtusis , circa petiolum emarginatis , paniculis dense spicatis , vaginis maximis. *Lapathum rotundo alpinum* I. B. II. p. 987. ad casas alpinas.
- 1588 LAPATHUM foliis longe lanceolatis , paniculis densissimis. *Lapathum palustre* TABERN. p. 437. in fossis.
- 1589 LAPATHUM foliis crassis , imis ovatis , supremis lanceolatis , calycibus verrucosis. *Lapathum acutum crassum* TABERN. p. 436. ad vias.
- 1590 LAPATHUM retiolis latescentibus , foliis longe lanceolatis , floribus verticillatis verrucosis. *Lapathum aquaticum minus* I. B. II. p. 987. ad fossas & ripas.
- 1591 LAPATHUM petiolo latescente , foliis longe lanceolatis , calyce ferrato. *Oxy'lapathum* FUCHS p. 461. ad vias.

- 1592 LAPATHUM foliis ovatis, circa petiolum emarginatis, floribus dense paniculatis, serratis, verrucosis. *Hippolapathum sylvestre* TABERN. p. 436. ad vias.
- 1593 LAPATHUM foliis radicalibus utrinque emarginatis, calycibus reticulatis, ciliatis, verrucosis. *Lapathum pulchrum Bononiense sinuatum* I. B. II. p. 988. ad vias vini Vaudensis.  
*Lapathum arvense siccifolium foliis rugosis, caule longe brachiatum, capsula feminis crenata,* TILLI t. 37. f. 2.
- 1594 LAPATHUM foliis sagittatis, cis mucronem latissimis hamis reflexis divergentibus. *Acetosa alpina serpegiante* ZANON. t. 87. in alpinis, etiam montanis & muris.
- 1595 LAPATHUM foliis antice emarginatis. *Acetosa Britannica* BLAIR. miscell. off. p. 67. *alpina* editio.
- 1596 LAPATHUM sexubus separatis, foliis sagittatis, hamis acutis, recurvis *Oxalis minor* CAMER. epit. p. 231. in sterilibus.
- 1597 LAPATHUM sexubus separatis, foliis sagittatis, hamis retrorsum porrectis. *Oxalis* FUCHS. p. 464. in pratis.
- 1598 LAPATHUM sexubus separatis, foliis sagittatis, hamis brevissimis, recta divergentibus. *Acetosa montana latiori ari rotundo folio* BOCCONE t. 125. in vallibus alpinis.

APETALÆ. II. SEXUBUS DIVISIS.

I. IN EADEM PLANTA.

I. POLYSTEONES.

- 1599 CERATOPHYLLUM foliis subspinosis, capsulis tricornibus. *Hydroceratophyllum*, folio aspero, quatuor cornubus armato VAILLANT. mem. ds l' Acad. 1719. t. 2. in fossis planicie,

- 1600 MERCURIALIS caule annuo brachiatu, foliis gla-  
bris, conjugatis, ovato lanceolatis. *Mercurialis*  
*femina* CAMBR. epit. p. 996. & *Mercurialis*  
*Ejusd.* p. 991. in vineis.
- 1601 MERCURIALIS caule perenni, indiviso, foliis  
hirsutis, ovato lanceolatis. *Cynocrambe* CAMBR.  
epit. p. 998. in sylvis.
- 1602 LAURUS foliis ovato lanceolatis, ramis florigeris  
folio brevioribus. *Laurus* CAMBR. epit. p. 60.  
circa Moutrou.

## II. DIPLOSTEMONES.

- H. Alnusoides* 1603 HIPPOPHAE foliis linearibus, subtus rubiginosis  
*Rhamni species* CAMBR. epit. p. 81. in glareis  
torrentum.

## III. MEIOSTEMONES.

- 1604 ZANICHELLIA palustris major &c. MICHELI,  
t. 11. f. 1.
- 1605 EMPETRUM procumbens, foliis ovato lanceo-  
latis obtusis. *Erica baccifera* CAMBR. epit. p. 77.  
alpina edita.

## IV. ISOSTEMONES.

- A. Blitum.* 1606 AMARANTHUS procumbens, foliis ovatis emargi-  
natis. *Blitum album minus* CAMBR. epit. p. 236.  
in hortorum rejectaneis.
- 1607 FICUS foliis palmatis. *Ficus* DODON. pempt. p.  
312. ad vias Valesiae, vallis Tellinæ.
- 1608 LEMNA JUSSIEU mem. de l' Acad. 1743. p. 26;
- v. albua.* 1609 VISCUM foliis lanceolatis, obtusis, caule dichoto-  
mico, spicis alaribus. *Le Gui male du HAMEL*  
t. 22. &c. in arboribus, potissimum malis.
- 1610 BUXUS CAMBR. epit. p. 601. Basileæ, Genevæ &c.  
in collibus aridis.
- 1611 MORUS foliis scabris, cordatis & semitrilobis.  
*Morus alba candida* LOBEL. II. p. 196. in gla-  
reis fluviorum.

#### IV. SEXUBUS DISTINCTIS. 149

- 1612 PARIETARIA foliis hirsutis, elliptico lanceolatis.  
*Helxine* CAMERAB. epit. p. 949. ad muros Hel-  
vetiae calidioris. *P. officinalis.*
- 1613 PARIETARIA foliis subhirsutis, ovato lanceolatis.  
*Parietaria breviori folio*, BOCCONI SICUL. p. 47.  
*Chiavenna, Mendrisii.* *P. judaica.*
- 1614 URTICA stirpibus sexu distinctis, foliis ovato  
lanceolatis, productis, serratis. *Urtica II*  
MATTHIOL. p. 862. ad sepes. *U. Dioica.*
- 1615 URTICA sexubus sede disjunctis, foliis ovato  
lanceolatis serratis, spicis oblongis. *Urtica ter-*  
*tia* MATTHIOL. p. 1127. iisdem locis. *U. urens*
- 1616 CANNABIS DU HAMEL de la Corderie t. 2. & C.  
mas ib. T. I. ex sativa vagabunda. *C. sativa*
- 1616\* ATRIPLEX foliis imis hamatis, reliquis lingula-  
tis, valvulis seminalibus dentatis. *Atriplex vul-*  
*garis angustifolia cum folliculis* I. B. II. p. 973.  
ruderosa. *A. patula.*
- 1617 ATRIPLEX foliis triangularibus, basi producta,  
valvulis triangularibus subasperis. *Deltorrach*  
PETIVER. t. 7. rarius. *Mulhusiae.* *A. hastata.*
- 1618 LUPULUS CAMER. epit. p. 933. &c.
- 1619 CELTIS foliis scabris, serratis, longissime lan-  
ceolatis. *Lotus arbor* LOBEL. II. p. 186. in Hel-  
vetia transalpina, adque M. S. Bernhardi pedem.
- 1620 TAMUS foliis cordatis indivisis. *Vitis nigra*,  
MATTHIOL. p. 1285. ad sepes.

#### V. FLORE COMPOSITO.

- 1621 XANTHIUM foliis semitrilobatis, aculeis unci-  
natis. *Xanthium* CAMER. epit. p. 926. ad fi-  
meta & rudera Helvetiae planioris.

#### VI. JULIFERÆ.

- 1622 FAGUS foliis ovato lanceolatis, oris undulatis.  
*Fagus* CAMER. epit. p. 112. vulgo sylvas efficit.
- 1623 CASTANEA foliis ovato lanceolatis, serratis,  
dentibus aduncis. *Castanea* CAMER. epit. p. 118.  
sylvas facit in Helyvia calidiori.

- 1624 JUGLANS foliis septenis, ovato lanceolatis, integerrimis. *Juglans CAMERAR. epit. p. 172.* ad vias.
- 1625 CORYLUS sylvestris LOBEL. II. p. 192.
- 1626 QUERCUS foliis glabris, semipinnatis, pinnis obtusis, superioribus majoribus.  
*a. Sommereiche CRAMER. t. 2. f. 4.*  
*b. Wintereiche EJUSD. ib. f. 3. Prior in cultis, aquosis, & fertilibus. c. in aridis collibus.*
- 1627 CARPINUS CAMER. epit. p. 71. in nemoribus planitiei.
- 1628 BETULA foliis cordato lanceolatis serratis. *Betula MATTHIOL. p. 142.* in montosis & aquosis.
- 1629 BETULA foliis orbiculatis, crenatis LINN. flor. *Lap. t. 6. f. 4.* in terfaceis Juræ.
- 1630 ALNUS foliis glabris, rotundis, rotunde crenatis, spongiosis ad nervorum angulos. *Alnus MATTHIOL. p. 140.* in aquosis.
- 1631 ALNUS foliis mucronatis, acute serratis, subtus lanuginosiss. *Alnus incana & hirsuta I.B.I. P. II. p. 154.* in dumetis, montanis.  
*a. Alnus montana crista viridis nana glutinosa serrato folio luccone mus. di piant. p. 80. & t. 96. montana.*
- 1632 POPULUS foliis glabris cordato rhomboideis serratis. *Populus nigra MATTHIOL. p. 137.* in aquosi.
- 1633 POPULUS foliis glabris, orbiculatis, acuminatis, laxe serratis. *Populus Izbica CAMER. epit. p. 67.* in sylvis.
- 1634 POPULUS foliis argulosis, subtus tomentosis, subrotundis, dentato angularis. *Populus alba CAMER. epit. p. 61.* in Valesia & Basileæ ad fluvios.
- 1635 SALIX arborea, foliis ellipticis, lanceolatis, subtus sericeis, dentibus crassifcentibus. *Salix LOBEL. II. p. 136.* BLAKWELL. t. 327. ad vias, in sylvis.  
*a. Salix lutea tenuior sativa viminea I. B. I. P. II. p. 214. ad rivos adque fossas.*

- 1636 SALIX stipulis ferratis, foliis lanceolatis, ferratis, glabris. *Salix spontanea fragiiis, amygdalino folio, non auriculata* I. B. II. p. 214. ad ripas lacus Lemani.
- 1637 SALIX foliis glabris, elliptico lanceolatis, ferratis, stipulis dentatis, julis gracilibus, triandria. *Salix elliptico lanceolatis, utrinque glabris, ferratis, appendiculatis* GMELIN. t. 34. f. 3. ad fabulosa fluviorum littora.
- 1638 SALIX stipulis dentatis, foliis glabris, ovato lanceolatis. glumis ovaris pilosis. *Salix folio auriculato splendente flexilis* RAJ. Syn. III. p. 448. non satis certa civis.
- 1639 SALIX foliis glabris, ovato lanceolatis, petiolis glandulosis, floribus hexastemonibus. *Salix floribus pentandris* LINN. flor. Lapon. t. 8. f. 32. neque ipsa nimis certa civis.
- 1640 SALIX monostemon, foliis glabris, linearis lanceolatis, ferratis, superne conjugatis, julis tomentosis. *Salix monandra* ARDUIN. mem. p. 67. in aggeribus torrentum, pratis &c.
- 1641 SALIX foliis praelongis, obscure dentatis, subtus tomentosis & albicantibus. *Salix foliis angustis & longissimis crassis subtus albicantibus* I. B. I. P. II. p. 212. ad sepes.
- 1642 SALIX foliis integerrimis, ovato lanceolatis, subtus sericeis, julis tomentosis. *Salix pumila foliis utrinque candidantibus & tomentosis* GMB. LIN. p. 164. t. 36. f. 1. alpina.
- 1643 SALIX foliis crassis, elliptico lanceolatis, integrimis, utrinque sericeis +. alpina saxa.
- 1644 SALIX procumbens, foliis lanceolatis, subtus sericeis. *Salix humilis repens* I. B. I. P. II. p. 209. in glareis fluviorum.
- 1645 SALIX foliis ovato lanceolatis, venosis, ferratis, julis tomentosis. *Salix foliis ferratis glabris ovatis* LINN. flor. Lapon. t. 7. f. 6. alpes editiores.
- 1646 SALIX foliis ovato lanceolatis glabris, obscure ferratis, venosis. *Salix pumila folio utrinque glabro* I. B. ib. p. 217. inter SCHEUCHZERIANAS.

- 1647 SALIX foliis ovato lanceolatis, tenuis, serratis, stipulis lanceolatis. *Salix foliis serratis glabris obvatis LINN. flor. Lapon. t. 8. E. c. alpinæ valles.*
- 1648 SALIX foliis glaeris ovatis, nitentibus, julis paucifloris. *Salix alpina pumila repens, retuso serpyli folio lucido BOCCONE mus. di piant. p. 18. t. 1. alpium & summorum montium.*
- 1649 SALIX foliis orbiculatis, serratis, g'abris, julis paucifloris. *Salix alpina minima lucida repens, alni rotundo folio BOCCONE ib. p. 29. t. 1. alpina edita.*
- 1650 SALIX foliis rotundis, integerrimis, subitus tomentosis, julis gracilibus longe petiolatis. *Salix pumila folio rotundo I. B. I. P. II. p. 217. ZANON. t. 117. alpina & montana.*
- 1651 SALIX foliis integerrimis, ovato lanceolatis, subitus sericeis, foliis ovatis. *Salix latifolia rotunda RAJ. Syn. III. p. 449. &*  
*B. Salix foliis utrinque serratis subrotundis acutis LINN. flor. Lapon. t. 8. f. 1. t. 7. f. 7. in dumetis & ad sepes.*
- 1652 SALIX foliis rugosis, reticulatis, integerrimis, inferne tomentosis, julis ovatis. *Salix caprea pumila RAJ. Syn. III. p. 450. iisdem locis.*
- 1653 SALIX foliis ovatis, rugosis, subitus reticulatis, tomentosis, julis ovatis, stipulis amplexicaulibus serratis. *Salix caprea latifolia TABERN. p. 1038. in dumetis & ad sepes.*
- 1654 SALIX foliis glabris, ovatis, serratis, stipulis latissimis. *Salix latifolia non hirsuta I. B. I. P. II. p. 216. ad sepes.*
- 1655 SALIX foliis ovato lanceolatis serratis, subitus albitissimis. *in Rhodani insulis, & subalpinis.*

## VII. CONIFERÆ.

- 1657 PINUS foliis solitariis tetragonis mucronatis. *Picea MATTHIOL. p. 97. sylvas facit montanas.*
- 1658 PINUS foliis solitariis, planis, pectinatis, emarginatis. *Abies MATTHIOL. p. 102. inter prioris sylvas.*

- 1659 PINUS foliis fasciculatis, deciduis. *Larix CA-*  
*MER. epit. p. 46. in pratis subalpinis.*
- 1660 PINUS foliis quinis triquetris. *Pinaster MICHELI*  
*now. gen. p. 223. t. 15.*
- 1661 PINUS foliis binis, convexo concavis, julis mas-  
 culis solitariis alaribus. *Pinus sylvestris montana*  
*CAMER. epit. p. 46. in arenosis.*
- β. *Pinus sylvestris* Mugho EJUSD. p. 41.
- 1662 JUNIPERUS foliis convexo concavis, aristatis,  
 baccis alaris. *Juniperus CAMER. epit. p. 13.*  
 in sterilibus.
- 1663 JUNIPERUS foliis cauli adpresso lanceolatis,  
 alterne conjugatis. *Sabina CAMER. epit. p. 55.*  
 alpium altiorum, etiam vallis Tellinæ.
- 1664 TAXUS baccifera. *Taxus CAMER. epit. p. 840.*  
 passim in montosis.
- 1665 EPHEDRA petiolis masculis, repetito ramosis.  
*Polygonum IIII. Plinii majus CLUS. hisp. p. 187.*  
 & minus EJUSD. p. 189. in Valesia inferioris col-  
 libus.

## XIV. CAULIFOLIÆ.

- 1675 EQUISETUM caule florigeru nudo, sterili verti-  
 cillato, radiorum quadraginta. *Equisetum I. CA-*  
*MER. epit. p. 770. B. in aquosis.*
- 1676 EQUISETUM caule florigeru nudo, sterili verti-  
 cillato, radiorum duodecim. *Hippuris minor*  
*cum flore DODON. pent. p. 73. in aquosis agris.*
- 1677 EQUISETUM caule sulcato, ramis multifloris,  
 foliis indivisis. *Equisetum minus, palustre po-*  
*lystachyon C. B. theatr. p. 245. in aquosis.*
- β. *Equisetum palustre majus* TABERN. p. 252. in  
 fossis.
- 1678 EQUISETUM caule sulcato, subnudo, vaginis  
 aristatis. *Equisetum minus, nudum. variegatum,*  
*Rasileense C. B. prodr. p. 24. in arenosis fluvio-*  
*rum & lacuum litoribus.*
- 1679 EQUISETUM caule subnudo, asperimo, vaginis  
 caulinis indivisis, ramis foliatis. *Equisetum nu-*  
*dum RAJ. Syn. III. p. 131. Michelfeldæ, Genevæ.*

154. XIV. CAULIFOLIÆ.

- 1680 EQUISETUM foliis repetito ramosis, vaginis levissimis. *Equisetum sylvaticum* TABERN. p. 253. in montanis & subalpinis.
- 1681 CHARA caule levi fragili. *Equisetum fætidum sub aquis repens* C. B. prodr. p. 25. in fossis.
- 1682 CHARA caule fragili, spinoso. *Chara major, caulinis spinosis* VAILLANT. p. 18. t. 3. f. 3. perinde.
- 1683 CHARA caule subtomentoso fragili. *Chara major subcinerea fragilis* VAILL. p. 18. ibidem, si vera.
- 1684 CHARA caule levi pellucido flexili. *Chara translucens major flexilis* VAILLANT, p. 18. f. 8. Basileæ.

XV. EPIPHYLLOSPERMÆ.

- 1685 OPHIOGLOSSUM folio unico, ovato lanceolato obtuso. *Ophioglossum CAMER. epit.* p. 364. in pratis subudis.
- 1686 OSMUNDA foliis pinnatis, flabelliformibus, lunatis. *Επιμηδίον* COL. phytob. p. 61. *Lunaria minor* CAMER. epit. p. 643. in asperis tenui gramine vestitis.
- 1687 STRUTHIOPTERIS. *Affenon sylvestre*, TRAG. p. 550. in sylvis Bernensibus montanis & subalpinis.
- 1688 FILIX foliis triplicato pinnatis, pinnis nervosis integerrimis, ultimis lanceolatis. *Filix femina* MATTHIOL. p. 291. in sylvis.
- 1689 FILIX foliis duplicato pinnatis, sterilibus obtusis dentatis, floralibus ovatis integerrimis. *Adiantum album tenuifolium ruta murariae accedens* I. B. III. p. 433. alpina.
- 1690 ASPLENIUM caule pinnato, pinnis imis trifoliatis, superioribus simplicibus, dentatis †. *Adiantum novum germanicum ruta murariae facie*, BREYNE Centur. I. ic. 97. in alpinis, infrequens.
- 1691 ASPLENIUM fronde laxa ramosa, ramis secundis trifoliis, superioribus semitrilobis rhomboideis, circumferratis. *Paronychia CANER. epit.* p. 785. ad muros.

- 1692 ASPLENIUM foliis triangularibus, pinnis pinnatis, pinnulis semipinnatis, lobulis ovatis, ferratis. *Onopteris major* TABERN. p. 796. ad muros non vulgo.
- 1693 ASPLENIUM foliis pinnatis, pinnis ovatis, crenatis. *Trichomanes* FUCHS p. 796. ad muros & rupes.
- β. *Trichomanes ramosum* I. B. III. p. 755.
- 1694 ASPLENIUM foliis pinnatis, pinnis in basi dilatatis, obtusis, subtus mucosis. *Asplenium CAMBRE* epít. p. 640. in muris Helvetiae calidioris & subalpinæ.
- 1695 ASPLENIUM petiolis hisutis, folio longe linearie lanceolato, integerim, postice cordato. *Phyllitis MATTHIOL.* epít. p. 579. submontana & subalpina.
- 1696 POLYPODIUM foliis pinnatis, lanceolatis, radice squamata LINN. *Polypodium* MATTH. p. 1292 ad rupes & arbores.
- 1697 POLYPODIUM pinnis pinnatis, pinnulis ovatis integerimis. *Filix minor non ramosa* I. B. III. p. 149. in uidis.
- 1698 POLYPODIUM foliis pinnatis, reflexis, pinnis ovatis, hirsutis, primis cum nervo confluentibus. *Filix non ramosa minor* ♂ *sylvestris* Letr. à un Medecin p. 50. ad rupes subalpinas & submontanas.
- 1699 POLYPODIUM pinnis pinnatis, conjugatis, pinnulis ovatis, obtusis, crenatis. *Filix petrea montana* III. TABERNÆM. p. 799. in montanis & subalpinis.
- 1700 POLYPODIUM pinnulis pinnatis, subtus hirsutis, obtusis. *Filix montana latiore folio* PLUKNET. p. 190. t. 180. f. 6. similibus locis.
- 1701 POLYPODIUM pinnis pinnatis, obtusis, dentatis. *Filix mas* FUCHS p. 594. in sylvis & ad sepes.
- 1702 POLYPODIUM pinnis paucis, semipinnatis, brevissimis, acute ferratis †. Planta non satis certa, alpina.

- 1703 POLYPODIUM pinnis pinnatis, pinnulis ovatis, obtusis, dentatis, dentibus imis bifidis †. *Filix mollis f. glabra vulgari non ramosæ accedens*, VAILLANT. p. 53. t. 9. f. 4. in sylvis.
- 1704 POLYPODIUM pinnis pinnatis, pinnulis lanceolatis, semipinnatis, lobis acute bisectis. *Polyodium &c.* MULLER. Flor. Fridrichsdal. t. 2. f. 2. in sylvis.
- 1705 POLYPODIUM pinnulis pinnatis, lobis semipinnatis, dentatis, aristatis †. *Polypodium &c.* MULLER. ib. f. 4. in alpinis & montanis.
- 1706 POLYPODIUM duriusculum, pinnis laxe pinnatis, pinnulis bidentatis & tridentatis. *Filicula fontana* TABERNÆM. p. 792. Aquilejenses rupes.
- 1707 POLYPODIUM pinnis pinnatis, laxe divisis, pinnulis semipinnatis, lobulis subrotundis dentatis. *Filix saxatilis regia fumariæ pinnulis* VAILLANT t. 9. f. 1. in muris & rupibus.
- 1708 POLYPODIUM pinnis pinnatis, laxe divisis, pinnulis semipinnatis, acutis. *Filix pumila saxatilis altera* PLUKNET. p. 159. t. 179. f. 1. rupes montanæ & subalpinæ.
- 1709 POLYPODIUM pinnis pinnarum pinnatis, laxissime divisis, lobulis obtusis dentatis. *Felice crespo saxatile* PON. Bald. Ital. p. 224. alpina.
- 1710 POLYPODIUM triplicato pinnatum, pinnulis tertiiis semipinnatis, lobulis bifidis. *Filix Rhætica tenuissime divisa*, I. B. III. p. 740. alpina & montana.
- 1711 POLYPODIUM foliis pinnatis, pinnis ciliatis, dentatis, appendiculatis. *Lonchitis aspera major* CAMER. epit. p. 664. alpina & montana.
- 1712 POLYPODIUM pinnis pinnatis, ciliatis, ferratis, appendiculatis. *Filix aculeata Lonchitidi adfinis* PLUKNER. t. 180. f. 3. & *Filix mas pinnis articulatis spinosis* t. 179. f. 6. & *Filix mas aculeata, nostras, alis expansis muscosa lanugine tectis* t. 180. f. 1. montana alpina & palustris.
- 1713 ADIANTUM petiolis ramosif., foliis flabelliformibus lobatis. *Adiantum* CAMER. epit. p. 924. in puteis & lapidosis transalpinis.

- 1714 ACROSTICHUM caule bis bifurcato. *Holosteum petraeum* TABERN. p. 736. in rupestribus.
- 1715 ACROSTICHUM pinnis subtus pinnatis, squamosis, obtusis, basi urninge appendiculata. *Lonchitis aspera Maranta* CAMBR. epit. p. 666. circa Ardenne vallis Tellinæ.

## XVI. MUSCI.

- 1716 LYCOPODIUM spica sessili, foliis lateralibus lanceolatis, confertis. *Selago vulgaris abietis rubrae facie* DILLRN. *sylv. musc.* p. 435. t. 36. f. 1. sylvae alpinæ & montanæ.
- 1717 LYCOPODIUM foliis sessilibus, foliis ovato lanceolatis, ferratis, confertis t. 45. f. 1. *Selaginoides foliis spinosis* DILL. *sylv.* p. 460. t. 68.
- 1718 LYCOPODIUM caule piano, foliis superne quaternis, inferne binis, spicis obscure petiolatis. *Lycopodioides imbricatum repens* DILL. p. 762. t. 66. f. 1. & *Lycopodioides denticulatum, pulchrum, repens, spicis pediculis insidentibus* EJ. p. 465. t. 64. f. 3. in alpinis & aquilejensibus.
- 1719 LYCOPODIUM spicis sessilibus, foliis lanceolatis adpressis, utrinque ternatis. *Lycopodium caule repente clavis tetragonis*, LINN. *flor. Lappon.* n. 417. t. 11. f. 6. *alpina*.
- 1720 LYCOPODIUM ramis prolixis, spicis sessilibus, foliis linearibus, subserratis. *Muscus clavatus, Juniperinis foliis reflexis, clavis singularibus fine pediculis* DILL. *hist. musc.* p. 455. t. 67. f. 9. *Ericeta torfacea*.
- 1721 LYCOPODIUM spicis sessilibus, foliis linearibus, confertissimis, incurvis. *Lycopodium palustre repens clava singulari* VAILLANT. t. 16. f. 4. DILL. t. 62. f. 7. *montana*, circa Ferrière.
- 1722 LYCOPODIUM ramis prolixis, spicis petiolatis gemellis, foliis linearibus pilo aristatis. *Lycopodium* TABERN. p. 814. in sylvis abiegnis.
- 1723 LYCOPODIUM spicis petiolatis, quaternis, caulinibus complanatis, foliis adpressis. *Sabina sylvestris* TRAG. p. 554. circa Morbinium vallis Tellinæ.

- 1724 SPHAGNUM cauliferum ramis teretibus pendulis.  
*Muscus palustris in ericetis nascens* VAILLANT.  
 p. 138. t. 23. f. 3. in torfaceis.  
*B. Sphagnum palustre molle deflexum squamis capillaceis* DILL. t. 32. f. 2.
- 1725 SPHAGNUM sessile, foliis radialibus obtusis,  
 centralibus ciliatis t. 45. f. 3. in aggeribus  
 viarum Bernæ.
- 1726 SPHAGNUM acaulon, foliis ovato lanceolatis,  
 pilo aristatis. *Muscus trichoides acaulos minor latifolius* VAILLANT. t. 27. f. 2. ad vias.
- 1727 SPHAGNUM acaulon trichoides DILLEN. *sylv.*  
 p. 251. t. 32. f. 10. in agris & ad vias.
- 1728 BUXBAUMIA aphylla. *Muscus capillaceus aphyllos capitulo brevi bivalvi* BUXBAUM. Centur. II.  
 p. 8. t. 4. f. 2. prope villam Drakau.
- 1729 HYPNUM foliis hispidis, ovato lanceolatis, aristatis. *Muscus squamosus major s. vulgaris*, VAILLANT. t. 28. f. 9. in pratis & sylvis.
- 1730 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, patulis, striatis, breviter aristatis, operculis conicis. *Hypnum dentatum vulgatissimum operculis obtusis* DILL. *sylv.* p. 295. f. 29. similibus locis.
- 1731 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, acutissimis, operculis aristatis †. *Hypnum vulgatius dentatum operculis cuspidatis* DILLEN. p. 297. t. 38. f. 30. vulgo.
- 1732 HYPNUM foliis patulis, subulatis, operculis conicis †. *Muscus terrestris minor foliis crispis*, BUXBAUM. Cent. IV. t. 63. f. 3. ad vias & in sylvis.
- 1733 HYPNUM foliis cincinnatis, patulis, reflexis. *Muscus erectus foliis reflexis* VAILL. t. 27. f. 5.
- 1734 HYPNUM caulinibus prostratis, foliis lanceolatis reflexis, operculo conico *Emend.* III. n. 33. † subalpina.
- 1735 HYPNUM caulinibus teretibus, foliis cincinnatis, heteromallis. *Hypnum lutescens crispum Polypodii facie* DILL. *sylv.* t. 37. f. 26.
- 1736 HYPNUM caule erecto, foliis falcatis, pilo aristatis, operculis conicis. *Hypnum palustre repens summi-*

*summitatibus aduncis* DILLEN. *sylv.* t. 37. f. 36.  
in pratis uidis.

- 1737 HYPNUM caule compresso, foliis imbricatis, falcatis, pilo aristatis. *Muscus squamosus ramosus minor & crispus* VAILLANT. t. 27. f. 13. ubique ad arborum radices.
- 1738 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, falcatis, capsulis ovatis. *Hypnum heterophyllum aquaticum polyccephalon repens* DILL. t. 37. f. 27. in aquosis.
- 1739 HYPNUM foliis lanceolatis, crispis, capsulis erectis, operculo conico. *Muscus montanus gracilis ramosus, viticulis longioribus glabris* DILL. t. 39. f. 43. ad arbores & saxa.
- 1740 HYPNUM ramis teretibus, foliis ovato lanceolatis, pilo aristatis, capsulis ovatis pendulis, operculis aristatis. *Hypnum dentatum curtipedulum, ramis tenacibus* DILLEN. t. 43. n. 69. in montanis sylvis.
- 1741 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, ramis teretibus, supremis conicis, acuminatis. *Muscus squamosus palustris, foliis flagellisque rigidiusculis incurvis*, VAILLANT. t. 28. f. 11. in fossis & palustribus.
- 1742 HYPNUM ramis teretibus, foliis ovato lanceolatis, setis prælongis, capsulis crassis, operculis conicis †. *Muscus erectus foliis angustis caulis appressis* VAILL. t. 29. f. 10.
- 1743 HYPNUM ramis teretibus, foliis evato lanceolatis, setis prælongis, capsulis inclinatis, aristatis. *Muscus squamosus cupressiformis* VAILL. t. 28. f. 3. similibus locis.
- 1744 HYPNUM ramis teretibus, foliis ovato lanceolatis ramis teretibus. *Muscus terrestris sicculis Kali aut illecebræ annulis foliis subrotundis squamatim incumbentibus* VAILL. t. 25. f. 7. in sylvis.
- 1745 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, ramis teretibus compressis. *Hypnum myosuroides, crassius, capsulis erectis* DILLEN. t. 41. f. 50. ad arborum cortices.
- 1746 HYPNUM ramis teretibus, foliis ovato lanceolatis, pilo terminatis, setis caulinis brevibus.

*Hypnum*

- Hypnum aquaticum* foliis & teretibus & pinnatis  
DILLEN. t. 40. f. 44.
- 1747 HYPNUM caule nudo, inclinato, ramis teretibus  
centeris, capsulis acutis aristatis. *Muscus erec-*  
*trus major* foliis *augustioribus* acutis VAILLANT,  
t. 23. f. 2.
- 1748 HYPNUM caule nudo, confertim ramoso, ramis  
inclinatis, capsulis aristatis. *Muscus dendroides*  
*elatior* radice repente VAILL. t. 23. f. 5. ad rivum  
Glasbach.
- 1749 HYPNUM caulibus teretibus ramosis, foliis appre-  
ssis, pilo aristatis, operculis conicis. *Muscus ar-*  
*boreus splendens myosuroides* VAILL. t. 27. f. 12.  
ad arborum cortices.
- 1750 HYPNUM ramis teretibus, foliis pilo præpilatis,  
capsulis cylindricis erectis aristatis. *Muscus ar-*  
*boreus splendens sericeus* VAILL. t. 27. f. 3. ad  
arbórum radices & faxa.
- 1751 HYPNUM ramis brevibus, teretibus, foliis pilo  
præpilatis, caesiis erectis, aristatis. *Hypnum*  
*trichoides capitulis oblongis in setis brevissimis*,  
DILLEN. t. 42. n. 65. montana.
- 1752 HYPNUM ramis teretibus, foliis pilo præpilatis,  
capitulis ovatis, mucronatis, inclinatis. *Muscus*  
*myosuroides ramosus minor* capitulis incurvis,  
VAILLANT. t. 27. f. 6. submontana.
- 1753 HYPNUM caulibus teretibus, foliis pilo præpi-  
latis, capsulis oblongis aristatis †. *Hypnum se-*  
*riatum, surculis redditoribus & longioribus, cap-*  
*sulis incurvis* DILLEN. t. 42. f. 60.
- 1754 HYPNUM ramis teretibus, foliis pilo præpilatis,  
capsulis ovatis inclinatis, mucronatis. *Muscus*  
*squamulos ramosus tenuior capitulis incurvis*,  
VAILLANT. t. 26. f. 9. ad radicēs arborum.
- 1755 HYPNUM foliis perangustis, pilo terminatis,  
capsulis inclinatis, breviter aristatis †. *Muscus*  
*trichoides terrestre minimus*, capitulis recurvis,  
HIST. OXON. III. t. 6. f. 16.
- 1756 HYPNUM caulibus prostratis, foliis minimis, pi-  
lo terminatis, capsulis cylindricis erectis, mucro-  
natis. *Hypnum terrestre serpens* setis & capsulis  
longis

- longis erectis* DILLEN. t. 42. f. 64. ad arborum  
corticem, asperes &c.
- 1757 HYPNUM minimum, foliis ovato lanceolatis,  
capsulis erectis, operculis conicis †. subalpinum.
- 1758 HYPNUM foliis distichis, lanceolatis, pilo ter-  
minatis, capulis ovatis, inclinatis, aristatis.  
*Muscus filicinus minor* VAILLANT. t. 23. f. 9.
- 1759 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, pilo termina-  
tis, rarissimis, setis de medio caule erectis †.  
montana.
- 1760 HYPNUM caulis fluitantibus prælongis, foliis  
lanceolatis, capsulis inclinatis †. *Hypnum flu-  
tans, foliis tenuissimis, capsulis exilibus* DILLEN.  
t. 83. f. 7. alpinum,
- 1761 HYPNUM caule fluitante prælongo, foliis raris,  
lanceolatis, adscendentibus †. *Muscus fluitans*  
foliis & flagellis longis tenuibusque VAILLANT.  
t. 33. f. 6. in montanis aquosis.
- 1762 HYPNUM ramis duris, teretibus, foliis appressis,  
ovato lanceolatis, pilo aristatis. *Hypnum lute-  
cens ramis subulatis teretibus* DILLEN. t. 35. f. 12.  
sylvæ montanæ.
- 1763 HYPNUM caulis teretibus, clavatis & filescen-  
tibus †. *aquilejensis* montana,
- 1764 HYPNUM ramis teretibus, pinnatis, pinnulis pin-  
natis, foliis adpressis. *Muscus filicinus minor*  
VAILLANT. t. 23. f. 9. ad arborum radices.
- 1765 HYPNUM caule subrecto, hexuoso, ramis teret-  
ibus pinnatis, pinnulis pinnatis, operculis aristatis.  
*Muscus filicinus major sericeus* VAILL.  
t. 29. f. 1. sylvæ abiegnæ.
- 1766 HYPNUM caulis pinnatis, pinnis distantibus,  
alterne longioribus, ex apice confertis, foliis cincin-  
natis. *Hypnum repens filicinum crispum* DIL-  
LEN. t. 36. f. 13. in paludosis.
- 1767 HYPNUM ramis pinnatis, pinnis ramosis, foliis  
cincinnatis. *Muscus terrestris repens subflavus &c.*  
VAILLANT. t. 27. f. 14. alpinum.
- 1768 HYPNUM foliis pinnatis, pinnis simplicibus;  
æqualibus, foliis cincinnatis. *Hypnum filicinum*  
*cristatum*

- criftam caſtrenſem repræſentans DILLEN. t. 36.  
f. 20. in ſylvis.
- 1769 HYPNUM caule plano, foliis diſtichis, ovatis,  
transverſim undulatis, operculis ariftatis t. 45. f. 5.  
*Hypnum pennatum* & *undulatum crispum*. ſetis  
& capsulis brevibus DILLEN. t. 36. f. 12. in mon-  
toſis.
- 1770 HYPNUM caule plano, foliis diſtichis, obiter  
rugofis, nitidis, operculo conico. *Hypnum pen-  
natum* & *undulatum Lycopodii instar Sparsum*  
DILLEN. t. 36. f. 11. in ſubalpinis Aquilejeniſibus.
- 1771 HYPNUM caule diſticho, foſiis ovatis, planis,  
capsulis ovatis, ariftatis. *Mucus trichomanoi-  
des filicifolius splendens* VAILLANT. t. 23. f. 4.  
ad arborum corticem.
- 1772 HYPNUM foliis laxis, pinnatis, ovato lanceo-  
taſis, ariftatis, retroverſis. *Mucus pennatus den-  
ticulatus minor* VAILLANT. t. 29. f. 8. in cavis  
montium ſemitis.
- 1773 HYPNUM denticulatum, pinnatum, pinnis sim-  
plicibus rectoribus DILLEN. t. 34. f. 6. ad vias  
montanas.
- 1774 HYPNUM foliis planis, pinnaram paribus quadra-  
ginta. *Mucus taxiformis ramosus* VAILLANT.  
t. 28. f. 5. in ſubalpinis Aquilejeniſibus.
- 1775 HYPNUM foliis planis, pinnarum paribus duo-  
denis, ſetis radicalibus. *Mucus pennatus, ca-  
pitulis Adianthi* VAILLANT. t. 24. f. 11. in ſyl-  
vis &c.
- 1776 HYPNUM foliis planis, pinnarum paribus septem,  
ſetis ex ſummitate. *Mucus polytrichoides exiguis*  
*capitulis in ſummis furculis*, f. foliis ſubrotun-  
dis ereclis VAILLANT. t. 24. f. 13. ad cavas fe-  
mitas.
- 1777 HYPNUM foliis falcatiſ, heteromallis, vaginiſ  
multifloriſ. *Mucus capillaceus major, pedun-  
culo* & *capitulo tenuioribus* VAILLANT. t. 28.  
f. 12. vulgo in ſylviſ.
- 1778 HYPNUM foliis vagiſ, ſubulatiſ, pilo terminatiſ,  
capsulis cylindriſ inclinatiſ, operculiſ ariftatiſ †.  
altiſſimaruſ alpiuſ.

- 1779 HYPNUM foliis lanceolatis, falcatis, setis alaribus, capsulis ovatis inclinatis †. *alpina Aquilejensia*, etiam Basileæ.
- 1780 HYPNUM ramis alterne brevioribus, foliis pilosis, petiolis brevibus flexuosis t. 45. f. 4. *Bryum hypnoides polycephalon lanuginosum montanum* DILLEN. t. 47. f. 32. montana & subalpina.
- 1781 HYPNUM caulinis teretibus, foliis imbricatis, lanceolatis, capsulis erectis, ovatis, aristatis. *Muscus aquaticus pileis acutis* VAILLANT. t. 27. f. 16.
- 1782 HYPNUM caulinis teretibus, foliis pilo aristatis, setis brevissimis †. *Bryum hypnoides setis* & *capsulis exiguis* DILLEN. t. 47. f. 29. ad saxa alpina.
- 1783 HYPNUM caulinis teretibus, foliis mucronatis, capsulis ventricosis †. *Muscus squamosus ramosus tenuior, capitulis incurvis* VAILL. t. 26. f. 7. alpina & subalpina.
- 1784 HYPNUM ramis compressis, foliis pilo aristatis, nitentibus, capsulis erectis, operculis conicis †. *Hypnum palustre erectum, trichoides, ramulis crebris luteo* & *rufovirentibus glabris* DILLEN. t. 39. f. 37. alpina & montana.
- 1785 HYPNUM caulinis erectis, teretibus, foliis imbricatis, fragilibus, capsulis inclinatis, aristatis. *Muscis ericoides erectus, montanus, albidus, fragilis* VAILLANT. t. 26. f. 13. passim Bernæ &c. in torfaceis.
- 1786 HYPNUM foliis capillaceis, congestis, crispacentibus, capsulis ovato cylindricis, brevissime ciliatis. *Bryum cirrhatum* & *stellatum tenuoribus foliis* DILLEN. t. 48. f. 42. subalpina & montana.
- 1787 HYPNUM foliis subulatis, cincinnatis, capsulis cylindricis, longissime ciliatis. *Bryum cirrhatum capsulis* & *setis longioribus* DILLEN. t. 48. f. 40. subalpina & montana.
- 1788 HYPNUM caulinis teretibus, foliis lanceolatis repandis, capsulis erectis, cylindricis, aristatis. *Bryum stellatum nitidum pallidum, capsulis tenuissimis*

- nuiſſimis* DILLEN. t. 48. f. 44. *subalpina & mon-*  
*tana.*
- 1789 HYPNUM caulis erectis, foliis lanceolatis, pilo  
 fluitante terminatis, capsulis erectis, longe roſtrā-  
 tis. *Bryum rurale unguiculatum* ♂ *hirsutum*  
*majus* ♂ *ramosus* DILLEN. t. 45. f. 12. in tectis  
 stramineis.
- 1790 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, aristatis, pa-  
 tulis, capsulis ovatis pendulis. *Muscus capilla-*  
*ceus minimus capitulo nutante, pediculo purpureo*  
 VAILLANT. t. 29. f. 7. ad muros &c.
- 1791 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, aristatis, cap-  
 sulis pendulis ovatis, operculis conicis. *Bryum*  
*foliis latiusculis congestis, capsulis longis nutan-*  
*tibus* DILLEN. t. 50. f. 67. ad muros & rupes.
- 1792 HYPNUM caulis teretibus ramosis, foliis ova-  
 to lanceolatis, pilo aristatis, operculo conico.  
*Muscus saxatilis tortuosus* ♂ *nodosus* VAILL.  
 t. 27. f. 8. ad saxa.
- 1793 HYPNUM caulis ramosis, foliis lanceolatis.  
*hirsutis*, operculis aristatis. *Muscus apocarpus*  
*saxis adnascens, capitulis obscure rubris* VAILL.  
 t. 27. f. 11. perinde ut prior.
- 1794 HYPNUM foliis complicatis, ovato lanceolatis,  
 capsulis in alis petiolatis ovatis. *Muscus squa-*  
*mofus acutissimus, in aqua nascentis* VAILL.  
 t. 32. f. 5. ad saxa riparia fluviorum.
- 1795 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, carinatis, api-  
 cibus capsuliferis †. *Fontinalis triangularis mi-*  
*nor carinata e cymis capsulifera* DILL. t. 23. f. 2.  
 Basileæ.
- 1796 HYPNUM foliis ovato lanceolatis, pilo terminatis,  
 capsulis per alas sessilibus. *Fontinalis squamoſa*  
*tenuis sericea atrovirens* DILLEN. t. 33. f. 3. in  
 torrente *l'Eau froide*.
- 1797 HYPNUM caulis distichis, ramosis, foliis ovatis  
 transversim undosis t. 45. f. 2. *Muscus terrefris*  
*major, foliis compressis, superficie crassis* VAILLANT  
 t. 27. f. 4. prope Bernam, ad quercuum cor-  
 tices.

- 1798 BRYUM setis brevissimis alaribus , calyptis cylindricis villosissimis. *Muscus capillaceus minimus calyptra villosa* VAILLANT. t. 27. f. 9. ad arborum cortices.
- 1799 BRYUM setis brevissimis alaribus , calyptis villosis conicis †. *Muscus capillaceus acaulos minimus calyptra striata* VAILLANT. t. 27. f. 10. ad arborum cortices.
- 1800 BRYUM foliis ferratis , capsulis ovatis , basi turbinatis t. 46. f. 6. *Polytrichum alpinum ramosum capsulis e summitate ellipticis* DILLEN. t. 55. f. 4. in ericetis alpium.
- 1801 BRYUM caule ramoso , ex alis florigerum , foliis ferratis , capsulis cylindricis. *Polytrichum ramosum setis ex alis urnigeris* DILLEN. t. 55. f. 6. vulgo.
- 1802 BRYUM foliis mollibus subulatis , setis brevissimis alaribus , capsulis ovatis †. t. 45. f. 8. *It. Helv. II. t. 1. alpina & montana.*
- 1803 BRYUM foliis subulatis , setis verticalibus , capsulis sphæricis. *Muscus capillaceus mediocris capitulo globosis* VAILLANT. t. 24. f. 9. 12. ad vias inque faxis.
- 1804 BRYUM foliis capillaceis , capsulis cylindricis , operculis aristatis. *Bryum pilosum molle setis intortis* DILLEN. t. 47. f. 33. passim in terra argilosa , montanum & subalpinum.
- 1805 BRYUM caule sessili , foliis capillaribus , capsulis ovato cylindricis , operculo conico †. *Bryum acaulon heteromallum , setis longis pallidis* DILL. t. 49. f. 57. Basileæ.
- 1806 BRYUM caulinibus erectis , foliis capillaribus vagis , capsulis cylindricis , operculo conico t. 46. f. 1. in montosis ubique.
- 1807 BRYUM foliis capillaribus heteromallis , capsulis ovatis , operculis aristatis. *Bryum heteromallum* DILL. t. 47. f. 37. ad raras semitas.
- 1808 BRYUM caulinibus cernuis , foliis capillaribus heteromallis , capsulis curvulis cylindricis , operculis conicis. *Bryum trichoides capsulis rubris cernuis* DILL. t. 50. n. 59. cum priori.

- 1809 BRYUM foliis capillaribus, capsulis ovatis aristatis.  
*Muscus capillaceus omnium minimus, foliis longioribus & angustioribus* VAILLANT. t. 29. f. 5. ad aggeres fossarum.
- 1810 BRYUM foliis capillaribus, caulinulo sessili, capsulis ovatis aristatis. *Bryum trichoides acaulon, palustre, minimum, setis & capsulis brevissimis* DILLEN. t. 49. f. 57. ad rupes humidas.
- 1811 BRYUM caulinulis subnudis, ramosis, foliis subulatis, brevibus, capsulis ovatis. *Bryum palustre aestivum conservae facie* EJ. t. 47. f. 36.
- 1812 BRYUM foliis capillaceis erectis, setis longissimis, capsulis sursum latescentibus, operculo brevissimo. *Bryum trichoides aureum capsulis incurvis obtusis in setis longis* EJ. t. 49. f. 58. in montanis & subalpinis.
- 1813 BRYUM foliis capillaceis, capitulis pyriformibus pendulis t. 46. f. 7. *Bryum trichoides lete virens capsulis cernuis oblongis* EJ. t. 50. f. 60. subalpina.
- 1814 BRYUM foliis lanceolatis, imbricatis, capsulis erectis, cylindricis, aristatis. *Bryum tenue imberbe & pallidum, foliis crebrioribus* EJ. t. 49. f. 46. ad muros & vias.
- 1815 BRYUM foliis subulato lanceolatis, capsula inclinata, operculo conico. Montana.
- 1816 BRYUM foliis lanceolatis, subulatis, capsulis erectis, operculis conicis. *Bryum tenue stellatum setis purpureis* DILL. t. 49. f. 51. ad vias inque silvis.
- 1817 BRYUM foliis lanceolatis, imbricatis, capsulis cylindricis aristatis †. *Bryum tenue & barbatum foliis angustioribus & rarioribus* EJ. t. 48. n. 49. perinde.
- 1818 BRYUM foliis lanceolatis, laxe imbricatis, capsulis cylindricis obliquis, operculis conicis †. *Bryum polytrichoides palustre, setis longioribus rubris sericeis* EJ. t. 49. n. 52. subalpinum.
- 1819 BRYUM foliis lanceolatis, aristatis, stellatis, capsulis ovatis aristatis rectis. in rupibus subalpinis.

- 1820 BRYUM foliis imbricatis, lanceolatis, setis alaribus, capsulis ovatis aristatis. *Bryum montanum hemiheterophyllum*, *capsulis acutis* DILLEN. t. 46. f. 25. montanum.
- 1821 BRYUM caulinis terebibus, capsulis ovatis acuminatis pendulis. *Muscus squamosus argenteus Ericæ folio* VAILLANT t. 26. f. 3. in afferibus.  
*B. Bryum pendulum*, *surculis teretibus viridibus* DILLEN. t. 50. f. 67. subalpina.
- 1822 BRYUM foliis lanceolatis, pilo terminatis, capsulis pendulis, ovatis, aristatis. *Muscus capillaceus densissimus lanuginosus* VAILLANT. t. 29. f. 2. ad muros & faxa.
- 1823 BRYUM foliis lanceolatis, ferratis, capsulis cylindricis inclinatis, aristatis. *Muscus capillaceus minor capitulo longiori falcato* VAILL. t. 26. f. 17. ad vias inque sylvis.
- 1824 BRYUM foliis ovato lanceolatis, aristatis, reflexis, capsulis ovatis, obliquis. *Bryum erectis capitulis brevibus*, *foliis reflexis* DILLEN. t. 46. f. 24. in subalpinis.
- 1825 BRYUM caulinis brevissimis, foliis ovato lanceolatis, patulis, pilo terminatis, operculo aristato. *Muscus muralis omnium vulgatissimus villosus* VAILLANT. t. 24. f. 15. in muris.
- 1826 BRYUM caulinis brevissimo, foliis ovato lanceolatis, patulis, operculis aristatis. *Muscus vulgaris omnium vulgatissimus non villosus* EJ. t. 24. f. 14. t. 25. f. 4.
- 1827 BRYUM caulinis brevissimo, foliis lanceolatis, capsulis & operculis longissimis. *Muscus capillaceus corniculis longissimis recurvis* EJ. t. 25. f. 8. pallid ad terram.
- 1828 BRYUM caule folioso, capsula cylindrica, ciliata, longe aristata †. *Bryum calyptra extincoris figura majus & ramosum* DILLEN, t. 45. f. 9. montana & subalpina.
- 1829 BRYUM caule brevissimo, calyptra cylindrica, longe aristata. *Muscus capillaceus minimus, calyptra longa conoidea nitida* VAILLANT t. 26. f. 1. rupes alpinæ,

- 1830 BRYUM foliis ovato lanceolatis, capsula piriformi, terminata cylindro. *Muscus capillaceus minor capitulis geminatis* VAILLANT. t. 26. f. 4. in torfaceis montanis.
- 1831 BRYUM foliis ovato lanceolatis, capsula piriformi, brevissime papillata †. *Bryum ampullaceum foliis Serpylli pellucidis collo crassore* DILLEN. t. 44. f. 4. terra nigra alpina.
- 1832 BRYUM caule brevissimo, foliis ovato lanceolatis, capsulis erectis, ovatis, operculo brevi. *Muscus capillaceus minimus, capitulis piriformibus turgidis* VAILLANT. t. 29. f. 3. in terra argillosa & in agnis.
- 1833 BRYUM foliis ovato lanceolatis, capsulis erectis, ovatis, aristatis. *Muscus capillaceus omnium minimus* EJ. t. 26. f. 2. in argillosis & cavis viarum oris.
- 1834 BRYUM foliis lanceolatis rarioribus, capsulis ovatis pendulis t. 46. f. 6. *Bryum lanceolatum pellucidum, capsulis rotundis pendulis carneis* DILL. t. 51. f. 69. Bernæ, Basileæ in viis cavis.
- 1835 MINIUM calyptris villosis, foliis ferratis, capsulis quadrangulis, disco insidentibus. *Polytrichum quadrangulare vulgare . . . foliis ferratis* DILLEN. t. 54. f. 1. in sylvis abiegnis.
- 1836 MINIUM calyptris villosis, foliis ferratis, pilo aristatis, capsulis quadrangulis, insidentibus disco †. *Muscus erectus Juniperi folio rigido glauco calyptra longissima* VAILLANT. t. 23. f. 6. ericeta & torfacea.
- 1837 MINIUM acaulon, calyptra villosa, foliis ferratis, capsulis cylindricis erectis. *Polytrichum parvum alios folio serrato capsulis oblongis* DILLEN. t. 55. f. 7. in cavarum semitarum oris.
- 1838 MINIUM acaulon, calyptra villosa, capsula cylindrica, foliis integerimis. *Muscus capillaceus minor calyptra tomentosa* VAILL. t. 26. f. 25. in milibus locis.
- 1839 MINIUM foliis ovato lanceolatis congestis, patulis, setis numerosis, capsulis ovatis, acuminatis, pendulis. *Bryum stellare rosarium majus capsulis* QVATR

- ovatis pendulis DILLEN. t. 52. f. 77. in muris,  
circa scaturigines.
- 1840 MNIUM foliis in summo caule congestis, lanceolatis, ferratis, crispis, capsulis pendulis, aristatis †. montanum.
- 1841 MNIUM foliis ovato lanceolatis, ferratis, confertis, capsulis nutantibus obtusis †. *Muscus palustris*  
*foliis subrotundis* VAILLANT. t. 26. f. 16. similibus locis.
- 1842 MNIUM foliis pinnatis, lanceolatis, ferratis, capsulis nutantibus aristatis t. 46. f. 4. †. etiam similibus locis.
- 1843 MNIUM foliis lanceolatis, aristatis, in vertice congestis, capsulis inclinatis, operculo mammilla-  
ri †. alpinum.
- 1844 MNIUM foliis cordatis, ellipticis, setis aggregatis, capsulis ovatis, obtusis, pendulis. *Muscus roseus*  
*polycephalus*, *Linariæ foliis undulatis* VAILLANT  
t. 24. f. 3. ad vias.
- 1845 MNIUM foliis ovatis integerrimis, capsulis pen-  
dulis, ovatis, aristatis. *Bryum pendulum Serpylli*  
*folio longiori pellucido*, capsulis oblongis cuspidatis DILLEN. t. 53. f. 80. & in primis n. 81. in sylvis, viarum oris.
- 1846 MNIUM foliis lanceolatis, imbricatis, capsulis pendulis, cylindricis, obtusis. *Bryum stellare hor-*  
*num sylvaticum* capsulis magnis nutantibus EJ.  
t. 51. n. 71. in sylvis & rupibus uidis &c.
- 1847 MNIUM caulibus rubiginosis, foliis lanceolatis alternis, capsulis pendulis pyriformibus obtusis †.  
*Bryum lanceolatum bimum setis* & capsulis lon-  
gis pendulis EJ. t. 51. f. 73. alpes udæ.
- 1848 MNIUM foliis ovato lanceolatis, imis patulis, supremis congestis, myosuroideis †. uda alpina.
- 1849 MNIUM caulibus prælongis rubiginosis, foliis o-  
vato lanceolatis, capsulis ovatis pendulis. *Bryum annotinum palustre* capsulis ventricosis pendulis DILLEN. t. 52. f. 72. subalpinum.
- 1850 MNIUM foliis cespitosis, lanceolatis, aristatis, ca-  
psula inclinata, cylindrica, aristata †. *Bryum*  
*stellare*

- stellare rosoum minus, capsulis & setis longioribus*  
DILLEN. t. 52. f. 78.
- 1851 MNIUM caulis teretibus, erectis, ex vertice multifidis. *Bryum palustre, capitulis teretibus stellatis capsulis magnis subrotundis* EJ. t. 42. f. 2. scaturigines alpinæ.
- 1852 MNIUM foliis ovato lanceolatis, conniventibus, capsulis ovatis, reflexis *Bryum bulbiferum aureum calyptra quadrangulari, capsulis piriformibus nutantibus* EJ. t. 52. f. 75. ad muros.
- 1853 MNIUM caule simplicissimo, foliis ovato lanceolatis, seta fungifera foliosa t. 46. f. 8. *Mnium perangustis & brevibus foliis* SCHMIEDEL. ic. t. 3. in dejectis arboribus.
- 1854 MNIUM caule simplici, capitulis rosiferis nudis. *Mnium perangustis brevibus foliis* DILLEN. t. 31. f. 1. M. Mole.
- 1855 MNIUM caulis rubiginosis bipartitis, foliis molibus, lanceolatis, capsulis cylindricis acuminatis. *Muscus capillaris palustris flagellis longioribus bifurcatis* VAILLANT. t. 25. f. 1. in palustribus.
- 1856 MNIUM fluitans, prolixum, petiolis alaribus, sphærulis pulveriferis. *Mnium majus, minus ramosum, capitulis pulverulentis crebrioribus* DILLEN. t. 31. f. 1. in fossis paludosis.
- 1857 BLASIA fronde lobata, lobis subrotundis, nervis setiferis. *Blasia* SCHMIEDEL. in diff. in sylvis Bremgarten circa Bernam.
- 1858 JUNGERMANNIA foliis integerimis, glabris, ovatis, distichis, extremo caule setiferō. *Mnium Trichomanis facie foliis integris* DILLEN. t. 31. f. 5 ad acclivia viarum.
- 1859 JUNGERMANNIA foliis bipartitis, auriculatis, imbricatis, supernis punctiferis. *Lichenastrum auriculatum, pinnis minoribus crenatis* EJ. p. 490 t. 71. f. 18. in sylvis.
- 1860 JUNGERMANNIA foliis rotundis, alterne imbricatis, caule plano, multifidro, setis brevissimis. *Lichenastrum imbricatum majus squamis compressis & planis* EJ. sylv. p. 496. t. 72. f. 26.

- 1861 JUNGERMANNIA foliis amplexicaulibus subrotundis. *Lichenastrum alpinum purpureum*, foliis auritis & cochleariformibus DILLEN. *Sylv.* p. 479. t. 69. f. 1. montana & alpina.
- 1862 JUNGERMANNIA foliis laceris, multidentatis, sessilibus †. alpina.
- 1863 JUNGERMANNIA foliis imbricatis, bicuspидatis, globuligeris †. *Jungermannia bidentata* SCHMIDDEL. f. 14. in humo & ad arbores.
- 1864 JUNGERMANNIA foliis bidentatis, fragiferis. *Mnium Trichomanis facie foliolis bifidis* DILL. p. 237. t. 31. f. 6. in montosis sylvis.
- 1865 JUNGERMANNIA foliis distichis, bicuspидatis, summis ramis globuligeris. *Lichenastrum pinnulis acutissime bifidis minimis* EJUSQ. p. 458. t. 7. f. 13.
- 1866 JUNGERMANNIA caulinis convexis, foliis descendentibus tridentatis †. Non rara in montosis & subalpinis.
- 1867 JUNGERMANNIA foliis planis, lanceolatis, tridentatis †. subalpina.
- 1868 JUNGERMANNIA foliis pinnatis, subrotundis, ferratis, ex apice florifera. *Lichenastrum Asplenii facie, pinnulis majoribus* DIELIN. p. 482. t. 69. f. 2 in sylvis ad terram.  
*C. Hepaticoides Polytrichi facie* VAILLANT. t. 19. f. 7.
- 1869 JUNGERMANNIA foliis pinnatis, subrotundis, ex apice florifera. *Lichenastrum Trichomanis facie ex basi & medio florens* DILLEN. t. 69. f. 2? ad terram.
- 1870 JUNGERMANNIA foliis pinnatis ovatis, ex caule florifera. *Lichenastrum Trichomanis facie polyanthenum breve & repens* EJ. p. 485. t. 70. f. 9. in terra & ligno putrido.
- 1871 JUNGERMANNIA foliis pinnatis ovatis, confertis, ex apice florifera. *Lichenastrum Trichomanis facie minus ab extremitate florens* EJ. p. 486 t. 70. f. 10. ad terram.
- 1872 JUNGERMANNIA foliis imbricatis, lanceolatis, superne planis, alternis, inferne concavis quinquefariis.

- fariis. *Lichenastrum arboris* vitæ facie, foliis minus rotundis DILLEN. p. 505. t. 22. n. 32. & *Lichenastrum arboris* vitæ facie, foliis rotundioribus EJ. p. 502. t. 72. f. 33. ad arbores & rupeſ.
- 1873 JUNGERMANNIA foliis imbricatis, rotundis, superne alternis, convexis, inferne quadrifaziis. *Lichenastrum imbricatum* Tamarisci Narbonensis facie EJ. p. 499. t. 72. f. 31. ad arbores & rupeſ.
- 1874 JUNGERMANNIA foliis imbricatis, alternis, orbiculatis, setis brevissimis. *Lichenastrum imbricatum minimum*, *squamis* convexo concavis EJ. p. 497. t. 72. f. 27. iisdem locis.
- 1875 JUNGERMANNIA foliis amplexicaulibus aristatis. + alpina & montana.
- 1876 JUNGERMANNIA minima durior, foliis auriculatis bicuspidiatis + subalpina.
- 1877 JUNGERMANNIA foliis bifidis, in ramo florifero majoribus. *Jungermannia minor repens*, foliis subrotundis bifidis, *vagina* *floris* cylindracea, MICHELI t. 5. f. 13. vulgo ad terram & arbores.
- 1878 JUNGERMANNIA foliis bifidis, ex medio caule multiflora. *Lichenastrum pinnuliflorum* acutissime bifidis minimum DILLEN. p. 488. t. 70. f. 13. s. in ilibus locis.
- 1879 JUNGERMANNIA minima, ramosa, polyanthos foliis imbricatis trifidis. *Lichenastrum multifidum exiguum*, ad basin florens, per siccitatem imbricatum EJ. p. 494. t. 71. f. 24. in terra & corticibus.
- 1880 JUNGERMANNIA minima, foliis capillariter multifidis. *Lichenastrum trichoides minimum* ab extremitate florens EJ. p. 505. t. 73. f. 37. in cavis semitis.
- 1881 JUNGERMANNIA caule pinnato, foliis crispis, capillariter multifidis. *Lichenastrum filicinum pulebrum villosum* EJ. p. 503. t. 73. f. 35.
- 1882 JUNGERMANNIA caule filiformi, foliis adpressis inconspicuis. *Lichenastrum alpinum Bryi julacei argentei* facie EJ. p. 506. t. 73. f. 38. alpina.

- 1883 JUNGERMANNIA fronde foliacea, obtuse lobata, ex medio florifera. *Lichenastrum capitulis rotundis e foliorum medio egredientibus* DILLEN. p. 508. t. 74. f. 44. ad argilloso stagnorum & rivorum aggeres.
- 1884 JUNGERMANNIA fronde foliosa lacera, ex oris florifera. *Lichenastrum capitulis oblongis, juxta foliorum divisuras enascentibus* EJ. p. 509. t. 74. f. 42. similibus locis.
- 1885 JUNGERMANNIA foliis linearibus dichotomis, inferne florifera. *Lichenastrum tenuisolum furcatum thecis globoſis piloſis* EJ. p. 512. t. 74. f. 45. ad arborum radices.
- 1886 JUNGERMANNIA fronde plana, pinnata, dichotoma, ramulis brevissime bicorribus. *Lichenastrum aquaticum fluitans tenuisolum furcatum* EJ. p. 511. t. 74. f. 47. in stagnis Friedlingenibus.
- 1887 JUNGERMANNIA foliis palmatis digitatis, ex basi florifera. *Lichenastrum exiguum capitulis nigris lucidis e cotylis parvis enascentibus* EJ. p. 513. t. 74. f. 46. paſſim in ligno putrido.
- 1888 MARCHANTIA scyphis lunatis, capitulis quadrifidis. *Lunularia vulgaris* MICHEL. t. 4. f. 4. rario ad terram cavarum semitarum.
- 1889 MARCHANTIA verrucis asperis, capitulis conicis. *Hepatica vulgaris major* &c. MICHEL. p. 3. t. 2. f. 1. ad muros umbrosos.
- 1890 MARCHANTIA fronde crenata, capitulis conicis hirsutis. *Hepatica media capite hemisphaerico*, MICHEL. p. 3. t. 2. f. 2. in subalpinis ad terram.
- 1891 MARCHANTIA linea frondem bipartiente, cyathis scobiferis ferratis, setis umbellatis & stellatis decemfidis. *Marchantia major capitulo stellato* &c. MICHEL. p. 2. t. 1. f. 1. ad rupes & muros uvidos.
- 1892 MARCHANTIA fronde æquabili, cyathis ferratis, bacillis umbellatis & stellatis octifidis. *Lichen domesticus stellatus*, æque ac umbellatus ac cyathophorus DILLEN. p. 527. t. 77. f. 7. similibus locis.

- 1893 ANTHOCÉROS frondibus indivisis, sinuatis, levibus. *Anthoceros major* MICHEL. p. 11. t. 7. f. 1. circa Basileam.
- 1894 ANTHOCÉROS fronde linearis, triplicato pinnata. *Anthoceros folio tenuissimo multifido* DILLEN. p. 477. t. 68. f. 4. Basileæ.
- 1895 RICCIA fronde reticulata, æquabili, lobis bipartitis, & tripartitis, lobulis triangularibus. in aquæ superficie. Michelfeldæ.
- 1896 RICCIA fronde reticulata æquabili, lobis denticulatis, obtusis, simplicibus & cordatis. *Riccia minor latifolia pinguis apergine crystallina perfusa* MICHEL. t. 57. f. 3. inter hydrophacas.
- 1897 RICCIA fronde sulco divisa, lobis bifurcatis, lobulis lanceolatis obtusis. *Hepatica palustris bifurcata*, foliis brevioribus carinatis VAILLANT t. 19. f. 1.
- 1898 HYDROPHACE monorrhiza, foliis pulvinatis, inferne convexissimis. *Lenticula palustris major*, *inferne magis convexa*, *fructu polyphemino* MICHEL. p. 15. t. 11. f. 2. in aquarium stagnantium superficie.
- 1899 HYDROPHACE polyrrhiza, foliis ovatis planis. *Lenticularia major polyyrhiza*, *inferne atropurpurea*. circa Noville in fossis.
- 1900 HYDROPHACE monorrhiza, foliis planis ovatis. *Lenticularia minor monorrhiza*, *foliis utrinque viridibus* MICHEL. p. 16. t. 11. f. 3. vulgarissima.
- 1901 HYDROPHACE caule filiformi, foliis elliptico lanceolatis viviparis. *Lenticularia ramosa monorrhiza*, *foliis oblongis*, *pediculis longioribus*, MICHEL. p. 16. t. 11. f. 5. passim et si non ubique, similibus locis.

## XVII. CRUSTACEÆ.

## f. LICHENES.

## I. CORNICULATI &amp; PYXIDATI.

- 1902 LICHEN corniculus simplicissimus acutis farinosis. *Coralloides*

- Coralloides scyphiforme cornutum* DILLEN. p. 92.  
t. 15. f. 16. varietas I. ad terram & cortices  
purridos vulgo.
- 1903 LICHEN cornubus acutis, farinosis, subramosis.  
*Coralloides vix ramosum scyphis obscuris* DILL.  
p. 90. t. 25. f. 14. & *L. tubulosus nivei fere*  
*candoris, apicibus recurvis, acutis* SCHRUCHZER  
*It. II.* p. 137. alpinus.
- 1904 LICHEN corniculo simplici, maximo, leví. *Li-*  
*chen corniculatus omnium maximus* RAJ. synops.  
p. 68. subalpina.
- 1905 LICHEN corniculo simplici, duro, subaspero †.  
*Lichen tubulosus verrucosus ex obscuro virore flo-*  
*rescens* SCHRUCHZER. *It. II.* p. 136. subalpina.
- 1906 LICHEN corniculo simplici verrucoso †. in syl-  
vis.
- 1907 LICHEN corniculo simplici obtuso. *Coralloides*  
*scyphiforme ossis femoris facie* DILLEN. p. 91. t. 15.  
n. 5. alpinus.
- 1908 LICHEN corniculo simplici, apice depresso scutel-  
lato. *Coralloides scyphis gracilibus tubiformibus*  
*pedicularis folio* DILLEN. p. 85. t. 14. f. 10.
- 1909 LICHEN corniculis acute bifidis, scyphis im-  
perfectis †.
- 1910 LICHEN corniculo subramoso fungifero. *Coral-*  
*loides* 19. var. A. B. DILL.
- 1911 LICHEN corniculo spadiceo, scyphis cylindri-  
cis †.
- 1912 LICHEN scypho infundibuliformi simplici. *Lichen*  
*pyxidatus minor* VAILLANT. t. 25. f. 6. & major  
f. 8. vulgatissimus.
- 1913 LICHEN scyphiger infundibulis verrucosis. *Co-*  
*ralloides* 9. var. DILL.
- 1914 LICHEN scyphiger, verrucis racemosis †. *Lichen*  
*tubulatus albus* &c. MICHEL. p. 83. n. 4.
- 1915 LICHEN scyphiger, infundibulis ferratis.
- 1916 LICHEN scyphiger infundibulis ferratis coronatis.  
*Lichen non ramosus, acetabulis fimbriatis* Mi-  
CHEL. t. 41. f. 5.
- 1917 LICHEN pyxidatus amplissimus. infundibulis in-  
cisis crenatis. †

- 1918 LICHEN scyphiger infundibulorum fungis coccineis. *Coralloides scyphiforme tuberculis coccineis* DILLEN. p. 82. t. 14. f. 7. passim ad arbores putridas, etiam in torfaceis.
- 1919 LICHEN scyphiger infundibulorum fungis fuscis. VAILLANT. t. 21. f. 11.
- 1920 LICHEN pyxidatus maximus, profunde divisus, dentibus dentatis punctatis †.
- 1921 LICHEN scyphiger infundibulis spinosis †.
- 1922 LICHEN cylindricus, fungo fusco terminatus †.
- 1923 LICHEN infundibulis glabris proliferis VAILLANT. t. 21. f. 5. vulgo.
- 1924 LICHEN infundibulis serratis proliferis. *Coralloides scyphiforme gracile marginibus serratis* DILL. t. 14. f. 8. p. 81.
- 1925 LICHEN infundibulis proliferis serratis, foliosis & verrucosis †.
- 1926 LICHEN pyxidatus, extus prolifer †.
- 1927 LICHEN infundibulis proliferis, fungis coccineis. *Coralloides scyphiforme tuberculis coccineis* DILL. p. 82. t. 14. f. 7. in lignis & paludosis.
- 1928 LICHEN infundibulis proliferis, fungulis atrofuscis VAILLANT. t. 21. f. 10.
- 1929 LICHEN infundibulis proliferis, foliosis & fungosis. *Coralloides scyphiforme marginibus radiatis & foliatis* DILL. p. 85. t. 14. f. 9.
- 1930 LICHEN asper, infundibulis gracilibus, corniculis foliosis & verrucosis fungiferis †. montana.
- 1931 LICHEN infundibulis tubiformibus proliferis †.
- 1932 LICHEN infundibulis foliatis punctatis †. MICH. t. 42. f. 3. alpina.
- 1933 LICHEN triplicato prolifer, scyphis angustis foliosis †.
- 1934 LICHEN infundibulis explanatis fungiferis. *Coralloides scyphiforme foliis alicornibus cartilagineos* DILL. p. 87. f. 14. montana.
- 1935 LICHEN fonde semipinnata, rotunde lobata, ex medio scyphigera †. MICHELI t. 42. f. 1.2. subalpina.
- 1936 LICHEN pyxidatus prolifer, multiformis, scyphis foliosis, cylindricis, & spinulosis. †

- 1937 LICHEN infundibulis proliferis palmatis, serratis & punctatis †. *Coralloides cornucopoides inca- num scyphis cristatis* DILLEN. p. 94. t. 15. f. 17.
- 1938 LICHEN pyxidatus difformis, acetabulis cornigeris. *Coralloides crassus*, *subincanum*, *calycibus dentatis* EJ. p. 95. t. 15. f. 18.
- 1939 LICHEN infundibulis palmatis, fungulis coccineis. *Coralloides rambulosum*, *tuberculis coccineis* EJ. p. 95. t. 15. f. 19.
- 1940 LICHEN corniculatus bicornis & tricornis, puncto coccineo terminali †.
- 1941 LICHEN verrucosus, bicornis & tricornis, fungulis fuscis terminatis. *Coralloides parum ramo- sum*, *tuberculis fuscis* DILLEN. p. 97. t. 15. f. 20. in sylvis.
- 1942 LICHEN verrucosus minimus, infundibulis bifidis & trifidis, fungis fuscis terminalibus †.
- 1943 LICHEN asper, infundibulis gracilibus, corniculis ramosis. *Lichen pyxidatus* & *ramosus prolifer e viridi sordide lutescens* MICHEL. p. 80. t. 41. f. 1.
- 1944 LICHEN caulis scyphigeris & corniculatis, corniculis ramosis. *Lichen pyxidatus* & *corniculatus albidus minor* & *gracilior* EJUSD. p. 86. n. 7.
- 1945 LICHEN corniculis erectis ramosis, infundibulis gracilibus. *Lichen pyxidatus* & *corniculatus ci- nereus angustior* & *elatior corniculis longioribus* EJUSD. t. 41. f. 3. & f. 4.
- 1946 LICHEN infundibulis proliferis & corniculatis erectis. *Coralloides scyphiforme*, *serratum elatius caulis* *gracilibus glabris* DILLEN.
- 1947 LICHEN cornutus, scyphis cornigeris & fungosis. †
- 1948 LICHEN spadiceus, caulis foliosis, scyphigeris & corniculatis †.
- 1949 LICHEN pyxidatus serratus, cornubus ramosis subpyxidatis †. *alpinus*.
- 1950 LICHEN pyxidatus & corniculatus spadiceus tu- berculosus †.
- 1951 LICHEN prolifer & corniculatus, corniculis brevissime digitatis, fungiferis †. *Lichen pyxidatus ramosus*, *acetabulis fimbriatis* MICHEL. p. 81. n. 10. & *Lichen* t. 41. n. 7. f. 5. *subalpinus*.

## II. LICHENES CORALLOIDEI.

- 1952 LICHEN fruticosus, vage ramosus, foliosus, extremis ramis palmatis, fungiferis. *Coralloides sparsum*, *caulibus tortuosis* & *spinosis*. DILLEN. p. 101. t. 16. f. 25. *vulgaris*.
- 1953 LICHEN coralloides foliosus & palmatus, ramis confertis, foliosis, bifidis, fungiferis †. *alpinus*.
- 1954 LICHEN caule fruticoso, subfolioso, ramis adscendentibus, repetito bifurcatis, punctiferis. *Coralloides corniculis brevioribus* & *crebrioribus* DILLEN. p. 104. t. 16. f. 22.
- 1955 LICHEN caule fruticoso, erecto, ramis adscendentibus dichotomis. *Coralloides corniculis longioribus* & *rarioribus* EJ. p. 102. t. 16. n. 26. in montanis.
- 1956 LICHEN caule fruticoso, folioso, ramis subnudantibus, minute multifidis, fungiferis. *Coralloides fruticuli specie candidans corniculis rufescens-tibus* EJ. p. 110. t. 16. f. 30.
- 1957 LICHEN fruticosus, farinosus, surculis innumeris nutantibus. *Coralloides montanum*, *fruticuli specie ubique candidans* EJ. p. 107. t. 16. f. 29. in sylvis.
- 1958 LICHEN corniculatus verrucosus, incanus, intus anthracinus, fungis minimis †.
- 1959 LICHEN fruticosus, levis, perforatus, spinosus, ramulis punctiferis. *Coralloides perforatum majus molle* & *craustum* DILLEN. p. 98. t. 16. f. 2. *montana*.
- 1960 LICHEN fruticosus, levis, perforatus. *cauliculis palmatis brevissimis*. *Coralloides perforatum minus* & *tenue* EJ. p. 99. t. 16. f. 22.
- 1961 LICHEN caule fruticoso, compresso, ramosissimo, ramulis punctiferis †. *Lichen coralloides tubulosus alpinus major* &c. MICHEL. p. 80. n. 9. *alpinus*.
- 1962 LICHEN caule fruticoso, ramoso, erecto, densissime cespitoso †. *Coralloides minimum fragile Madreporae instar nascentis* DILLEN. p. 101. t. 16. f. 25. in montosis.

## II. CORALL. III. USNEÆ. 179

- 1963 LICHEN caule fruticoso , fungifero , tecto verrucis calcariis. *Coralloides crispum* ♂ *botryiforme alpinum* DILLEN. p. 114. t. 17. f. 32. alpina edita.
- 1964 LICHEN fruticosus , levis , diffusus , ramosissimus flavus , ramulis liventibus. † alpina edita.
- 1965 LICHEN fruticosus , durus , castaneus , surculis spinosis †. *Coralloides fruticuli specie fuscum spinosum* DILL. p. 112. t. 17. f. 31. alpina.

## III. USNEÆ.

- 1966 LICHEN fruticosus , durus , niger , repetito dichotomus. *Coralloides corniculatum* *fuci tenuioris facie* DILLEN. p. 118. t. 17. f. 37. alpina.
- 1967 LICHEN fruticosus minimus , flexuosus , caulinis nigris capillaceis. *Usnea nigra lana similis , saxis adnascens* EJ. p. 66. t. 12. f. 8. alpina & montana.
- 1968 LICHEN barbatus , pendulus , filamentis nigris prolixis. *Usnea jubata nigricans* DILL. Sy/v. p. 64. t. 12. f. 7. alpinæ & montanæ arbores.
- 1969 LICHEN fruticosus , diffusus , caulis vagis , flexuosis , rigidis , teretibus. *Usnea rigida horsum versum versa* EJ. p. 66. t. 13. f. 10. alpina.
- 1970 LICHEN barbatus trunco articulato levi. *Usnea barbata loris tenuibus fibrosis* EJ. p. 63. t. 16. f. 6. in alpinis fruticibus.
- 1971 LICHEN pendulus , teres , exasperatus , scutellis radiatis. *Usnea vulgaris loris longis implexis* EJ. p. 56. t. 11. f. 1. vulgaris.
- 1972 LICHEN barbatus , ramis teretibus , surculis parallelis simplicibus , scutellis radiatis. *Usnea vulgarissima tenuior* ♂ *brevior cum orbiculis* EJ. p. 69. t. 13. f. 13. vulgarissimus.
- 1973 LICHEN barbatus , teretibus caulinis , ramis simplicibus parallelis. *Usnea vulgarissima tenuior* ♂ *brevior , sine orbiculis* EJ. p. 67. t. 13. f. 12.

## IV. LACUNATE CYPRII.

- 1974 LICHEN ramosus aureus, caulinis planis lacunatis, farinosis, cornutis †. alpinus.
- 1975 LICHEN ramosus, lacunatus, flaccidus. *Unea mollis ramis longis compressis* DILLEBN. p 62. t. 12. f. 1. alpinus & montanus.
- 1976 LICHEN cornubus planiusculis ovatis, superne farinosis, inferne atris & reticulatis. *Lichenoides cornutum amarum*, superne cinereum inferne nigrum EJ. p. 157. t. 21. f. 52. alpina & montana.
- 1977 LICHEN convexo concavus, lacunatus & glaber, ramis crassis subluteis. *Lichenoides lacunosum*, *candidum*, *glabrum*, *endiviae crissae facie* EJ. p. 163. t. 21. f. 56. alpinus & montanus.
- 1978 LICHEN fronde convexa, ciliata, pustulata, obtuse ramosa, utrinque levi, ramis brevissime bicornibus. *Lichenoides rigidum Eryngii folia referens* EJ. p. 209. t. 28. f. 111. alpina & montana.
- 1979 LICHEN fronde convessa, oris plicatis, ramis brevibus, obtuse lobatis †. *Lichenoides Eryngii folia referens*, *tenuioribus* & *crispioribus foliis* EJ. p. 212. t. 28. f. 112. alpina & montana.
- 1980 LICHEN corniculatus, planus, ramulis capillari- bus, scutellis petiolatis. *Lichenoides hispidum majus* & *rigidum scutellis nigris* EJ. p. 150. t. 20. f. 45. ad arborum cortices.
- 1981 LICHEN lacunosus, complanatus, ramis acutissimi- mis, orbiculis farinosis, marginalibus, frequen- tissimis. *Lichenoides segmentis angustioribus*, *ad margines muscosis* & *pulverulentis* EJ. p. 172. t. 22. f. 63. vulgo ad arbores.
- 1982 LICHEN . . . cornua damæ referens argustifolius VAILLANT. t. 20. f. 7. ibid.
- 1983 LICHEN utrinque lacunatus, complanatus, fa- rinosus & scutellifer. *Lichenoides coralliforme rostratum* & *canaliculatum* DIELBN. p. 170. t. 21. f. 62.

- 1984 LICHEN complanatus, utrinque lacunatus, undique farinosus. *Lichenoides cornutum bronchiale molle subtus incanum* DILLEN. p. 160. t. 21. f. 55.
- 1985 LICHEN utrinque lacunatus, fronde latissima, scutellis creberrimis. *Lichenoides longisolum rugosum rigidum* EJ. p. 165. t. 22. f. 9.
- 1986 LICHEN lacunatus, inferne gibbosus, reticulo farinoso, scutellis lateralibus. *Lichenoides pulmonarium reticulatum vulgare marginibus peltiferis* EJ. p. 212. t. 29. f. 113. Omnes ad arborum cortices.
- 1987 LICHEN lacunatus exasperatus, inferne villosus & scutellifer †. *Lichenoides polyschides villosum* ♂ *scabrum peltis parvis* EJ. p. 199. t. 27. f. 101. ad rupes.

### V. ANTILYSSI.

- 1988 LICHEN fronde subrotunde lobata, inferne reticulata, peltis convexo concavis. *Lichenoides cinereum digitatum laetucæ foliis sinuosis* DILLEN p. 200. t. 27. f. 102. ad terram.
- 1989 LICHEN fronde obtuse lobata, inferne scabra, maculæ rotundis varia †. *Lichenoides pulmoneum villosum*, superficie scrobiculata ♂ *peltata* EJ. p. 216. t. 29. f. 114.
- 1990 LICHEN fronde rotunde lobata, inferne villosa, peltis erectis convexo concavis †. *Lichenoides digitatum rufescens foliis laetucæ crissis* EJ. p. 203. t. 27. f. 103.
- 1991 LICHEN fronde rotunde lobata, peltis planissimis. *Lichenoides subfuscum*, peltis horizontalibus planis EJ. p. 205. t. 25. f. 104.
- 1992 LICHEN fronde obtuse lobata, superne verrucosa, inferne villosa. *Lichenoides digitatum*, lete virens, verucis nigris notatum EJ. p. 207. t. 28. f. 106. omnes ad arbores & terram muscosam.
- 1993 LICHEN flabeliformis, subtus reticulatus, scutellis marginalibus planis. *Lichenoides parvum*

- virescens peltis nigricantibus planis, DILLEN.  
p. 208. t. 28. f. 109. ad terram.  
1994 LICHEN fronde rotunde lobata, plana, subtus  
venosa, miniata. *Lichenoides subtus croceum*,  
*peltis adpressis* EJ. p. 221. t. 29. f. 120. alpina  
summa.

## VI. PULMONARII.

- 1995 LICHEN fronde coriacea, rotunde lobata, scutellis  
immersis. *Lichenoides lichenis facie, acetabulis  
immersis* DILLEN. p. 221. t. 30. f. 121. ad  
rupes roridas.  
1996 LICHEN fronde cinerea, inferne lacunata, ar-  
busculis superne nigris. *Lichenoides pustulatum  
cinereum* & *veluti ambustum* DILLEN. p. 226.  
t. 31. f. 131. alpina & montana.  
1997 LICHEN fronde coriacea, inferne pustulata, vil-  
losa, scutellis atris †. *Lichenoides coriaceum, la-*  
*tissimo folio umbilicato* & *verrucoso* DILLEN.  
p. 545. t. 82. f. 5. montana.  
1998 LICHEN fronde rotunde lobata, inferne nigerri-  
ma glebosa. *Lichenoides coriaceum cinereum*,  
*peltis atris compressis* DILLEN. p. 219. t. 30. f. 17.  
1999 LICHEN fronde imbricata, rotunde lobata, cine-  
rea, punctata, inferne ochrea subaspera t. 42.  
f. 2. *Lichenoides coriaceum nebulosum cinereum*  
*punctatum subtus fulvum* DILLEN. p. 223. t. 30.  
f. 127. ad rupes subalpinæ.  
2000 LICHEN fronde imbricata, subrotunda, punctata,  
inferne villosa, atris scutellis t. 47. f. 4. *Liche-*  
*noides puluum superne glabrum inferne nigrum*  
*& cirrhosum* DILLEN. p. 226. t. 30. f. 129. ru-  
pes subalpinæ.  
2001 LICHEN lapideus crispus, coloris utrinque schi-  
stei t. 47. f. 5. alpina & montana.  
2002 LICHEN fronde rotunde lobata virente, inferne  
scabra †. *Lichenoides laete virens, scutellis fulvis*  
DILLEN. t. 25. f. 48. ad terram alpinam.  
2003 LICHEN pulmonarius latifolius, utrinque glaber,  
inferne lignei coloris, scutellis fuscis depresso-  
polline

- polline rubro aurantio adspersus. circa Ragaz.
- 2004 LICHEN fronde rotunde lobata , inferne scabra , arbusculis obscuris †. *Lichenoides subglaucum cumatile , foliis tenacibus eleganter laciniatis ,* DILLEN. p. 197. t. 26. f. 99. ad terram.
- 2005 LICHEN fronde rotunde lobata , rugosa , inferne atra & aspera. *Lichenoides caperatum rosacee expansum e sulfureo virens* DILLEN. p. 193. t. 25. f. 97.
- 2006 LICHEN viridis concolor , scutellis planis serratis †. ad arbores.
- 2007 LICHEN fronde laciniata & crispa , inferne atra & aspera. *Lichenoides endiviae foliis crissis splendentibus subtus nigranticibus* DILL. p. 192. t. 25. f. 96. perinde.
- 2008 LICHEN fronde rotunde lobata , glauca , polline concolore scabra , subtus hirta & atra †. MICHELI t. 45. f. 1.
- 2009 LICHEN cartilagineus , scutellis congestis cervinis , fronde brevi , rotunde lobata †. *Lichenoides cartilagineum scutellis fulvis planis ,* DILLEN. p. 179. t. 24. f. 74. ad alpinam humum.
- 2010 LICHEN foliis angulosis imbricatis calcariis spadiceis t. 47. f. 1. *Lichen pulmonarius terrestris clypeatus minimus* & indivisus virescens , MICHELI. n. 36. f. 3. subalpinus.
- 2011 LICHEN subviridis , fronde semipinnata , rotunde lobata , lineis pulverulentis reticulata , inferne scabra , carbonaria. *Lichenoides vulgarissimum cinereo glaucum , lacunatum* & *cirratosum* DILL. p. 188. t. 24. f. 83. ad arbores.
- 2012 LICHEN crispus , convolutus , fronde olivacea , scrobiculosa , marginibus polliniferis. †
- 2013 LICHEN fronde semipinnata , rotunde lobata , olivacea , scutellis levibus †. *Lichenoides olivaceum scutellis levibus* DILLEN. p. 77. t. 24. f. 77.
- 2014 LICHEN fronde semipinnata , rotunde lobata , olivacea , palla , scutellis crenatis. *Lichenoides olivaceum scutellis amplioribus verrucosis* DILL. p. 84. t. 24. f. 78. ad arbores uterque.

- 2015 LICHEN fronde semipinnata, rotunde lobata, crasse villosa, scutellis peramplis. *Lichenoides imbricatum viridans*, *scutellis badiis* DILLEN. p. 180. t. 24. f. 75. ad arbores & faxa.
- 2016 LICHEN fronde semipinnata, rotunde lobata, cinerea, scutellis nigris. *Lichenoides glaucum orbiculare*, *segmentis latiusculis*, *scutellis nigris* DILL. p. 177. t. 24. f. 71. perinde.
- 2017 LICHEN fronde semipinnata, cinerea, obtuse lobata, scutellis glaucis nigrescentibus. *Lichenoides cinereum segmentis argutis stellatis*, *scutellis nigris* DILLEN. p. 176. t. 24. f. 70. ibidem.
- 2018 LICHEN fronde semipinnata, cava, cornubus pulverulentis. *Lichenoides ceratophyllum obtusum* & *minus ramosum* DILLEN. p. 154. t. 20. f. 49. itidem vulgo.
- 2019 LICHEN fronde semipinnata, canaliculata, cinerea †. *Lichenoides hispidum minus* & *tenuius* *scutellis nigris* DILLEN. p. 152. t. 20. f. 46. & L. 48. EJ. p. 154. ad cortices arborum.
- 2020 LICHEN fronde laciniata, undique nigerrima, scutellis concoloribus. *Lichenoides tinctorium atrum foliis minimis crassis* DILLEN. p. 188. t. 24. f. 81. alpinus & montanus.

## VII. PSORÆ.

- 2021 LICHEN fronde rugosa, rotunde lobata, flava, concolore. *Lichen Dioscoriæ* & *Plinii secundus* colore flavescente COLUMN. epibras. I. p. 330. 331. ad muros & arbores.
- 2022 LICHEN fronde calcaria, pulposa, miniata, laciniata, lobis linearibus †. *Lichenoides tenuissimum*, *scutellis exiguis miniatis* DILLEN. p. 175. f. 68. in rupibus alpinis & montanis.
- 2023 LICHEN fronde laciniata, rotunde lobata, flava, concolore. *Lichenoides crustosum*, *orbiculis* & *scutellis flavis* DILLEN. p. 116. f. 18. ad muros & rupeſ.
- 2024 LICHEN fronde laciniata, adpreſſa, cervina,

- concolore †. *Lichenoides crustosum orbiculare incanum* DILLEN. p. 135. f. 17. ad saxa & arbores.
- 2025 LICHEN fronde viridi, verrucosa, obscure lobata †. ad cortices.
- 2026 LICHEN quisquiliaris, fronde cinerea, scabra, ramis brevibus, acutis, scutellis nigerrimis †. *Lichen terrestris minimus, fruticosus cincereus* MICHEL. p. 78. t. 53, f. 8. Muscis innat. *Muscis innat.*
- 2027 LICHEN friabilis, obtuse lobatus, luteus, scutellis fuscis †. ad terram glareosam.
- 2028 LICHEN foliis pulposis, calcariis, glauco polline villosis, scutellis atris †. ad rupes.
- 2029 LICHEN saxatilis, undosus, niveus †. in saxis alpinis.
- 2030 LICHEN undosus purpurascens †. ad cortices.
- 2031 LICHEN foliis pulposis, calcariis, fuscis, imbricatis, scutellis nigris †. *Lichen alpinus glaucus. squamis crassis & brevissimis* ENNEM. t. 47. f. 3, DILLEN. p. 228. t. 30.

### VIII. NOSTOCH.

- 2032 LICHEN atrocæruleus laciniatus & ciliatus. *Lichen terrestris minimus fuscus* VAILLANT. t. 20. f. 15. in sylvis.
- 2033 LICHEN nigerrimus, sessilis, obtuse lobatus †. ad corticem.
- 2034 LICHEN albidus, laciniatus, lobis acutis †. *Tremella terrestris cornuta* DILLEN. p. 52. t. 10. f. 12. in alveo fontis.
- 2035 LICHEN schisteus, crispus, acute laciniatus, scutellis ex fusco rubentibus †. *Lichen saxatilis ex cæruleo nigricans crispus* ENNEM. t. 74. f. 5. in muris & saxis.
- 2036 LICHEN gelatinosus viridis, exasperatus †. *Lichenoides gelatinosum lobis crassioribus fuscoviridis* DILL. p. 158, t. 19. f. 22. montanus.
- 2037 LICHEN gelatinosus, membranaceus, exasperatus, convolutus, atroviridis, scutellis rubris †.

*Lichenoides gelatinosum*, *membranaceum tenuē nigricans* DILL. p. 139. t. 19. f. 20. ad asperes siccios.

- 2038 LICHEN gelatinosus niger, undosus & crispus †.  
*Lichen arboreus membranaceus nigricans* BUX. BAUM. Comm. petrop. T. III. p. 273. t. 14. f. 3. ad terram, locis macilentis.
- 2039 LICHEN gelatinosus, ramosus, laciniatus, scutellis rubris †. *Lichenoides gelatinosum fuscum Jacobae maritimæ divisura* DILLEN. p. 140. t. 19. f. 25. ad terram.
- 2040 LICHEN niger undatus crustaceus †.
- 2041 LICHEN gelatinosus, plicatus, undulatus, laci- niis crispis, granulosis. *Tremella terrestris*, si- nuosa pinguis & fugax DILL. sylv. p. 52. t. 10. f. 11. abunde in glareosis.

## IX. SCUTELLATI CRUSTACEI. HERPETES.

- 2042 LICHEN crusta tenace verrucosa albida fungis in- carnatis. *Coralloides fungiferum candidum basi lignosa* DILLEN. p. 76. t. 14. f. 1. in cavis fe- mitis.
- 2043 LICHEN crusta tenace verrucosa fungis fuscis †. *Coralloides fungiforme fuscum basi foliacea* DILL p. 77. t. 14. f. 2. perinde.
- 2044 LICHEN crusta verrucosa, cinerea, scutellis car- neis planis †. non rarus in putridis arboribus.
- 2045 LICHEN crusta verrucosa, olivacea, scutellis ru- bris ferratis †, in radicibus arborum.
- 2046 LICHEN crusta farinacea, verrucosa, glauca, scu- tellis flavis planissimis †. in vallo urbano.
- 2047 LICHEN crusta farinosa, scutellis sordide rufis planissimis. *Lichen crustaceus*, *farinaceus*, *ar- boribus adnascens*, *verrucosus candidus recepta- culis floribus rufescens* MICHEL. p. 96. n. 2. † ad arbores & rupes.
- 2048 LICHEN verrucosus tenax, albus, scutellis ex- cavatis marginatis, concoloribus †. *Lichenoides leprosum*

- leprosum tinctorium scutellis lapidum cancri figura DILLEN. p. 130. t. 18. f. 10.
- 2049 LICHEN crusta tenace, verrucosa, cinerea, scutellis rufis marginatis. *Lichenoides crustaceum leprosum* scutellis subfuscis DILLEN. p. 134. t. 18. f. 16.
- 2050 LICHEN crustaceus tartareus, glaucus, scutis difformibus planis, crebellimis. ad rupes alpinas.
- 2051 LICHEN crusta tenace alba, scutellis sessilibus atris †. passim ad rupes.
- 2052 LICHEN crustaceus ater, scutellis inferne excavatis. †
- 2053 LICHEN crusta verrucosa, areis polygoniis punctiferis †. *Lichenoides verrucosum* & *rugosum* *cinereum* *glabrum* DILLEN. p. 128. t. 18. f. 9. ad saxa & arbores.
- 2054 LICHEN crusta verrucosa tenace, fusca, scutellis spadiceis nigris. *Lichenoides tartareum lividum*, scutellis rufis margine exili DILLEN. p. 134. t. 18. f. 14. in muris & faxis.
- 2055 LICHEN crusta tenui farinosa timosa, punctata, scutellis atris †. *Lichenes* MICHELI t. 54. f. 3. 7. 8.
- 2056 LICHEN crusta glauca, tenace, verrucosa †. *Lichenoides crustaceum* & *leprosum*, scutellis nigricantibus majoribus & minoribus, DILLEN. p. 133. t. 15. f. 15. ad calcem in parietinis.
- 2057 LICHEN sessilis, scutellis sordide virentibus, oris albis †.
- 2058 LICHEN saxatilis, crusta verrucosa flava, scutellis concoloribus †. in duro saxo prope Vorone.
- 2059 LICHEN crusta inseparabili, reticulata, cinerea, scutellis nigris minutissimis †. ad saxa.
- 2060 LICHEN crusta tartarea albissima, scutellis nigris marginatis †. in duro lapide.
- 2061 LICHEN crusta tartarea albissima, scutellis nigris. † in lateribus & faxis.
- 2062 LICHEN crusta farinacea, inseparabili, cinerea, scutis nigerrimis confertis. in faxis.
- 2063 LICHEN crusta inseparabili flava, scutellis nigris confluentibus. *Lichenoides nigro flavum tabulae*

- geographice instar pictum* DILLEN. t. 18. f. 5. ad faxa.
- 2064 LICHEN crusta inseparabili, farinosa, cinerea, villosa, scutellis atris †. in faxis arenosis.
- 2065 LICHEN crusta farinacea virescente, scutellis atris. *Lichenoides leprosum*, *crusta cinereo virescente*, *tuberculis nigerrimis*. DILLEN. p. 126. t. 18. f. 3. in ligno putrido.
- 2066 LICHEN crusta verrucosa, cinerea, scutellis nigerrimis planis †. in cortice arborum.
- 2067 LICHEN crusta tenerrima, scutellis hemisphæricis viridibus †. in ligno putrescente.
- 2068 LICHEN crusta colliculosa nigricante †. in cortice.
- 2069 LICHEN crusta farinosa, tenuissima, albida, scutellis nigris †. perinde.
- 2070 LICHEN crusta tenuissima cinerea, scutellis fuscis †. *Lichenoides leprosum tuberculis fuscis & ferrugineis* DILL. p. 126. t. 18. f. 4.
- 2071 LICHEN crusta tenuissima, scutellis hemisphæricis, albo polline efflorescentibus †. etiam in cortice.
- 2072 LICHEN crusta tenerrima, farinosa, alba, atris punctis notata. etiam.
- 2073 LICHEN crusta tenuissima, inseparabili, subcarnea, scutellis sanguineis subhirsutis †. in marmore.
- 2074 LICHEN crusta miniata, tenerrima, inseparabili, scutellis flavis marginatis †. ibidem.
- 2075 LICHEN crusta nigerrima verrucosa, scutellis maximis flavis †. in cote.
- 2076 LICHEN scutellis in saxum immersis nigris †. *Lichenoides punctatum & rugosum nigrum* DILL p. 125. t. 18. f. 2. in duro lapide.
- 2077 LICHEN subrubellus minimus, scutellis in saxum immersis.
- 2078 LICHEN scutellis flavis, faxo immersis †. in marmore.
- 2079 LICHEN bivalvis, de rimis efflorescens, ater, characteristicus. *Lichenoides crusta tenuissima*, *pere-*

*peregrinis veluti literis inscripta DILL. t. 18. f. 1.  
in cortice.*

- 2080 LICHEN stigmaticus, scutellis atris †. perinde.

## X. CRUSTACEI ABSQUE SCUTELLIS LEPRÆ.

- 2081 LICHEN crustaceus saxatilis, omnium minimus,  
niger †. in saxo arenoso.
- 2082 LICHEN minimus, atrocinereus, villosus †. po-  
rindē.
- 2083 LICHEN nigerrimus, asper †. etiam.
- 2084 LICHEN crusta continua, aterrima, globulis sub-  
rotundis †. & iste.
- 2085 LICHEN archipelagius †. in saxo.
- 2086 LICHEN verrucosus, crustaceus, albus, orbiculis  
villosis concoloribus †. *Lichenoides candidum*  
*& farinaceum* scutellis fere planis DILLEN. p. 131  
t. 18. f. II. in cortice.
- 2087 LICHEN verrucosus, cinereus, orbiculis villosis  
flavescens †. & iste.
- 2088 LICHEN crustaceus tenax, verrucosus, subcine-  
reus †. & iste.
- 2089 LICHEN crustaceus, verrucosus viridis. *Byssus*  
*botryoides saturate virens* DILLEN. p. 31 t. 1 f. 5.  
in murorum scrobibus.
- 2090 LICHEN crustaceus, iridis odore, tuberrimus.  
*Lapis violaceus sylvæ hercyniae* BRUKMAN. diff.  
ad luros lapides.
- 2091 LICHEN crustaceus rimosus verrucosus cinereus †.  
in cortice.
- 2092 LICHEN farinaceus, mollis, albicans, villis efflo-  
rescens †. late per terram.
- 2093 LICHEN farinaceus, mollis, albus, globulis sphæ-  
ricis. *Byssus candidissima calcis instar muscos*  
*vestiens* DILL. p. 2. t. 1. f. 2. ad terram.
- 2094 LICHEN farinaceus, mollis albicans, glebis dif-  
formibus †. *Byssus pulverulenta, incana farina*  
*instar strata* DILLEN. p. 3. t. 1. f. 3.

190 XVII. CRUSTACEÆ. XVIII. FILAM.

- 2095 LICHEN farinosus arboreus candidans †. *L. crustaceus arboribus adnascens*, neque ramosus, neque verrucosus, candidus pulvitulo concolore adspersus MICHEL. p. 99. t. 53. f. 7.
- 2096 LICHEN crusta tenuissima flava. *Byssus pulverulenta flava*, lignis adnascens DILLEN. p. 3. t. 1. f. 4.
- 2097 LICHEN crusta viridissima †. *Byssus lanuginosa æruginosa* DILL. p. 4. t. 1. f. 8.
- 2098 LICHEN crusta cinnabarina †. *L. crustaceus pulverulentus ruber*, arboribus adnascens MICHEL. p. 100. n. 73.
- 2099 LICHEN latae purpureus latissimis crustis & tenuissimis †. Hi omnes ad cortices & afferes.
- 2100 LICHEN omnium tenuissimus, late sparsus, latae purpurascens †. in fungis putrescentibus.

XVIII. FILAMENTOSÆ.

- 2101 BYSSUS viridis, filamentis ramosis †. *Byssus tenebrima viridis velutum referens* DILL. p. 7. t. 1. f. 14. ad terram & lapides.
- 2102 BYSSUS cærulea cespitosa crispa †. *Byssus cærulea non ramosa musco innascens*, MICHEL. p. 212. t. 90. f. 8. ad rupes fabulosas.
- 2103 BYSSUS spadicea crispa †. *Byssus sericea fulva perelegans tenuissima rimis tamen innascens* Gleba circumvestiens MICHELI p. 211. t. 90. f. 4. simili loco.
- 2104 BYSSUS nigra velutina †. *Byssus petræa nigerrima fibrosa* DILL. p. 9. t. 1. f. 18. Muscis per alpes instrata.
- 2105 BYSSUS rupestris aurantia crispa †. montana.
- 2106 BYSSUS cespitosa, pulverulenta, crocea. *Byssus petræa crocea glomerulis lanuginosis* DILL. p. 8. t. 1. f. 18. in muris & ad rupes.
- 2107 BYSSUS longissima filamentis cervinis ramosis †. in fungis putridis.
- 2108 BYSSUS longissima, tenerima, nivea †. *Byssus major speluncis* cellis vinariis innascens MICHEL.

- MICHEL. p. 211. t. 90. f. 1. in cuniculis subterraneis.
- 2109 CONFerva pollinea purpurea aquæ innatans. in stagnis.
- 2110 CONFerva pollinea globosa gelatinosa †. in aquis puris.
- 2111 CONFerva crustacea gelatinosa †. in alveis fontium falsarum.
- 2112 CONFerva natatilis tenuissima iridis coloribus †. in aquis.
- 2113 CONFerva crustacea tenerrima subviridis. *Byssus latissima papiri instar super aquam sparsa* DILL. p. 21. t. 1.
- 2114 CONFerva cespitosa, filis rectis, undique divergentibus †. *Conferva minima Byssi facie*, DILL. p. 14. t. 2. f. 3. in lapidibus rivorum.
- 2115 CONFerva filamentis simplicissimis æqualibus, longissimis. *Conferva fluviatilis sericea vulgaris* & *fluitans* DILL. p. 12. t. 2. f. 2. in rivulis.
- 2116 CONFerva filamentis simplicissimis duriusculis. † *Conferva palustris crassior* & *varie extensa* DILL. p. 13. t. 2. f. 2.
- 2117 CONFerva dichotoma setis porcinis similis DILL. p. 17. t. 3. f. 9. non satis certa civis.
- 2118 CONFerva filamentis tenuibus, ramosis, intricatis, fusis. *Conferva rivularum capillacea densissime congestis ramulis* DILL. p. 21. t. 4. f. 15. in rivis.
- 2119 CONFerva reticulata DILLEN. p. 20. t. 4. f. 14. Basileæ in aquis tranquillis.
- 2120 CONFerva pilis tenerimis, vellere gossypaceo. *Conferva palustris bombycina* DILL. p. 18. t. 3. f. 11 in aquis stagnantibus.
- 2121 CONFerva crista continua, pellicea, filis planis stipatis †. aux Combes de Valanvron.
- 2122 CONFerva foliis crassiœculis, rigidioribus, subarticulatis †. *Conferva fluviatilis fibrillosa subrigida* DILL. p. 21. t. 4. f. 16. in rivis.
- 2123 CONFerva coriacea obscura †. *Tremella palustris vesiculis sphaericis fungiformibus* DILLEN. p. 55. t. 10. f. 17.

192 XVIII. FILAMENTOSÆ. XIX. FUNGI.

- 2124 CONFerva gelatinosa globulis punctatis concatenatis. *Conferva fontana nodosa sfermdtis ranarum instar lubrica major & fusca* DILL. p. 36. t. 7. f. 92. & Ejusd. n. 43. 44. 45. in rivulis purioribus.
- 2125 TREMELLA viridissima, corniculis palmatis †. *Tremella palustris gelatinosa Dama cornuum facie* DILL. p. 51. t. 10. f. 10. in fossis paludosis.
- 2126 TREMELLA plana, disformis, ramosa †.
- 2127 TREMELLA lobata & rugosa. *Tremella saxatilis gelatinosa & utriculosa* DILL. p. 54. t. 10. f. 16. in aquis palustribus.
- 2128 ULVA tubulis cylindricis, tuberosis. *Tremella maxima tuberosa intestinorum forma* DILL. p. 47 t. 9. f. 7. in aquis stagnantibus rarior.

XIX. FUNGI.

- 2129 MUCILAGO alba crustacea & filamentosa. *Mucilago crustacea alba* MICHEL. p. 216. t. 96. f. 2. & plures aliæ. ad terram.
- 2130 MUCILAGO plumosa nivea †. in fungis putridis.
- 2131 MUCILAGO cinerea, filis cespitosis, ramosis & non ramosis †. in lignis & corticibus.
- 2132 MUCILAGO miniata villosa minima †. alpina.
- 2132\* MUCILAGO agminata, globofa, aurantia †.
- 2133 FULIGO butyracea, crocea, caulinulis ramosis, laci-  
niatis †. *Spongia fugax mollis flava & amena  
in pulvere coriario nascens* Mem. de l' Acad. 1727 in lignis putridis.
- 2134 FULIGO ovata, laminosa, albida †. *Mucor primus* SCHAEFER. fung. t. 192. circa virgulta.
- 2135 FULIGO flava butyracea capitata †. in foliis pu-  
tridis.
- 2136 EMBOLUS carneus †. *Lycoperdon spurium arbo-  
reum barbatum* BUXBAUM. Hist. plant. Helv. p. 204. in arborum corticibus.
- 2137 EMBOLUS nigerrimus albo villo adspersus. in ligno putrido.
- 2138 EMBOLUS albissimus. in ligno putrido.

2139 BO-

- 2139 BOTRYTIS cinerea racemis sphæricis. *Botrytis comata grisea caule simplici crassiori seminibus rotundis* MICHEL. t. 91. f. 1. in plantulis humectis sub prelo positis.
- 2140 BOTRYTIS flava simplex & ramosa †. An MICH. p. 91. f. 2. perinde,
- 2141 BOTRYTIS alba racemis sphæricis STÆH. MICH. f. 3.
- 2142 LYCOGALA sessile fulvum †. *Lycogala globosum granis pisi multitidine, aris recocti colore* MICHEL. p. 216. t. 95. f. 2.
- 2143 LYCOGALA sessile niveum †. ad terram.
- 2144 LYCOGALA petiolatum album aquosum †. in cuniculis subterraneis.
- 2145 LYCOGALA petiolatum aquosum flavescens †. in ossibus humanis.
- 2146 LYCOGALA petiolatum, niveum, opacum †. in ligno putrido.
- 2147 MUCOR petiolatus cinereus. *Mucor vulgaris, capitulo lucido, per maturitatem nigro, pediculo griseo* MICHEL. p. 215. t. 95. f. 1. in pane sicutum coriñahente. &c.
- 2148 MUCOR petiolatus albus minimus, MICHEL. p. 215. t. 95. f. 1. in fungis humidis.
- 2149 MUCOR petiolatus albissimus, capitulo ovali †. in pruno putrescente.
- 2150 MUCOR sessilis globosus albus †. An *Mucilago* MICHEL. t. 96. f. 6.
- 2151 MUCOR sessilis globosus luteus †. in plantis humectis.
- 2152 ASPERGILLUS capitatus ochroleucus †. in cortice.
- 2153 ASPERGILLUS puþpureus †.
- 2154 ASPERGILLUS capitulo subrotundo, seminibus subrotundis MICHEL. p. 212.
- 2155 ASPERGILLUS albus, pediculo articulato †.
- 2156 ASPERGILLUS petiolatus, capite cylindrico cinereo †.
- 2157 ASPERGILLUS ramosissimus, in globulos terminatus †. Hos Basileæ STÆHelinus.

2158

- 2158 TRICHIA nigra petiolata , capitulo sphærico †.  
in ligno putrescente.
- 2159 TRICHIA nigra petiolis flexuosis †.
- 2160 TRICHIA petiolo brevissimo , capitulo sphærico,  
cortice niveo , filamentis nigris *Enum.* t. 48.  
f. 2. †.
- 2161 TRICHIA petiolata , nigra , capitulo sphærico ,  
villo ochroleuco t. 48. f. 3. †.
- 2162 TRICHIA flava , petiolata , capitulo sphærico †.  
*Lycoperdon omnium minimum splendide lutescens*  
FABRIC. *butisbac.* p. 28.
- 2163 TRICHIA petiolata , rufa , capitulo sphærico t. 48  
f. 4. †.
- 2164 TRICHIA gregaria , purpurea , petiolata , capitulo  
sphærico t. 48. f. 6. *Arcyria petiolo in volvam*  
*expanso* HILL.
- 2164\* TRICHIA petiolata , nigra , capitulo cylindrico †.
- 2165 TRICHIA petiolata , capitulo cylindrico , axi per-  
forato. *Clathroidastrum obscure purpureum ma-*  
*jus* MICHEL. p. 214. t. 94. f. 1. & *minus* f. 2.
- 2166 TRICHIA gregaria , cinerea , petiolata , pirifor-  
mis †.
- 2167 TRICHIA brevissime petiolata , purpurea , pirifor-  
mis *Enum.* t. 48. f. 5. †. An *Clathroides purpu-*  
*reum pediculo carens* MICHEL p. 214. t. 94. f. 2.
- 2168 TRICHIA gregaria , sessilis , piriformis , flava t. 48  
f. 7.
- 2169 TRICHIA gregaria , sessilis , sphærica , glauca †.  
Trichiae in ligno fere putrido nascuntur , hæc  
in Musco.
- 2170 LYCOPERDON petiolo gracili , capite sphærico ,  
levi , papillato , perforato. *Lycoperdon Parisiense*  
*minimum pediculo donatum* I. R. H. t. 333. E. F.
- 2171 LYCOPERDUM totum exasperatum , petiolo cy-  
lindrico , capitulo sphærico †. *Lycoperdon album*  
*totum asperum* MICHEL p. 217.
- 2172 LYCOPERDUM faccatum cinereum , polline ob-  
scure viridi. Hujus speciei pene innumeræ va-  
rietas sunt , adamantibus conspersæ , leves , se-  
ssiles , collo cylindrico , maximum &c. ad ter-  
ram omnia.

- 2173 LYCOPERDUM leve , miniatum , sphæricum.  
*Lycoperdon sanguineum sphæricum* , BUXBAUM.  
*Cent. V.* t. 29. f. 2. in afferibus.
- 2174 LYCOPERDUM cortice exteriori revoluto , stellato MICHELI t. 100. f. 1. 2. 3. 4. in sylvis ad terram.
- 2175 LYCOPERDUM corticibus revolutis stellatis , globo projectili. *Carpobolus aureus* &c. MICHELI t. 101. f. 2. in ligno putrido.
- 2176 LYCOPERDON faccatum nigerrimum , pulva flava , cellulis fimbriatis †. *Lycoperdoides* MICHEL. p. 219. t. 89. Basileæ STAEN.
- 2177 LYCOPERDON subterraneum , conglomeratum , cortice nigro. *Tubera ZANON.* t. 333. &c. in sylvis de la Côte.
- 2178 LYCOPERDON subterraneum , rugosum , congestum †. Fungi brassicæ in foliis sepultis nascentes.
- 2179 SPHÆRIA atrata , solitaria , minima †. in virgultis nudis.
- 2180 SPHÆRIA solitaria , scutellis nudis , atris , obtuse conicis †. *Lichen* &c. MICHEL. t. 54. f. 4. perinde.
- 2181 SPHÆRIA solitaria , mammiformis , olivacea †. *Lichenagaricus olivæ conditæ colore* &c. MICHEL. t. 55. f. 1.
- 2182 SPHÆRIA tenuissima , cinerea , sphærulis miniatis †.
- 2183 SPHÆRIA obscura , tuberculosa , sessilis †. Hæc in virgultis.
- 2184 SPHÆRIA nivea , plana , punctis nigricantibus. Icon ORDER. f. 288. in stercore equino.
- 2185 SPHÆRIA obscura , minima †. in virgultis.
- 2186 SPHÆRIA plana , carne alba †. *Lichenoides disciforme compressum lignis putridis adnascens* , DILLEN. sylv. p. 127. t. 18. f. 7.
- 2187 SPHÆRIA atra , convexa , carne nigra †. *Lichenagaricus bullatus parvus* , ex obscuro nigricans , sub cute emortuarum arborum MICHEL. t. 54. f. 2.

- 2188 SPHÆRIA crustacea , nigerrima , tuberculosa , foliis innascens t. 47. f. 8. GLEICHEN. *Reich der Pflanz.* append. t. 5.
- 2189 SPHÆRIA convexa miniata hirsuta †. *Lichenoides tuberculatum amæne purpureum* DILLEN. p. 127. t. 18. f. 6. in virgultis.
- 2190 SPHÆRIA rubra fragi similis t. 47. f. 10. perinde.
- 2191 SPHÆRIA subrotunda , tuberculis minimis , medulla atia pulverulenta. *Tubera cervina* LOBEL ic. p. 276. in montanis.
- 2192 SPHÆRIA maxima , convessa , nigerrima. *Lichenagaricus crustaceus crassus bovillum quasi renem referens , nigricans &c veluti deustus* MICHEL. t. 54. f. 1. in dejectis arborum truncis.
- 2193 SPHÆRIA nigerrima , aspera , petiolata , conica. *Lichenagaricus &c.* MICHEL. p. 104. t. 54.f.4.5. in aridis lignis.
- 2194 SPHÆRIA nigerrima , aspera , palmata , cornubus planis , carnosis , pulverulentis. *Lichenagaricus nigricans ligno innascens &c.* MICHEL. t. 55.f.1. in arborum cortice.
- C. Radix ejusdem. *Plante nouvelle* DODART. ane. mem. T. 10. p. 557. t. 4. f. 3. sub arborum cortice.
- 2195 CLAVARIA simplex & ramosa , subulata , vellere albo †. in ligno putrescente.
- 2196 CLAVARIA caule ramisque cylindricis , fine crassifrons †. in ligno putrido subterraneo.
- 2197 CLAVARIA vertice multifido , ramis acutissimis †. *Corallofungus ornithopodioides* VAILLANT. p. 41. t. 8. f. 4. in ligno putrescente.
- 2198 CLAVARIA caule dichotomo , ramis breviter bicornibus †. in gramineis.
- 2199 CLAVARIA caule ramoso , ramis flexuosis acutis. *Fungus parvus luteus ramosus*, RAJ. Syn. III. t. 24. f. 7.
- 2200 CLAVARIA caule plano , sulcato , ramis ferratis †. *Coralloides minor cristata* BUXBAUM. Cent. IV. t. 66. f. 1. in gramineis utraque,

- 2201 CLAVARIA caule crassissimo , ramis innumeris , cespitosis , breviter dentatis. *Corallofungus flavus* VAILLANT. t. 8. f. 5. variat albo & subrubore colore. in sylvis abiegnis.
- 2202 CLAVARIA rugosa & tuberculosa ramis obtusis †. *Corallofungus candidissimus* VAILLANT. t. 8. f. 2. perinde.
- 2203 CLAVARIA alba , longe petiolata. *Clavaria cespitosa major candida* MICHEL. t. 87. f. 10.
- 2204 CLAVARIA indivisa flavescens plicata. *Clavaria major lutea* MICHEL. p. 208. t. 87. f. 1.
- 2205 CLAVARIA indivisa viridis, rugosa & compressa. † in sylvis.
- 2206 CLAVARIA indivisa nigra , compressa. *Clavaria opbioglossoides nigra* VAILLANT. t. 9. f. 3. in torfaceis.
- 2207 CLAVARIA lutea minima MICHEL. t. 87. f. 5.
- 2208 PUCCINIA minima , candidissima , ramosa , bifurcata MICHEL. p. 20. t. 92. f. 2. †. in dejecto ligno.
- 2209 PUCCINIA flava , conica , fistulosa †. in Sabina STÆH.
- 2210 PUCCINIA flava depressa †. STÆH.
- 2211 PUCCINIA nivea granis coccineis †. STÆH. omnes in arborum corticibus.
- 2212 CERATOSPERMUM nigrum, discoides, minimum, in diversarum arborum corticibus &c. MICHEL p. 125. t. 56. f. 1.
- 2213 CERATOSPERMUM minimum, cornucopioides album & subhirsutum , seminibus incarnati coloris MICHEL. t. 36. f. 3. utrumque Cel. GAGNEBIN.
- 2214 CYATHUS hirsutus , intus striatus. *Fungoides infundibuliforme semine setum, interne striatum, externe hirsutum* VAILLANT. t. 11. f. 4. 5. ad terram.
- 2215 CYATHUS sericeus , intus levis †. *Fungoides infundibuliforme semine setum* VAILL. t. 11. f. 6. 7 ad afferes siccos.
- 2216 PEZIZA membranacea , tubæ similis , marginibus repli.

- replicatis. *Fungoides nigricans majus cornucopiae forma* VAILLANT. t. 13. f. 22. in sylvis.
- 2217 PEZIZA membranacea, tubæ similis, marginibus erectis laceris †. *Elvela petiolata tubulosa marginè inequali multifido* GLEDITSCH. p. 40. in sylvis.
- 2218 PEZIZA bracteata, petiolo rugoso, fronde sanguinea, sericea †. An *Fungoides auriculam Jæda referens, extus candidans & farinosum*, VAILLANT. t. 11. f. 8. in sylvis.
- 2219 PEZIZA sessilis infundibuliformis, extus hirsuta, umbrina, intus nigerima t. 48. f. 8. passim ad arbores.
- 2220 PEZIZA bracteata, cespitosa, plana, sericea. *Agaricum auriculæ forma*, MICHEL. t. 66. f. 1. ad arbores.
- 2221 PEZIZA gelatinosa, coccinea, scyphis conicis, simplicibus & gregariis †. ad ligna putrida.
- 2222 PEZIZA cava, albida, intus coccinea. *Fungoides coccineum acetabali forma* MICHEL. p. 207. n. 12. ad orbitas viarum.
- 2223 PEZIZA bracteata, sordide lutea, subvillosa. *Fungi Pezizæ Plinii COLUMN. ephras. I. p. 335.* cum multis varietatibus, ad vias.
- 2224 PEZIZA terrea, petiolo rugoso, acetabulo hemisphaericō gracili †. in sylvis ad terram.
- 2225 PEZIZA sordide lutea, longissime petiolata, cupula parabolica †.
- 2226 PEZIZA fusca, petiolo longissimo, cupula hemisphaerica reticulata HOFER *Act. Helv. I. p. 80.* in sylva ad terram.
- 2227 PEZIZA terrea, petiolo longo, gracili, acetabulo extus sebastero SCHÆFFER. t. 167. perinde.
- 2228 PEZIZA petiolata, hemisphaerica, ora dentata. *Fungoides glandis cupulam referens, margine dentato* VAILLANT. t. 11. f. 1. 2. 3. in sylvis ad terram.
- 2229 PEZIZA sessilis, hemisphaerica, ora subdentata †. *Fungoides parvum nigrum interne leve exterius rugosum vel striatum* MICHEL. t. 86. f. 18. ad terram.

- 2230 PEZIZA atra, cupula hemisphærica sessili †.  
 2231 PEZIZA sessilis, hemisphærica, extus villosa, spadicea. Icon SCHLEFFERI t. 151. in sylvis.  
 2232 PEZIZA sessilis, alba, hemisphærica, extus villosa †. *Elvela hemisphærica, excavata & sessilis radice longa* GLEDITSCH.  
 2233 PEZIZA infundibuliformis umbrina †. *Fungoides cespitosum infundibuli forma fulvum &c.* MICHELI t. 86. f. 10  
 2234 PEZIZA brevissime petiolata viridis †.  
 2235 PEZIZA petiolata, flavescentia, scypho infundibuliformi †. in cortice virgultorum.  
 2236 PEZIZA viridissima, petiolata, scypho infundibuliformi †.  
 2237 PEZIZA minima, fusca, petiolata, scypho infundibuliformi †.  
 2238 PEZIZA minima, alba, petiolata, scypho infundibuliformi †. *Fungoides minimum pyxidatum album externe hirsutum pediculo donatum* MICHELI t. 86. f. 11. Hæc in virgulis siccis.  
 2239 PEZIZA nivea, infundibuliformis, brevissime petiolata †. *Fungoides &c.* MICHELI t. 86. f. 15. perinde.  
 2240 PEZIZA minima, petiolata, coccinea, hirsuta †. *Fungoides minimum cernuum coccineum totum pediculo donatum* MICHELI t. 86. f. 12. in cortice putrescente.  
 2241 PEZIZA plana, flava, brevissime petiolata †. in terra & ligno putrescente.  
 2242 PEZIZA plana, sessilis, aurantia, anulata VAILL. t. 13. f. 14. ad terram.  
 2243 PEZIZA planissima, ex glauco nigricans †.  
 2244 PEZIZA plana, sessilis, glauca, extus nivea †.  
 2245 PEZIZA plana, sessilis, miniata, oris ciliatis. *Fungus minimus scutellatus, coloris aurantii,* VAILL. t. 13. f. 11. ad terram.  
 2245\* PEZIZA humida, exilis, late rubicunda Basl. merk. III. p. 384.  
 2246 BOLETUS capitulo explanato laciniato. *Fungoides &c.* MICHELI t. 85. f. 8. & 9. in sylvis.

- 2247 BOLETUS capite terete reticulato. Multas varietates Morchellæ vide ap. MICHELI t. 85. f. 2. 6. ad terram circa ulmos.
- 2248 PHALLUS volva exceptus, capituli apice patulo GLEBITSCH. p. 55. MICHELI t. 83. in Comitatu Burgundiae proxime fines.
- 2249 AGARICUM lenticulare †.
- 2250 AGARICUM sebaceum, undulatum, ex albo spadiceum †.
- 2251 AGARICUM crustaceum, flavum, resinæ simile. *Fungus non vescus* LOSEL. p. 56. in corticibus arborum.
- 2252 AGARICUM purpureum undulatum †.
- 2252\*AGARICUM album, tenue, crustis subrotundis †. in corticibus.
- 2253 AGARICUM crustaceum, laciniatum, ochroleucum. †
- 2254 AGARICUM crustaceum, subcalcarium, acute laciniatum. stercoris humani odore.
- 2255 AGARICUM crustaceum, acute laciniatum, albissimum, coriaceum. Hæc ad terram per muscos effusa.
- 2256 AGARICUM crustaceum, rotunde lobatum, superne villosum †.
- 2257 AGARICUM gelatinosum, granulosum, e flavo rufum. † in cōtice.
- 2258 AGARICUM gelatinosum, coccineum, lobis crassis dentatis †.
- 2259 AGARICUM gelatinosum, scutatum, obscure flavum †.
- 2260 AGARICUM gelatinosum, flavorubrum, superne tuberosum. *Fungi juniperini* HOFMAN. Delic. flor. Altendorf.
- 2261 AGARICUM gelatinosum, intortum & mesenteriforme †. *Noftoch luteum*, *Mesenterii forma*, VAILLANT. t. 14. f. 4. ad ligna demortua.
- 2262 AGARICUM gelatinosum, imbricatum, villosum, zonis diversicoloribus, inferne rugosum & unicolor. *Agaricum squamosum* & *lichenosum* &c. MICHELI t. 66. f. 5. SCHÄFFER. t. 168. ad trabes humidas.

- 2262\* AGARICUM subhirsutum, miniatum, inferne plenum †. in ramis abiegnis.
- 2263 AGARICUM coriaceum, squamis ellipticis, imbricatis, superne villosis & diversicoloribus †. *Agaricum squamosum & lichenosum membranaceum &c.* MICHEL. p. 124. f. 8. & forte n. 7. t. 66. f. 2. ad ligna arida.
- 2264 AGARICUM squamis ellipticis, imbricatis, sinuatis, superne albae & hirsutum, inferne violaceum †. ad terram.
- 2265 AGARICUM squamis ellipticis imbricatis, superne cervinis & villosis, inferne flavis levibusque †. ad ligna emortua.
- 2266 AGARICUM durum, crassissimum, squamis ellipticis, superne villosum & fulvum, inferne albidum †. *Stereum crassissimum durum* HILL. hist. p. 35. ad arborum truncos.
- 2267 AGARICUM durum cespitosum, acetabulis imperfectis, intus squamosum †. Tabulae 144. 145. forte & 146. SCHAEFFERI. in sylvis.
- 2268 AGARICUM anulare, atrum, laciniatum †. *Agaricus sericeus fusca* VAILLANT. p. 3. t. 1. f. 4. circa arida virgulta.
- 2269 AGARICUM petiolatum, gelatinosum, capitatum flavum. *Fungus gelatinosus flatus* VAILLANT. t. 13. f. 7. 8. 9. in sylvis.
- 2270 AGARICUM petiolatum, gelatinosum, corallinum, capitulis sphæricis †. *Fungus onnium minimus turbinatus croceus* BOCCONI. di piant. p. 150 t. 110. ad terram inter Muscos.
- 2271 AGARICUM petiolatum, gelatinosum, carneum, capitulis sphæricis †. *Coralloides fungiforme ex ungula equina livide rufescens*, DILLEN. sylv. t. 14. f. 5.
- 2272 POLYPORUS effusus crustaceus albus †. *Agaricum terrestris medullam panis referens* MICHEL. p. 121. t. 65. f. 2. in sylvis per ligna putrida.
- 2273 POLYPORUS crustaceus albus jugis crispatis †. *Corallofungus argenteus omenti forma* VAILLANT p. 41. t. 8. f. 1. in arboribus refertis & putrescentibus.

- 2274 POLYPORUS crustaceus purpureus †. perinde.
- 2275 POLYPORUS crustaceus albissimus, poris maximis †. perinde.
- 2276 POLYPORUS frondosus, cespitosus, imbricatus, spadiceus, poris albidis. *Florum Fasciculus* STERBEEK p. 269. t. 28. A. ad pedem arborum.
- 2277 POLYPORUS sessilis, carnosus, flavus, digitatus, maximus †. *Fungus casearius ex Campenhou* STERBEEK. p. 170. t. 12. lit. A. ex arboribus & lapidibus efflorescit.
- 2278 POLYPORUS sessilis, convexo planus, poris amplissimis albidis SCHÄFFER. t. 101. 102. ad arbores.
- 2279 POLYPORUS sessilis, convexo planus, spadiceus, poris fulvis, latioribus, angulosis †. perinde.
- 2280 POLYPORUS sessilis, convexo planus, albissimus, superne hirsutus. poris latioribus †. similiter.
- 2281 POLYPORUS sessilis, hirsutus, superne fuscus, poris albis tenuissimis †. *Agaricus cinereus murine albo* BATARRA t. 35? ad arbores.
- 2282 POLYPORUS sessilis, cespitosus, planus, hirsutus, anulis versicoloribus. *Agaricus squamis iridiformibus* BATARRA t. 35. ad sicclos arborum truncos.
- 2283 POLYPORUS sessilis, convexo planus, anulis versicoloribus, poris albis tenuissimis. *Agaricus imbricatus laciniatus major* BUXBAUM. Cent. V. t. 1. f. 1. perinde.
- 2284 POLYPORUS sessilis, convexo planus, anulis disco'ribus fulvis, poris ochroleucis. *Agaricus f. Fungus Laricis* C. B. ad larices.
- 2285 POLYPORUS sessilis, convexo planus, miniatus. + alpinarum arborum.
- 2286 POLYPORUS sessilis, convexo planus, hirsutus, fulvus †. ad arbores.
- 2287 POLYPORUS sessilis, convexo planus, farinosus. + *Fungus non vescus* XXXVI. LOESEL. p. 97. perinde.
- 2288 POLYPORUS sessilis, convexo planus, durissimus, cinereus, inferne albidus. *Fungi arborei ad Elychnia* I. B. III. p. 840. ad arbores.

- 2289 POLYPORUS sessilis, convexo planus, inferne albidus, superne fulvus, zonis discoloribus †. *Agaricus pedis equini facie* BATARRA t. 37. E. ad arbores.
- 2290 AGARICUS coriaceus faginus hæmatocles? eudem esse suspicor.
- 2291 POLYPORUS sessilis, convexo planus, laciniatus, flavus, imbricatus & cespitosus †. *Agaricus ignarius heteroclitus* BATARRA t. 37. G.
- 2292 POLYPORUS sessilis, petiolo horizontali †. *Agaricus aureus fabelli effigie* BATARRA t. 37. A. ad arborum truncos.
- 2293 POLYPORUS petiolo laterali, pileo cervino, poris cinnameis †.
- 2294 POLYPORUS petiolatus, amplissimus, albidus, alveolis subtus quadrangulis †. in sylvis.
- 2295 POLYPORUS petiolatus, niveus, alveolis subtus quadrangulis †. perinde.
- 2296 POLYPORUS petiolo & pileo reticulatis, albo viridis, alveolis subtus reticulatis terreis. † perinde.
- 2297 POLYPORUS petiolatus, cespitosus, ramosus, lobatus, spadiceus, inferne albidus †.
- 2298 POLYPORUS petiolatus, infundibuli forma, cespitosus, intus nigricans, extus albus †. *Polyperus lignosus* & *cespitosus* &c. MICHEL. p. 13. t. 70. f. 6. ad ligna putrida.
- 2299 POLYPORUS reticulatus, pileo fusco depresso †. An *Polyporus exiguis coriacens fulvus* &c. MICHEL p. 130. t. 70. f. 9. in sylvis omnes.
- 2300 POLYPORUS petiolo curvo, pileo pulvinato albo †. *Polyporus exiguis coriacens albus*, *lignis adnascens* MICHEL p. 130. t. 70. f. 7.
- 2301 POLYPORUS carne secedente, petiolatus, anulatus. *Fungus porosus autumnalis viscidus* BUXBAUM. Cent. V. t. 14. in sylvis.
- 2302 POLYPORUS carne secedente, petiolatus, fulvus, inferne virescens. *Suillus esculentus crassus*. superne fulvus, inferne initio albidus, deinide ex flavo virescens, petiolo ventricoso, & superne parti pilei cancolore MICHEL p. 127.

- 2303 POLYPORUS carne secedente, petiolatus, subviridis, inferne aurantius †.
- 2304 POLYPORUS carne secedente, petiolatus, leoninus, inferne cinnameus †. *Fungi* t. 107. 115. 123. 134. SCHÄFFERI.
- 2305 POLYPORUS carne secedente, purpureus, inferne flavus †. t. 133. SCHÄFFERI.
- 2306 POLYPORUS carne secedente, petiolatus, petiolo albido, poris violaceis †.
- 2307 POLYPORUS carne secedente, petiolatus, petiolo terreo, inferne aurantio †.
- 2308 POLYPORUS carne secedente, petiolatus, pileo spadiceo, inferne pallido †. *Fungus porosus magnus crassus* I. B. III. p. 833.
- 2309 POLYPORUS carne secedente, petiolatus, terreus, concolor †.
- 2310 POLYPORUS carne secedente, petiolatus, pileo ovato miniato, poris ochroleucis †. *Fungus aurantius pileolo longo* STERBEEK. p. 119. t. 16. f. A.
- 2311 POLYPORUS carne secedente, petiolatus, pileo villoso cervino, poris albidis †. *Fungus porosus, tenuis coriaceus* BUXBAUM. *Cent. V.* t. 15. f. 1.
- 2312 POLYPORUS carne secedente, petiolatus, spadiceus, inferne albidus, poris minimis †.
- 2313 POLYPORUS carne secedente, petiolatus, roseus, inferne flavus †.
- 2314 POLYPORUS semipetiolatus, lobatus, spadiceus, inferne cinereus †. Hi omnes in sylvis & ad terram.
- 2315 POLYPORUS sessilis, carne secedente, mollis, sanguineus, crassus, obscure lobatus. *Agaricum esculentum, castaneis adnascens, latissimum, hepatis facie, superne in rubro sanguineum, interne sanguineum, subtus ochroleucum* MICHELI p. 117. t. 60. in cavis arboribus & ad earum radices.
- 2316 ECHINUS sessilis, albicans, squamis ellipticis, superne villosus †. *Agaricus* t. 5. & 6. MICHELI p. 122. & t. 64. f. 3. 4. 5. ad truncos arborum inque syvies.

- 2317 ECHINUS ramosus, aculeis parallelis †. *Agaricus esculentum, cespitosum, album, multifidum & denticulatum, denticulis asperis*, MICHELI p. 122. t. 64. f. 2.
- 2318 ECHINUS nigricans, squamis ellipticis, aculeis longissimis †. circumnatus pini ramo. Idem se  
2324:
- 2319 ECHINUS crystallinus, gelatinosus †. *Fungus non vescus IX.* LOSSEL. p. 96. in lignis putridis.
- 2320 ECHINUS infundibuliformis rufus, intus aculeatus †. *Agaricus ramosus cornua rangiferi referens* BLAKSTON. specim. p. 2. t. 1. in montanis.
- 2321 ECHINUS petiolo gracili, laterali, pileolo plano, obscuro. *Fungus erinaceus partus in conis abiegnis nascens* BUNBAUM. Cent. I. t. 57. f. 1. in viis & semitis.
- 2322 ECHINUS crystallinus, petiolo crasso pustulato. † alpinus.
- 2323 ECHINUS petiolatus, petiolo hemisphærico, aculeis ovatis †. in sylvis.
- 2324 ECHINUS petiolatus albicans, superne squamosus. *Fungus erinaceus esculentus albus* MICHEL. p. 132 t. 72. f. 2.
- 2325 ECHINUS petiolatus, lamellatus, subrufus, petiolo levii. *Erinaceus &c.* MICHELI t. 12. f. 3. uterque in sylvis frequens.
- 2326 MERULIUS flavus, oris contortis & laceris. *Fungus angulosus & veluti in lacinias dissectus* VAILLANT. p. 60. t. 11. f. 14. 15. in sylvis.
- 2327 MERULIUS violaceus †. multo rarer.
- 2328 MERULIUS sessilis, semipetiolatus, convexo planus †. in sylvis.
- 2329 MERULIUS sessilis, albus, hirsutus, subtus creucus, venis serpentinis intricatis. ad ligna.
- 2330 AMANITA sessilis, durissimus, lamellis cartilagineis, intricatis. *Agaricus de St. Clou* VAILL. p. 3. t. 1. f. 1. 2. ad ligna.
- 2331 AMANITA sessilis, hirsutus, fulvus, lamellis coloribus †. *Agaricus hirsutus nigricans, lamellis luteis* BUXBAUM. Cent. V. t. 6. perinde.

- 2332 AMANITA sessilis, siccus, villosus, albicans, lamellis fulvis †. & iste.
- 2333 AMANITA sessilis, laminis pulverulentis, bifidis.  
*Agaricus imbricatus*, *bifidus*, *lamellis violaceis*  
BUXBAUM. Cent. V. t. 7. f. 1. tum iste.
- 2334 AMANITA sessilis, perexiguus, tener, cinerei coloris †.
- 2335 AMANITA sessilis, minimus, albus †.
- 2336 AMANITA sessilis, crustaceus, albissimus †.
- 2337 AMANITA semipetiolatus, albidus subtus terreus. †  
*Agarici MICHELI* t. 65. f. 1. §. 6. omnes ad ligna siccata.
- 2338 AMANITA umbilicatus, albus, lacte acri manans.  
*Fungus piperatus albus lacteo succo turgens* I.B.III.  
p. 823; vulgo in sylvis.
- 2339 AMANITA maximus, albus, infundibuliformis.  
*Fungus BUXBAUM*. Cent. IV. t. 1. f. 1. perinde.
- 2340 AMANITA albus, oris repandis & laceris †. mit  
hasenoor STERBERK. p. 119. t. 15. B. B.
- 2341 AMANITA albus, viscidus, lamelis tenuissimis †.  
*Fungus capite expanso viscosus*, VAILL. n. 67.  
& alii ejusd.
- 2342 AMANITA albus petiolo villoso, pileolo umbo-  
nato striato. *Fungus albus viscidus petio.lo longo*  
BUXBAUM. Cent. IV. t. 30. f. 2. omnes in sylvis.
- 2343 AMANITA albus, hemisphæricus, ambitu striato †  
*Fungus gracilis &c.* MICHELI t. 75. f. 6.
- 2344 AMANITA albus, siccus, cute coriacea †. *Omphalomyces BATARRA*.
- 2345 AMANITA albus, petiolo gracili, prælongo, pi-  
leolo striato conico †. *Fungus parvus gracillimus*  
&c. MICHELI t. 73. f. 4.
- 2346 AMANITA albus, tener, pileolo campanulato  
striato †. *Fungus minimus totus albus* &c,  
MICHELI t. 80. f. 11. in foliis faginis.
- 2347 AMANITA albus, petiolo gracili, pileolo cam-  
panulato, striato, farinoso †. *Fungus gracilissimus*  
*Androfacen simulans* MICHELI t. 19. f. 6. inter  
muscos.
- 2348 AMANITA albus, pileo hemisphærico, excarni,  
oris striatis †. *Fungus minimus albus*. pileo he-  
misphærico

- misphærico in arborum caudicibus* MICHEL. t. 74  
f. 7. in foliis aridis.
- 2349 AMANITA albus, omnium minimus, pileo'lo he-  
misphærico †. *Fungus minimus candidus, pi-  
leolo hemisphærico* MICHELI t. 80. f. 10. & iste.
- 2350 AMANITA pileolo campaniformi albo, superne  
violaceo, petiolo concolor †.
- 2351 AMANITA petiolo nigro, pileolo albo, striato, ex-  
carni. *Fungus pileolo candicante, lamellis paucis*  
etc. VAILL. t. 11. f. 21. 22. in foliis abiegnis.
- 2352 AMANITA albus, lamellis crassissimis †. *Fungus  
parvus albus subtus lamellis torosus*, MICHELI  
p. 146. n. 18. in sylvis.
- 2353 AMANITA albus, levis, pulvinatus, anulatus †.  
*Leomyces* F. x. c. BATARRÆ.
- 2354 AMANITA albus, squamosus, pulvinatus, petiolo  
crasso anulato †. MICHELI p. 171. n. 12.
- 2355 AMANITA albus, squamosus, petiolo gracili,  
anulato †. BATARRÆ t. VIII. D. E.
- 2356 AMANITA albus, squamosus, striatus, petiolo  
gracili, anulato †. *Fungus minimus albus* etc.  
MICHELI t. 78. f. 7. in sylvis.
- 2357 AMANITA albus, campanulatus, squamosus, ni-  
grecens. *Fungus bombaceus perniciosus* STER-  
BEEK. t. 24. B. in ruderosis.
- 2358 AMANITA pulvinatus, pileolo cervino, lamellis  
albis undulatis †.
- 2359 AMANITA infundibuli forma, cervinus, lamellis  
albis †.
- 2360 AMANITA pileo pulvinato, leonino, centro fusco,  
squamoso †. SCHÆFFER. t. 77. in sylvis omnes.
- 2361 AMANITA sanguineus, lamellis albidis, petiolo  
bulbosø ad c. l. BATARRÆ t. 10.
- 2362 AMANITA campaniformis, cervinus, reticulatus,  
lamellis albis †.
- 2363 AMANITA viscidus, pileo flavescente, lamellis  
albis SCHÆFFER. t. 45.
- 2364 AMANITA petiolo gracili anulato, pileolo con-  
vexo, tuuerculosø, cervino, lamellis albis †.  
ad T. X. A. BATARRÆ.

- 2365 AMANITA petiolo crassissimo, anulato, spadiceo,  
lamellis albis torosis †.
- 2366 AMANITA petiolo bulboso, anulato, pileolo con-  
vexo, spadiceo †.
- 2366\* AMANITA petiolo procero, squamoso, anulato,  
pileo conico, squamoso, subspadiceo, laminis al-  
bis †. *Fungus 23.* SCHÆFFERI. in sylvis abie-  
gnis.
- 2367 AMANITA pileo flavo, oris striatis & lanugirosis,  
lamellis albis. *Fungus croceus magnus* STERBEEK  
p. 62. t. 4. C. omnes in sylvis.
- 2368 AMANITA pileo pulvinato flavo, oris & lamellis  
albis †. T. 35. SCHÆFFERI.
- 2369 AMANITA viscidus, petioli carne flava, pileo  
plano, fordide luteo, lamellis albis †.
- 2370 AMANITA minimus, oris adtractis, flavus, lamel-  
lis albis. *Fungus minimus aurantius mammil-  
laris* VAILL. t. 11. f. 19. 20. inter muscos.
- 2371 AMANITA petiolo procero, anulato, in acetabu-  
lum pilei immiso, pileo squamoso & maculato,  
lamellis albis. *Fungus coronatus aut marmoreus*  
STERBEEK. p. 77. t. 7. in sylvis abiegnis.
- 2372 AMANITA petiolo gracili, anulato, pileolo albo,  
squamis sanguineis aspero †. An *Fungus mini-  
mus* &c. MICHELI t. 78. f. 8?
- 2373 AMANITA petiolo anulato, sanguineus, lamellis  
albis. *Mel muscarum venenosum*, STERBEEK.  
t. 22. A. in sylvis.
- 2374 AMANITA petiolo farto, pileolo convexo, um-  
bilicato, oris rugosis, lamellis albis. *Fungus pipratus non lactescens* VAILLANT. p. 62. variat  
pileo roseo, sanguineo, violaceo, cæruleo, viridi,  
livido, flavo, ochroleuco.
- 2375 AMANITA petiolo anulato, pileo viridi, striato,  
lamellis albis. *Fungus magnus viridis* STERBEEK  
t. 5. E. in sylvis.
- 2376 AMANITA pileo umbilicato striato, obscure vi-  
ridi, lamellis albis †.
- 2377 AMANITA pileo pulvinato, viridi, lamellis al-  
bis †.

- 2378 AMANITA petiolo brevissimo, pileo umbilicato, cinereo, lamellis tenuissimis, albis †. *Omphalomyces cinereus acris* BATARRA t. 13. E.
- 2379 AMANITA petiolo farinoso, pileo subcinereo viscido, lamellis albis torosis †. MICHEL. *Fungus esculentus* Sc. t. 73, f. 2.
- 2380 AMANITA petiolo bulboso, brevissimo, laterali, pileolo hemisphaerico, spadiceo, lamellis albis. an SCHÆFFER. t. 71. in sylvis isti.
- 2381 AMANITA petiolo farto, gracili, pileo piano, murino, sericeis lineis striato, lamellis albis, SCHÆFFER. t. 14. f. 64. ad vias.
- 2382 AMANITA petiolo gracili, farto, pileo squamoso murino, lamellis albis †. *Fungus pileolo conico maculato* VAILLANT. p. 63. n. 19.
- 2383 AMANITA petiolo farto, gracili, pileo hemisphaerico, cinereo, purpureo, lamellis albis †. an *Fungus superficie murini coloris lamellis albitantibus* BUXBAUM. Centt IV. t. 12. f. 2.
- 2384 AMANITA petiolo farto, gracili, pileo pulvinato, cinereo, lamellis albis †.
- 2385 AMANITA petiolo gracili, fistuloso, spadiceo. pileolo piano, cinereo, oris luteis striatis, lamellis albis †. SCHÆFFER. t. 45.
- 2386 AMANITA petiolo procero, fistuloso, pileo piano, umbonato, striato, lamellis albis †. an *Momomyces* BATARRÆ t. 21. F?
- 2387 AMANITA radice tuberosa, caudata, petiolo procto, pileo piano, nigricante, lamellis albis †. in sylvis.
- 2388 AMANITA radice caudata, petiolo fistuloso procero, pileo umbonato, cinereo, striato, lamellis albis †. *Hydrophorus cinereus* BATARR. t 25. E.
- 2389 AMANITA cespitosas, petiolo procero, fistuloso, pileo umbonato, striato, squamoso †. *Fungus soboliferus fugax*, pileo galericulato, obscuro, vertice levi, reliqua parte subtilissime striato, lamellis murinis, pediculo albo, fistuloso MICHEL. p. 195. t. 79. f. 4.
- 2390 AMANITA tener, petiolo procero, fistuloso, pileo umbonato

umbonato plicato murino, lamellis albis †. iste  
in hortis.

- 2391 AMANITA petiolo, procero gracilissimo, pileolo  
conico, striato, murino, lamellis albis †. *Fungus*  
*fuscus*, *lamellis albis*, *ex musco terrestri nascens*  
BUXBAUM. Cent. IV. t. 28. f. 2. in gramineis &  
foliis putridis.
- 2392 AMANITA minimus, pileolo campaniformi, spa-  
diceo, lamellis albis †. *Fungus parvus capitul-*  
*lo conico*, *in cellis vinariis proveniens* BUXBAUM.  
Cent. IV. t. 13. f. 1. in ligno putrido.
- 2393 AMANITA pileolo conico, spadiceo, lamellis al-  
bis †.
- 2394 AMANITA petiolo curvulo, pileolo campanifor-  
mi, flocculento, farinoso, striato, lamellis albis †.
- 2395 AMANITA volva exceptus, pileolo farinoso, pileo  
cinereo striato, lamellis albis †.
- 2396 AMANITA petiolo gracili, anulato, pileolo he-  
misphärico, spadiceo, lamellis albis †. Agarici  
VI. GLEDITSCH. varietates a. c. d.
- 2397 AMANITA petiolo procerro, fistuloso, anulato,  
pileolo piano, verrucoso, serido, lamellis al-  
bis †. *Fungus fuscus pediculo bulboſo*, *capitulo*  
*albis pustulis notato*. STERBEEK. t. 21. D.
- 2398 AMANITA petiolo bulboso, pileo hemisphärico,  
spadiceo, lamellis albis. Icon SCHÄFFERI t. 38.

## II. LAMELLIS OCHROLEUCIS CERVINIS, ET ADFINIUM COLORUM.

- 2399 AMANITA cervinus, petiolo procero, anulato,  
pileo cervino, squamis fuscis exasperato †. *Fun-*  
*gus pileolo lato*, *moris surfuraceis adsperso* VAIL-  
LANT. p. 54. n. 2.
- 2400 AMANITA rufus, petiolo fistuloso, pileo squamo-  
fo †. Tabula SCHÄFFERI 25.
- 2401 AMANITA cervinus, petiolo bulboso, farto, pi-  
leolo per oram tuberoso, & striato †. annon.  
T. 79. SCHÄFFERI.
- 2402 AMANITA cervinus, petio'lo procero, anulato,  
SCHÄFFER. t. 19. f. 102.

## II. LAMELLIS OCHROLEUCIS. 211

- 2403 AMANITA cervinus, anulatus, procerus, exiguus. †  
 2404 AMANITA cervinus, pileo pulvinato, oris adtractis. †  
 2405 AMANITA cervinus, petiolo fistuloſo, pileoli centro squamoſo. †  
 2406 AMANITA cervinus, petiolo flavo, curvulo, excentrico, pileolo squamoſo, lameilis ramosis. †  
 2407 AMANITA ex vaccino avellaneus, fericeus, lamellis numerosiſſimis albidis. †  
 2408 AMANITA cervinus, petiolo crassifimo. †  
 2409 AMANITA cervinus, tener, oris striatis & fiffis. †  
 2410 AMANITA fasciculatus, pileolo cervino, conico. †  
 2411 AMANITA pileo flavescente, lamellis butyraceis, anulo araneoso. †  
 2412 AMANITA pileo flavescente, squamoſo, lamellis terreis, obscuris, anulo araneoso. †  
 2413 AMANITA anulatus, cervinus, pediculo ſuperne albo. †  
 2414 AMANITA pileolo plano, lacero, corio cervino, lamellis terreis obscuris. Tab. 43. 44. SCHÄFFER.  
 2415 AMANITA ſiccus, pileo plano, subcinereo, lamellis coloris lignei. †  
 2416 AMANITA ſiccus, pileolo albido, lamellis torofis flavescenib⁹. †  
 2417 AMANITA ſiccus, pileolo hemiſphärico, obſolete umbrino, lamellis subcarneis. †  
 2418 AMANITA tener, pediculo nigro, procero, ileo terreo ſtriato, lamellis ſordide albis. †

## III. LAMELLIS FLAVIS.

- 2419 AMANITA fulvus, lacte croceo. *Omphalomyces acris lateritii cooloris* BATARR. t. 16. A. & alia varietates.  
 2420 AMANITA glutinosus, flavus, pileo umbonato. †  
*Fungus gelatinosus colore aurantio* VAILLANT. t. 12. f. 8. 9.  
 2421 AMANITA flavus, viscidus, pileolo conico. † an  
*Fungus viscidus ſordide luteus* BUXBAUM. Cent. IV. t. 9.  
 & Varietas ſuperne purpurea SCHÄFFER. t. 4.

- 2422 AMANITA siccus, sulfureus, lamellis crassis †.  
 2423 AMANITA flavus, campanulatus, siccus †. *Fungus durus citrini coloris* BUXBAUM. Cent. IV.t. 10.  
 2424 AMANITA flavus, pileo hemisphærico, squamoso †. *Fungus totus per maturitatem coloris aurantii* VAILLANT. p. 64. n. 20.  
 2425 AMANITA flavocinnameus, viscidus, striatus, papillatus †.  
 2426 AMANITA flavus, petiolo gracilissimo & procerissimo, pileo conico viscido †. *Fungus pediculo croceo, splendoris participe* VAILLANT. t. 11. f. 16. 17. 18.  
 2427 AMANITA flavus, petiolo gracili, procero, pileolo conico viscido †. *Bulla flavicante pileolo* BATARRA t. 20. Z. in ligno putrido.  
 2428 AMANITA flavus, tuberosus, petiolo squamoso, lamellis cervinis †.  
 2429 AMANITA flavus, totus striatus, tenuissimus †. SCHÆFFER. t. 63. f. 1. 2. 3. 4.  
 2430 AMANITA flavus, volvatus, anulo latissimo. *Fungus planus orbicularis aureus* MICHEL. t. 77. f. 1. iste rarior.  
 2431 AMANITA leoninus, fericeus †. SCHÆFFER. t. 4. 29. 41. 65.  
 2432 AMANITA siccus, leoninus, anulo arancoso. *Amanita dura ex fusco rubens quercina* DILLEN. Syn. III. t. 12. p. 23.  
 2433 AMANITA viridis, pileolo plano, lamellis pallidis †.  
 2434 AMANITA pileo pulvinato viridi, lamellis obscure luteis †.  
 2435 AMANITA pediculo bulbosō, lineato, pileo convexo, flavorufo †. SCHÆFFER. t. 13.

#### IV. LAMELLIS RUFIS aut RUBRIS.

- 2436 AMANITA petiolo bulbosō, lineato, pileo convexo, flavorufo †. SCHÆFFER. t. 13.  
 2437 AMANITA petiolo fistulosō, lineato, pileolo vacino squamoso †.  
 2438 AMANITA petiolo farto, lamellis terosis †.

## IV. LAMELLIS LUTEIS, RUFIS. 213

- 2439 AMANITA flavosanguineus, lamellis ratis, petiolo procero †.
- 2440 AMANITA petiolo albo, pileo ex ochroleuco & lateritio vario, lamellis roseis †.
- 2441 AMANITA februbellus, petiolo procero, pileo campanulato, striato †.
- 2442 AMANITA cupreus, pileolo campanulato, striato †. *Fungus multiplex convexus colore castaneo* VAILLANT. t. 12. f. 3. 4.
- 2443 AMANITA petiolo anulato, pileo campaniformi, albido, laminis roseis. *Fungus campestris, aibus superie, inferie rubens* I. B. III. p. 824.
- 2444 AMANITA anulatus, pileo pulvinato, cæruleo viridi, lamellis roseo cæruleis †. SCHÆFFER. t. 1.
- 2445 AMANITA pileo pulvinato, cervino, lamellis cinnameis †.
- 2446 AMANITA cespitosus, ramosus, hemisphæricus, molis, lamellis cinnameis. accedit *Fungus ramosus maximus &c.* MICHEL. t. 79. f. 1.
- 2447 AMANITA pileo campanulato, cinereo, squamoso, lamellis ruberrimis †.
- 2448 AMANITA pileo plano, flavescente, striato, viscido, lamellis roseis †.
- 2449 AMANITA pileo murino, umbilicato, lamellis subrufis. *Fungus foliaceus & lamellatus, infundibuli forma, fusco lividus* VAILLANT. t. 14. f. 1. 2. 3.
- 2450 AMANITA pileo campanulato, castaneo, lamellis subrufis †.
- 2451 AMANITA pileo hemisphærico, murino, lineis rubellis striato †.
- 2452 AMANITA pileo spadiceo, subvilloso. lamellis subrufis †.
- 2453 AMANITA leoninus, pileolo campanulato †.
- 2454 AMANITA leoninus, pileolo conico lineato †.

## V. LAMELLIS CÆRULEIS.

- 2455 AMANITA violaceus, petiolo bulboso, anulato, pileo plano. *Fungus cæruleus major* BUXBAUM Cent. IV. t. 9.

- 2456 AMANITA obscure cervinus, petiolo bulboso, anulo araneoso, lamellis extus conspicuis, sub-violaceis †.
- 2457 AMANITA violaceus, petiolo gracili, pileolo pulvinato †.
- 2458 AMANITA obscure violaceus, pileolo conico †.
- 2459 AMANITA violaceus, pileolo plano, striato †.  
*Fungus dilute carneus ut incarnatus* VAILLANT  
p. 64. n. 46.

## VI. LAMELLIS VIRIDIBUS.

- 2460 AMANITA totus viridis †.

VII. LAMELLIS OBSCURI COLORIS,  
LIGNEIS, PALMEIS.

- 2461 AMANITA ceræ crudæ colore, ora striata †.
- 2462 AMANITA pileo umbrino, lamellis obscure cinnameis †.
- 2463 AMANITA pileolo umbrino, campaniformi, stria-to, lamellis obscure ligneis †.
- 2464 AMANITA minimus, pileolo papillato, villoso, albo, lamellis ligneis †.

## VIII. LAMELLIS CINEREIS. MURINIS.

- 2465 AMANITA cinereo umbrinus, cute striata, lamel-lis cinereis †.
- 2466 AMANITA pulvinatus, cinereus, petiolo superne farinoso †.
- 2467 AMANITA cinereo spadiceus, cuticula striata, lamelis umbrino violaceis †.
- 2468 AMANITA cinereus, petiolo crasso & farto †.  
SCHÆFFER. t. 89.
- 2469 AMANITA spadiceo cinereus, petiolo fistuloso, pileolo sericeo †. *Fungus late fusco colore*, VAILLANT. t. 64. n. 22.
- 2470 AMANITA cinereo spadiceus, petiolo farinoso †.

- 2471 AMANITA sordide ex luteo cinereus, petiolo bulboso, pileolo villosō †.
- 2472 AMANITA murinus, petiolo procerō, pileo late conico striato †.
- 2473 AMANITA murinus, pileo ovato adtracto †.
- 2474 AMANITA terreo luteus, pileo piano striato, lamellis umbrino violaceis †.
- 2475 AMANITA pileo cinereo semicirculari †. *Fungus parvus viscosus*, *pileo griseo semiorbiculari* MICHEL. p. 147. n. 3.
- 2476 AMANITA minimus, pileolo & petiolo villosis, albis, lamellis obscure ligneis †. in ligno putrefacente.
- 2477 AMANITA cinereus, prolifer, vagina infundibuliformi †. *Fungus ramosus*, *parvus*, *albus*, *pileis in tubum quasi contractis* MICHEL. p. 144. t. 79. f. 3.
- 2478 AMANITA petiolo anulato, pileo hemisphaerico, albo, lamellis mucinis †.
- 2479 AMANITA petiolo ovato, striato, cinereo, anulo fugaci.
- 2480 AMANITA campanulatus albns, lamellis subluteis, anulo araneoso †.

IX. LAMELLIS UMBRINIS.

- 2481 AMANITA anulo araneoso, pileolo pulvinato, livide spadiceo, lamellis ex cinereo umbrinis †.
- 2482 AMANITA anulo araneoso, pileo flavo, lamellis ex flavo fuliginosis †. *Fungus major subluteus*, *lamellis luridis* BUXBAUM. Cent. IV. t. 4.
- 2483 AMANITA campaniformis, cinereus, laminis nigris †. *Fungus multiplex campaniformis colore fusco* VAILLANT. t. 12. f. 5. 6.
- 2484 AMANITA pileolo conico striato, lamellis nigris †. *Fungus parvus*, *pileolo plicatili*, *cinerarius*, *oris crenatis* BUXBAUM. Centur. II. t. 50. f. 2.

- 2485 AMANITA tener, cinereus, lacer, cervinus,  
lamelliis nigris †. *Fungus pileo plicatilis major*  
BUXBAUM. *Cent. II. t. 10. f. 1.*
- 2486 AMANITA nigerrimus †.

## XX. ZOOPHYTA.

- 2487 SPONGIA ramosa fluviatilis polyspermos, ad Con-  
fervam accedens RUPP. cum iconе. Ex lacu Mo-  
ratensi extraxit PENNÆUS ap. GESNER.

Computatis & emendatis omnibus verus numerus  
est plantarum 2490.

---

Ex Officina BRUNNEBI & HALLERI.

---



